

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

Murin Forte Block

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2019/0108/MRA/IT/2014/00185/AUT

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0009586-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	Murin Forte Block Vebitox Broma Block
--------------------------------	--

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Adresă	via Desman, 43 35010 Borgoricco Italia
Numărul autorizației	RO/2019/0108/MRA/IT/2014/00185/AUT	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	RO-0009586-0000	
Data autorizației	01/04/2014	
Data de expirare a autorizației	31/12/2026	

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Adresa producătorului	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italia
Adresa locurilor de producție	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italia

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	ACTIVA SRL
Adresa producătorului	Via Feltre 32 20132 Milan Italia
Adresa locurilor de producție	Dr. Tezza s.r.l.via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	<p>H372: Provoacă leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată {1:indica#i calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol:}.</p> <p>H360D: Poate dăuna fătului.</p>
Fraze de precau#ie	<p>P201: Procura#i instruc#iuni speciale înainte de utilizare.</p> <p>P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite #i în#elese toate măsurile de securitate.</p> <p>P280: Purta#i mănuși de protecție.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P501: Arunca#i conținutul la în conformitate cu legisla#ia na#ională..</p>

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Specialiști

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adul#i Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: tineri Denumirea științifică: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: adul#i Denumirea științifică: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: tineri Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adul#i Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: tineri
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior #oareci #i #obolani: La interior #i în jurul clădirilor #oareci: La interior #i la exterior, în jurul clădirilor #obolani: La interior #i o la exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani 100 g, #oareci 50 g Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: #oareci Momeli: - 50 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distan#a minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. În caz de infestare gravă, distan#a dintre punctele de aplicare trebuie să fie de 2 metri.

	<p>#oareci - Capcanele se inspectează cel pu#in o dat#ă la 2-3 zile la începerea tratamentului #i cel pu#in săptăm#ănal ulterior, pentru a verifica dac#ă momeala este acceptat#ă #i dac#ă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndep#ărta roz#ătoarele moarte. Realimenta#i cu momeal#ă atunci c#ând este necesar.</p> <p>#obolani:Momeli: - 100 g de momeal#ă per capcan#ă. Dac#ă sunt necesare mai multe capcane, distan#a minim#ă dintre acestea trebuie s#ă fie de 10 metri.</p> <p>În caz de infestare grav#ă, distan#a dintre punctele de aplicare trebuie s#ă fie de 5 metri.</p> <p>#obolani - Capcanele se inspectează doar dup#ă 5-7 zile de la începerea tratamentului #i cel pu#in săptăm#ănal ulterior, pentru a verifica dac#ă momeala este acceptat#ă #i dac#ă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndep#ărta roz#ătoarele moarte. Realimenta#i cu momeal#ă atunci c#ând este necesar.</p>
Categorია (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Bloc de momeal#ă de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75, 80, 100, 120, 150 #i 200 g</p> <p>Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg</p> <p>În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg</p> <p>Materiale de ambalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilen#ă - plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 <ul style="list-style-type: none"> - Conserv#ă/Tabl#ă, h#ârtie, carton, - Cutie, h#ârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/ polietilen#ă - G#ăleat#ă: PEID

4.1.1. Instruc#iuni specifice de utilizare

- Înainte de utilizare, citi#i #i respecta#i informa#iile despre produs #i toate informa#iile care îl înso#esc sau care sunt comunicate în momentul vânz#ării.

- Studia#i #i evalua#i în prealabil zona infestat#ă, pentru a identifica speciile de roz#ătoare #i locurile de activitate ale acestora #i pentru a determina cauzele posibile #i amploarea infest#ării.

- Îndep#ărta#i hrana la care roz#ătoarele pot ajunge u#or (de exemplu, boabe de cereale v#arsate sau resturi de m#âncare).

Pe l#âng#ă aceasta, nu cur#ă#a#i zona infestat#ă imediat înainte de tratament, deoarece astfel ve#i deranja popula#ia de roz#ătoare #i ve#i îngreuna acceptarea momelii.

- Produsul trebuie s#ă fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrat#ă a d#ăun#ătorilor, care include, printre altele, m#ăsurile de asigurare a igienei #i, atunci c#ând este posibil, metode fizice de combatere.

- Analiza#i posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupa#i găurile, îndepărta#i cât mai mult posibil eventualele surse de hrană #i băutură) pentru a cre#te #ansa de consum al produsului #i pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Capcanele trebuie să fie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezen#a rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vîzuini etc.).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind con#inutul de rodenticide #i interzicerea mutării sau a deschiderii acestora

- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum #i măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.

- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

- Amplasa#i produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă #i alte animale nevizate.

- Amplasa#i produsul la distan#ă de alimente, băuturi #i hrană pentru animale, precum #i de ustensilele sau suprafe#ele aflate în contact cu acestea.

- Manipula#i produsul numai cu mânu#i de protec#ie împotriva substan#elor chimice

- Nu consuma#i alimente sau băuturi #i nu fuma#i în timpul utilizării produsului.

După utilizarea produsului, spăla#i-vă mâinile #i pielea direct expusă.

- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, lua#i în considerare mutarea capcanelor în alte locuri #i o eventuală schimbare a formulei momelii.

-Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile #i nu se observă o diminuare a activită#ii rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situa#ii.

Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezisten#ă, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

Lua#i în considerare #i utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

- Îndepărta#i momeala rămasă sau capcanele la sfâr#itul perioadei de tratament.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informa#i persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate #i ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor

- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, pe durata tratamentului căuta#i #i îndepărta#i frecvent rozătoarele moarte (de exemplu, cel pu#in de două ori pe săptămână).

- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare #i a eficacită#ii tratamentului.

- Nu utiliza#i momeli care con#in substan#e active anticoagulante ca momeli permanente pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.

- Informa#iile despre produs (eticheta #i/sau prospectul) trebuie să indice în mod clar următoarele: Produsul nu se furnizează publicului larg (de exemplu, „exclusiv pentru uz profesional”).

- produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării (de exemplu „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării”);

- utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informa#iile men#ionate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).

- Acest produs ar trebui să elimine rozătoarele într-o perioadă de 35 de zile.

Informa#iile despre produs (eticheta #i/ sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar utilizatorului să contacteze furnizorul produsului sau un serviciu de deratizare în cazul în care există suspiciuni de ineficien#ă a produsului la sfâr#itul perioadei de tratament (se observă în continuare prezen#a rozătoarelor).

- Nu spăla#i capcanele cu apă între aplicări.

- Elimina#i roz#itoareale moarte în conformitate cu cerin#ele locale

4.1.3. În func#ie de modul de utilizare, particularit#i ale efectelor posibile directe sau indirecte, instruc#iuni de prim-ajutor #i m#asuri de urgen#ă pentru protec#ia mediului

- Acest produs con#ine o substan#ă anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă s#anger#ari nazale #i gingivale.

În cazuri severe, pot să apar#ă echimoze la suprafa#a pielii #i s#ange în excremente sau în urină.

- Antidot: vitamina K1, administrat#ă numai de personal medical/veterinar.

- În caz de:

- expunere cutanată, sp#ala#i pielea cu ap#ă, apoi cu ap#ă #i s#ăpun.

- expunere ocular#ă, cl#ati#i ochii cu lichid de uz ocular sau cu ap#ă #i #ine#i pleoapele deschise timp de cel pu#in 10 minute.

- expunere oral#ă, cl#ati#i atent gura cu ap#ă.

Nu administra#i niciodat#ă substan#e pe cale oral#ă persoanelor incon#tiente.

Nu provoca#i vom#ă.

În caz de înghi#ire, consulta#i imediat medicul #i prezenta#i ambalajul sau eticheta produsului.

Contacta#i un medic veterinar specializat în chirurgie dac#ă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu urm#atoarele informa#ii: „a nu se muta sau deschide”; „con#ine un produs rodenticid”; „Murin forte block sau num#arul de autoriza#ie”; „substan#ă(e) activ#ă(e)” #i „în caz de incident, suna#i la un centru de informare toxicologic#ă”

- Periculos pentru animalele s#albatice.

4.1.4. În func#ie de modul de utilizare, instruc#iuni pentru eliminarea în siguran#ă a produsului #i a ambalajului acestuia

- La sf#âr#itul perioadei de tratament, elimina#i momeala neconsumat#ă #i ambalajul în conformitate cu cerin#ele locale

- Se recomand#ă utilizarea m#anu#ilor de protec#ie.

4.1.5. În func#ie de modul de utilizare, condi#iile de depozitare #i termenul de valabilitate al produsului în condi#ii normale de depozitare

- A se p#ăstra într-un loc uscat, r#ăcoros #i bine ventilat. A se p#ăstra recipientul închis #i ferit de lumina direct#ă a soarelui.

- A se p#ăstra în locuri unde nu au acces copii, p#ăs#ari, animale de companie #i animale de ferm#ă.

- Perioad#ă de valabilitate: 2 ani.

4.2. Descrierea utiliz#ării

Tabel 2. exper#i

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exact#ă a utiliz#ării autorizate, dup#ă caz	Inaplicabil pentru rodenticide

Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adul#i</p> <p>Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: tineri</p> <p>Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: adul#i</p> <p>Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: tineri</p> <p>Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adul#i</p> <p>Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: tineri</p>
Domeniul (domeniile) de utilizare	<p>utilizare în interior utilizare în exterior</p> <p>#oareci #i #obolani: la interior #i la exterior #i în jurul clădirilor #obolani: zone exterioare deschise #obolani: Depozite exterioare de de#euri #obolani: Canalizare</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală</p> <p>Descriere detaliata: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării. Sta#ii de intoxicare acoperite #i protejate Aplicare directă în vizuină a momelii gata de utilizare</p>
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	<p>Frecven#a de aplicare: #obolani 200 g, #oareci 50 g</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare: #oareci Momeli: - 50 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distan#a minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. În caz de infestare gravă, distan#a dintre punctele de aplicare trebuie să fie de 2 metri.</p> <p>#oareci - Capcanele se inspectează cel pu#in o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal ulterior, pentru a verific a dacă momeala este acceptată #i dacă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimenta#i cu momeală atunci când este necesar. #obolani Momeli: - 200 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distan#a minimă dintre acestea trebuie să fie de 10 metri. În caz de infestare gravă, distan#a dintre punctele de aplicare trebuie să fie de 5 metri.</p>

	<p>#obolani - Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată #i dacă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimenta#i cu momeală atunci când este necesar.</p> <p>#oareci Utilizare re#ele de canalizare: a se utiliza maxim 250 g per sta#ie de int oxicare</p> <p>Utilizare în vizuini: 40-60 g de produs</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Bloc de momeală de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75, 80, 100, 120, 150 #i 200 g</p> <p>Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg</p> <p>În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg</p> <p>Materiale de ambalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă - plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - Conservă/Tablă, hârtie, carton, - Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă - Găleată: PEID

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărta#i resturile de produs la sfâr#itul perioadei de tratament
 - Amplasa#i capcanele în zone fără risc de inundare.
 - Înlocui#i momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.
 - Atunci când amplasa#i capcanele în apropierea a sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.
 - Atunci când amplasa#i capcanele în apropierea apelor de suprafa#ă (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de iriga#ii) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.
 - în caz de utilizare în re#ele de canalizare: Introduce#i momelile numai în re#ele de canalizare conectate la sta#ia de epurare a apelor uzate.
 - Înainte de utilizare, citi#i #i respecta#i informa#iile despre produs #i toate informa#iile care îl înso#esc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
 - Studia#i #i evalua#i în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare #i locurile de activitate ale acestora #i pentru a determina cauzele posibile #i amploarea infestării.
 - Îndepărta#i hrana la care rozătoarele pot ajunge u#or (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare).
- Pe lângă aceasta, nu cură#a#i zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel ve#i deranja popula#ia de rozătoare #i ve#i îngreuna acceptarea momelii.

-
- Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
 - Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.
 - Momelile trebuie să fie amplasate astfel încât să reducă la minimum expunerea speciilor nevizate și a copiilor.
 - Protejați momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
 - Acoperiți sau blocați intrările în vizuinele cu momeală, pentru a reduce riscul de respingere și împrăștiere a acesteia.
 - Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.
 - Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora
 - Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.

 - Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

 - Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.
 - Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.
 - Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.

 - Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice
 - Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului.
După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.

 - Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament.
Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici relevant.
 - Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.

 - Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

 - Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament (dacă produsele nu sunt utilizate în cadrul unui sistem de momire permanent)
Utilizare în stații de intoxicare acoperite și protejate.
- În caz de utilizare externă, stațiile de intoxicare trebuie să fie acoperite și plasate în locuri strategice, pentru a reduce la minim riscul de expunere a speciilor nevizate.

 - Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

 - În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent*

 - Atunci când este posibil, zona tratată trebuie să fie vizitată la intervale de cel mult patru săptămâni, pentru a evita dezvoltarea unei populații rezistente.

 - Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.
-

în caz de utilizare în rețele de canalizare:

- Momelile trebuie să fie aplicate astfel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie îndepărtate de apă.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

- A se amplasa momeala doar în rețele de canalizare conectate la o stație de epurare.

- Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.

- Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să specifice în mod clar că produsul se furnizează exclusiv utilizatorilor experți, posesorii ai unor certificări care să ateste îndeplinirea cerințelor de formare aplicabile (de exemplu, „numai pentru experți”).

- A nu se utiliza în zone în care poate fi suspectată o rezistență la substanța activă.

- Nu utilizați prin rotație anticoagulanți diferiți, cu potență comparabilă sau mai mică, în scopul gestionării rezistenței.

Pentru utilizarea prin rotație, analizați posibilitatea folosirii unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui anticoagulant cu potență mai mare.

-Între aplicări, nu spălați cu apă capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite și protejate.

- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale

- *În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent* -

- Amplasarea de momeli permanente este limitată exclusiv la locurile cu risc înalt de reinvadare, atunci când alte metode de combatere s-au dovedit insuficiente.

- Strategia de amplasare a momelilor permanente trebuie să fie reexaminată periodic, în contextul sistemului de combatere integrată a dăunătorilor și al evaluării riscului de reinfestare.

În caz de aplicare de momeală gata de folosit direct în vizuină

-Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor

În caz de utilizare în rețele de canalizare

-Introduceți momelile numai în rețele de canalizare conectate la stația de epurare a apelor uzate.

- Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când amplasați capcanele în apropierea a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă.
Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale.
În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.

- Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.
- În caz de:
- expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
- expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.
- expunere orală, clătiți atent gura cu apă.

Nu administrați niciodată substanțele pe cale orală persoanelor inconștiente.

Nu provocați voma.

În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului.

Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „Murin forte block sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică

- Periculos pentru animalele sălbatice.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

-La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale

- Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

- A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

-Perioadă de valabilitate: 2 ani.

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

A se face referire la utilizările specifice autorizate

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

A se face referire la utilizările specifice autorizate

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă.

Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale.

În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.

-Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.

- În caz de:

- expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

- expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

- expunere orală, clătiți atent gura cu apă.

Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente.

Nu provocați vomă.

În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „Murin forte block sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică

- Periculos pentru animalele sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale

- Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

-A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

- Perioadă de valabilitate: 2 ani

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momeii.

- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli.

Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.