

**SL**

***PRILOGA***

**POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

FREE LAND 10EC

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

**Številka dovoljenja: SI-0030265-0000**

**Številka proizvoda v R4BP: SI-0030265-0000**

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Free Land 10EC
--------------	----------------

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Activa s.r.l.
	Naslov	via Feltre, 32 20132 Milano Italija
Številka dovoljenja		SI-0030265-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0030265-0000
Datum dovoljenja		16/02/2023
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		16/02/2033

### 1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Activa S.r.l.
Naslov proizvajalca	Via Rivoltana 2d 20090 Segrate (MI) Italija
Kraj proizvodnih obratov	Activa S.r.l. site 1 (1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Italija  Activa S.r.l. site 2 (2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija  Activa S.r.l. site 3 (3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Italija

### 1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	(RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil-(IRS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Ime proizvajalca	Tagros Chemicals India Ltd.
Naslov proizvajalca	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 7 2, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai Indija
Kraj proizvodnih obratov	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd) site 1 Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil-(1R S)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	10,53 % (m/m)
DPM – methoxy methyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	54,47 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

EC Koncentrat za emulzijo

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  H373: Lahko škoduje organom živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ..
Previdnostni stavki	P273: Preprečiti sproščanje v okolje.  P391: Prestreči razlito tekočino.  P501: Odstraniti posodo nacionalne ureditve.  P501: Odstraniti vsebino nacionalne ureditve.  P260: Ne vdihavati prahu.  P260: Ne vdihavati dima.  P260: Ne vdihavati plina.  P260: Ne vdihavati meglice.  P260: Ne vdihavati hlapov.  P260: Ne vdihavati razpršila.  P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.  P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško oskrbo.

## Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Profesionalni uporabnik**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Točkovni nanos
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Blattella germanica Splošno ime: drugo: Nemški ščurek Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: Blatta orientalis Splošno ime: drugo: Orientalski ščurki Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: Lasius niger Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Točkovni nanos s škropljenjem  Podroben opis: Za obdelavo poroznih površin, uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> Za obdelavo neporozne površine, uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> . Preostala količina: 4 tedni
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Poroznih površin: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> . Neporozne površine: odmerek glede na zdravilno učinkovino je 21 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> .  Število in časovni razpored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 ml. HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.

---

#### **4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### **4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### **4.2. Opis uporabe**

**Tabela 2. Točkovni nanos proti plazečim žuželkam v zaprtih prostorih -Splošna javnost**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Točkovni nanos

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i>  Splošno ime: drugo: Nemški ščurek  Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i>  Splošno ime: drugo: Orientalski ščurki  Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i>  Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja  Razvojna faza: odrasli</p>
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: drugo: Točkovni nanos s škropljenjem</p> <p>Podroben opis: Pri poroznih površnin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>) • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup> • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup> • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup> • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m<sup>2</sup> Pri non poroznih površnin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>): • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m<sup>2</sup>. • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>. • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>. • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m<sup>2</sup>. Preostala količina: 4 tedni:</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Pri poroznih površnin 52.7 mg t.g.a.i./m<sup>2</sup>. Pri non poroznih površnin 21 mg t.g.a.i./ m<sup>2</sup>.</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:  Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	<p>Steklenica z merilnim okencem (20 mL)</p> <p>Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL</p> <p>Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL</p> <p>Kartušni sistem: 5 mL</p>

---

#### **4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, kjer se žuželke ponavadi skrivajo.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Za neprofesionalni uporabnik se predlaga vključitev naslednje omejitve: “Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine ”.

#### **4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami

#### **4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.



### 4.3. Opis uporabe

**Tabela 3. Točkovni notranji v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam - Profesionalni uporabnik**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Uporaba v razpoke in špranje
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: Nemški ščurek Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: Orientalski ščurki Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem  Podroben opis: Pri poroznih površin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> ): uporabiti 10 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (1%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> . Pri neporozne površine (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> ): uporabiti 5 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.5%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 40 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> . Preostala količina: 4 tedni
Odmarki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri poroznih površin 52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> . Pri neporozne površine 21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> .  Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.  HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.  HDPE Kanister : 5, 10, 20 L.

---

--	--

#### 4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Nanesite na površine, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

#### 4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### 4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4. Opis uporabe

**Tabela 4. Točkovni notranji v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam -Splošna javnost**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Blattella germanica Splošno ime: drugo: Nemški ščurek Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: Blatta orientalis Splošno ime: drugo: Orientalski ščurki Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: Lasius niger Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Obdelava razpoke in špranje s škropljenjem  Podroben opis: Pri poroznih površin (npr. beton, opeka, lesena plastika, itd.) (52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> ) • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 1 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> Pri non poroznih površin (npr. plastika, kovina, keramika, itd.) (21 mg t.g.a.i./ m <sup>2</sup> ): • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 0.5 mL izdelka in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 32 pršenj na m <sup>2</sup> . • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m <sup>2</sup> . • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m <sup>2</sup> . • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 16 pršenj na m <sup>2</sup> . Preostala količina: 4 tedni
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri poroznih površin 52.7 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> . Pri non poroznih površin 21 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup> .  Število in časovni razpored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Steklenica z merilnim okencem (20 mL)

---

	Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL
	Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL
	Kartušni sistem: 5 mL

#### **4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Nanesite v domačih prostorih, razpoke in špranje, kot so: keramične ploščice, marmor, granit in druge površine v trd kamen, kovine (jeklo, železo itd.), plastika, steklo (npr. okenska stekla), pobarvane vezane plošče. Izdelkom nanesite neposredno v razpoke in špranje z razdalje 40 cm.

Izdelkom je treba uporabljati na omejenih območjih na površinah, ki se ne redno čistijo, na primer zadaj ali pod hladilnik, pod kuhinjskih korit, pod pečico ali grelnik vode, v vseh razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravelj.

Za neprofesionalni uporabnik se predlaga vključitev naslednje omejitve: “Ubijanje ščurkov je predviden 4 ure po izpostavljenosti insektom na obdelane površine”.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

#### **4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Ne uporabljajte na območjih, ki so dovzetna za rutina mokrega čiščenja  
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

#### **4.4.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.4.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### 4.5. Opis uporabe

**Tabela 5. Površinske ostanki obdelave okoli stavbe proti tigrasti komar -Profesionalni uporabnik**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelkom se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje tigrastih komarjev.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Aedes albopictus Splošno ime: drugo: tigrasti komar Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Na prostem na podeželju
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Razprševanje, površinske obdelave  Podroben opis: Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter. uporabiti 2 g koncentriran izdelkom in razredčimo v 1 L vode (0.2%); temeljito premešajte in nanesite z ustreznim razpršilcem s količino 50 mL raztopina na 1 m <sup>2</sup> . Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i. /m <sup>2</sup> .  Število in časovni razpored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.

---

	HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnimi vratom): 500, 1000 mL.
	HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.

#### **4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Izdelkom razredčite z vodo do 0,2 % w/v, temeljito premešajte in s pomočjo razpršilca v nahrbtniku ali naprave ustrezne nanesite 50 mL insekticid raztopina na m<sup>2</sup>.

Izdelkom je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelkom deluje proti tigrastih komarjev s stikom in hlapi.

#### **4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izdelkom ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko oprasovalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### **4.5.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.5.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.5.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.6. Opis uporabe

**Tabela 6. Površinske ostanki obdelave okoli stavbe proti tigrasti komar -Splošna javnost**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelkom se uporablja na prostem okoli stavb na podeželju za zatiranje komarji.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Aedes albopictus Splošno ime: drugo: tigrasti komar Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Na prostem na podeželju.
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Razprševanje, površinske obdelave  Podroben opis: Za tretiranje okoli stavbe do višine približno 50 cm do vključno 150 cm, skupina za zdravljenje visok približno en meter. • Steklenica z merilnim okencem: odmerite 2 mL izdelka in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Pakiranje za enkratno uporabo 2 mL: odprite tesnilo in prelijte s 1 L vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 40 pršenj na m <sup>2</sup> • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m <sup>2</sup> • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 8 pršenj na m <sup>2</sup> Preostalo delovanje proizvoda traja 3 dni.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 10.5 mg t.g.a.i./m <sup>2</sup>  Število in časovni raspored uporabe: Zdravljenje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Steklenica z merilnim okencem: 20 mL  Pakiranje za enkratno uporabo: 2 mL  Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL

---

	Kartušni sistem: 5 mL
--	-----------------------

#### **4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Izdelkom je treba enakomerno nanesti na izbrani površini z razdalje 50 cm. Izdelkom deluje proti tigrastih komarjev s stikom in hlapi.

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovratnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri steklenica z merilnim okencem in pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

#### **4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izdelkom ne uporabljajte na območjih, ki so priključene na kanalizacijo, drenažna voda, jaški ali blizu njih.

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu. Preprečiti izpostavljenost neciljnih organizmov (npr. razmislite o uporabi čez noč, ko oprasevalci, vključno s čebelami, niso aktivni, ne tretirajte rastlin v obdobju cvetenja).

#### **4.6.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.6.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.



#### 4.6.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### 4.7. Opis uporabe

**Tabela 7. Izkoreninjenje mravljišča -Profesionalni uporabnik**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelkom se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Uporabiti okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo  Podroben opis: Koncentriran izdelkom je treba razredčiti z vodo do 0.5% w/v pred uporabo. Količina v insekticid raztopina (razredčene), ki jo je treba nanesti na vsako gnezdo je 25 g/ gnezdo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo  Število in časovni razpored uporabe: Brez omejitev.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	HDPE steklenica z merilnim pokrovčkom: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL.  HDPE steklenica z merilno komoro (steklenica z dvojnim vratom): 500, 1000 mL.  HDPE Kanister: 5, 10, 20 L.

#### **4.7.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Izdelkom razredčite z vodo v priporočeni količini, temeljito premešajte in nanašajte s posebnim nebulatorjem za razpršitev raztopina. Izdelkom je treba uporabiti s količino 25 mL insekticid raztopina na gnezdo, nanešen okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo at the entrance of the nest. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

#### **4.7.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

V fazi ravnanja z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip X, EN XXXXX).

#### **4.7.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.7.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.7.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

### **4.8. Opis uporabe**

**Tabela 8. Izkoreninjenje mravljišča -Splošna javnost**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelkom se uporablja na prostem s škropljenjem za izkoreninjenje mravljišča.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Uporabiti okrog gnezdo in na vhodu v gnezdo, s škropljenjem. Z enim samim nanosom za uničenje gnezdo.  Podroben opis: • Pakiranje za enkratno uporabo 1 mL: odprite tesnilo in prelijte s 100 mL vode v ustrezno posodo s sprožilnim razpršilom. Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo • Sistem je pripravljen za redčenje: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo • Kartušni sistem: Dobro pretresite in opraviti 10 pršenj na gnezdo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek glede na zdravilno učinkovino je 13.2 mg t.g.a.i./ gnezdo  Število in časovni raspored uporabe: Brez omejitev.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Pakiranje za enkratno uporabo: 1 mL  Sistem je pripravljen za redčenje: 5 mL  Kartušni sistem: 5 mL

#### 4.8.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Pri sistem je pripravljen za redčenje, odstranite ovrtnik, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri kartušni sistem, v steklenico dodajte 500 ml vode iz pipe, namestite kartušo v vrat steklenice, namestite sprožilec, privijte matico in pretresite posodo. Uporabo je treba opraviti s posebno posodo, opremljen z ustreznim sprožilcem.

Pri pakiranje za enkratno uporabo, uporabo se opravi s sprožilni razpršilec z odmerkom 1,25 ml/razpršilo. Ustrezna količina izdelka se doda potrebna količina vode in premeša

Izdelkom je treba uporabiti v priporočeni količini, okoli gnezdo in na vhodu v gnezdo. Za optimalno učinkovitost tretiranja ne uporabljajte v primeru vetra ali dežja.

---

#### **4.8.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Obdelava enega samega gnezdo za nanosom.

#### **4.8.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.8.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

#### **4.8.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Preberite poglavje 5 Splošna navodila za uporabo.

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO<sup>1</sup>**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izdelkom je treba uporabljati tako, da otroci, rejne živali in hišnih ljubljencev, zlasti mačke, ne pridejo v stik z izdelkom.

Mačke držite stran od obdelane površine. Zaradi posebne občutljivosti do piretroidi, izdelkom lahko povzroči pri mačkah hude neželene reakcije.

Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Med pršenjem izklopite zračni filter v akvariju

Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.

Nezainteresirane osebe, otrok in hišnih ljubljencev držite stran od obdelane površine/območja, dokler se površine ne posušijo.

Ne pršite na ljudi ali hišnih ljubljencev.

Za uporabo v zaprtih prostorih za zatiranje tigrasti komar:

- N-122 Pokrijte vse površine in prostore, ki bodo verjetno prišli v stik z živili, krmo in pitno vodo.

- N-127 Ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živili, krmo, pijačo in živino/hišnih ljubljencev.

- N-132 Ne nanašajte neposredno na površine ali prostore, na katerem je shranjeni, pripravljeno ali zaužito hrano ali krmo.

- N-301 Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in živalske krme.

Glej zgoraj podrobno opisane ukrepe za zmanjševanje tveganja.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč

- PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU S KOŽO: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

- Ne izpuščajte izdelkom ali prazne posode v okolje.

---

<sup>1</sup>Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

---

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne uporabljajte prazne embalaže.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite zunaj dosega otrok. Shranjujte ločeno od hrane, pijače ali živilo.

Shelf-life: 2 years, in original container at room temperatures. Izogibajte se ekstremne temperature in izpostavljenosti neposredni sončni. Zaščititi pred zmrzaljo.

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

Vsebuje cypermethrin; lahko povzročijo parestezijo.