



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 16/11/2016
Αριθ. πρωτ.: 9431/102971**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι
Αθήνα**

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας)
σκευάσματος K-OTHRINE 7,5
SC »**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία δελταμεθρίνη.

5. Την έγκριση του προϊόντος **K-OTHRINE 7.5 SC** που έλαβε στην Σουηδία με αριθμό **5255/12-9-2016 (R4BP3 ASSET No: SE-0008769-0000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
7. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
9. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
10. Το υπ’ριθ πρωτ 11889/136388/8-12-2015 σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
11. Την υπ’ αριθ πρωτ. 9431/102971/ 19-9-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας καθώς και την υπ’ αριθ πρωτ. 10146/116267/27-9-2013 αίτηση γνωστοποίησης ενδιαφέροντος για αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0222** στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** K-OTHRINE 7,5 SC
 - 2. Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC).
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Deltamethrin 0,73 % β/β (αντιστοιχεί σε 7,5g/L)
Βοηθητικές ουσίες: 99,26% β/β
 - 4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 98,5%.
 - 5. Παρασκευαστής των δ.ο:** Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Γερμανία.
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125Μαρούσι, Αθήνα
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο κάτοχος της έγκρισης
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental Science, Γαλλία
 - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** (α) Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental Science, Γαλλία
(β) SBM Formulation, Γαλλία
(γ) Bayer CropScience AG, Γερμανία

- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** (α) Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental Science, Γαλλία
(β) SBM Formulation, Γαλλία
(γ) Bayer CropScience AG, Γερμανία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο σε συνεργεία εντομοκτονίας - μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **11-09-2026**.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **16/11/2016** η υπ' αριθ **ΤΠ18-0027**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) **K-OTHRINE 7,5 SC (δραστική ουσία: deltamethrin 0.75%)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. **9856/99052/30-10-2012** απόφαση μας, με κάτοχο έγκρισης την **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται από την **16/5/2017** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (έως την **16/11/2017**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **17/11/2017** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
K-OTHRINE 7,5 SC**

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	
K-Othrine 7,5 SC	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Bayer Ελλάς ABEE
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0222	
Ημερομηνία έκδοσης	16-11-2016	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	11/9/2026	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental Science,
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer S.A.S. Division CropScience, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442, 69656 Villefranche-sur-Saône, Γαλλία
	SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621, 34500, Béziers, Γαλλία
	Bayer Cropscience AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607), 65926 Frankfurt, Γερμανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin
Όνομα παρασκευαστή	Bayer CropScience AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase, 396195 GIDC, Vapi, Ινδία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα α (%)
deltamethrin		Εντομοκτόνο	52918-63-5	258-256-6	0.73 % β/β ή 7,5 g/L

2.2 Τύπος σκευάσματος

SC – Συμπυκνωμένο εναιώρημα

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1

Έλεγχος χρόνιων προσβολών από βαδιστικά έντομα, σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Για εσωτερικούς χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ψεκάστε σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πόρτες, παράθυρα, και άλλα σημεία εισόδου που συνήθως χρησιμοποιούν τα έντομα, καθώς και χώρους πίσω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωληνώσεις. Όπου υπάρχει προσβολή από έντομα, ψεκάστε τα πλαίσια του κρεβατιού και τα στρώματα καθώς και τις ρωγμές και εσοχές σε διπλανούς τοίχους και πατώματα. Ψεκάστε τα προσβεβλημένα χαλιά δίνοντας. Σε χώρους όπου κατοικούνται μόνιμα το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές. <p>Για εσωτερικούς χώρους που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> Εφαρμόστε το προϊόν εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Βαδιστικά έντομα συμπεριλαμβανομένων των κατσαριδών (οικογένεια Blattidae).
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Χρήση σε κτίρια περιλαμβανομένων κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων τροφίμων, αποθηκών. Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση ως παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων από βλάβες προκαλούμενες από έντομα.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής 3.32 %. Αραιώστε 166 κ.εκ. προϊόντος σε νερό μέχρι την απόκτηση 5 λίτρων συνολικού όγκου διαλύματος για 100 m ² .

	Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του σκευάσματος μπορεί να φτάσει μέχρι 4 εβδομάδες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας στην οποία έχει εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί ανάλογα με την έκταση της προσβολής και μέχρι ένα μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη. Πλαστικό: Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο Μέγεθος: 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα.

Πίνακας 2. Χρήση #2

Έλεγχος τοπικών προσβολών από βαδιστικά έντομα σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Για εσωτερικούς χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ψεκάστε σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πόρτες, παράθυρα, και άλλα σημεία εισόδου που συνήθως χρησιμοποιούν τα έντομα, καθώς και χώρους πίσω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωληνώσεις. Όπου υπάρχει προσβολή από έντομα, ψεκάστε τα πλαίσια του κρεβατιού και τα στρώματα καθώς και τις ρωγμές και εσοχές σε διπλανούς τοίχους και πατώματα. Ψεκάστε τα προσβεβλημένα χαλιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες τους. Σε χώρους όπου κατοικούνται μόνιμα το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές. <p>Για εσωτερικούς χώρους που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> Εφαρμόστε το προϊόν εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Βαδιστικά έντομα συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων (οικογένεια Blattidae).
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Χρήση σε κτίρια περιλαμβανομένων κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων τροφίμων, αποθηκών. Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση ως παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων από βλάβες προκαλούμενες από έντομα.

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Διάλυμα 1.66 %. Αραιώστε 83 κ.εκ. προϊόντος σε νερό μέχρι την απόκτηση 5 λίτρων συνολικού όγκου διαλύματος για 100 m ² . Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του σκευάσματος μπορεί να φτάσει μέχρι 4 εβδομάδες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας στην οποία έχει εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί ανάλογα με την έκταση της προσβολής και μέχρι ένα μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη. Πλαστικό: Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο Μέγεθος: 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα.

Πίνακας 3. Χρήση #3

Για τον έλεγχο των μυγών σε εσωτερικούς χώρους, εκτός στάβλων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για επιφάνειες εσωτερικών χώρων που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό Εντοπίστε και ψεκάστε τις επιφάνειες που αναπαύονται οι μύγες. Για επιφάνειες εσωτερικών χώρων που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό: Ψεκάστε τοπικά σε ρωγμές και εσοχές.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Musca domestica</i> : Οικιακή μύγα - Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Χρήση σε κτίρια περιλαμβανομένων κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων τροφίμων, αποθηκών. Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση ως παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων από βλάβες προκαλούμενες από έντομα.

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκάσμος.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής 3.32 %.</p> <p>Αραιώστε 166 κ.εκ. προϊόντος σε νερό μέχρι την απόκτηση 5 λίτρων συνολικού όγκου διαλύματος για 100 m².</p> <p>Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του σκευάσματος μπορεί να φτάσει μέχρι 4 εβδομάδες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας στην οποία έχει εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί ανάλογα με την έκταση της προσβολής και μέχρι ένα μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη. Πλαστικό: Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο Μέγεθος: 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα.

Πίνακας 4. Χρήση #4


Για τον έλεγχο των μυγών σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<ul style="list-style-type: none"> • Εντοπίστε το χώρο που αναπαύονται οι μύγες και ψεκάστε την επιφάνεια. • Εφαρμόστε σε τοίχους σε πλαίσια παραθύρων και στο ταβάνι.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Musca domestica</i> : Οικιακή μύγα - Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκάσμος.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής 3.32% .</p> <p>Αραιώστε 166 κ.εκ. προϊόντος σε νερό μέχρι την απόκτηση 5 λίτρων συνολικού όγκου διαλύματος για 100 m².</p> <p>Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του σκευάσματος μπορεί να φτάσει μέχρι 4 εβδομάδες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας στην οποία έχει εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί ανάλογα με την έκταση της προσβολής και μέχρι ένα μέγιστο αριθμό 7 εφαρμογών ανά εποχή εμφάνισης μυγών (Απρίλιο έως Οκτώβριο).</p>

Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη. Πλαστικό: Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο Μέγεθος: 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα.

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	Οξεία Τοξικότητα Κατ. 1 Χρόνια Τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Κατ. 1
Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501-Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.
Άλλες φράσεις	EUH208- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH208- Περιέχει ένα μίγμα μεταξύ 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1 Επαγγελματική χρήση

<p>Ανάμιξη και ψεκασμός</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ψεκασμού είναι καθαρή και ελεύθερη από ελαιώδη υπολείμματα. Αν χρειάζεται πλύνετε το ψεκαστήρα με νερό και απορρυπαντικό πριν της χρήσης και διαθέστε τα νερά του ξεπλύματος σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές απαιτήσεις. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το μισό από τον απαιτούμενο όγκο νερού. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι και τη σφραγίδα της συσκευασίας του προϊόντος. Μετρήστε με ακρίβεια την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος και ρίξτε προσεκτικά (χωρίς μεγάλη πίεση) μέσα στη δεξαμενή/δοχείο ψεκασμού. Ολοκληρώστε το γέμισμα του δοχείου του ψεκαστικού με νερό και θέστε σε λειτουργία τον

αναδευτήρα. Αναδέψτε ξανά το δοχείο του ψεκαστικού αν υπάρξει παύση στην εφαρμογή που διαρκεί πάνω από 30 λεπτά.

- Εφαρμόστε με κατάλληλη λαβή ή με μηχανικό ψεκαστήρα ικανό να παρέχει ένα ψεκασμό σε σημείο που να αποφεύγεται η απορροή. Για την κατεργασία εκτεθειμένων επιφανειών χρησιμοποιήστε ακροφύσια τύπου flat-fan. Για να ψεκάσετε σε ρωγμές και εσοχές, χρησιμοποιήστε ακροφύσια τύπου pin-stream ή ειδικό εξάρτημα/επέκταση για ρωγμές και εσοχές Μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1 μ. Διατηρείτε μια κατάλληλη απόσταση μεταξύ ρύγχους και επιφάνειας ψεκασμού ώστε να πετύχετε το επιθυμητό πλάτος δέσμης.

Έλεγχος Εντόμων σε Κατοικημένους χώρους

- Μην ψεκάσετε απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Μην ψεκάσετε σε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που κοιμούνται στο κρεβάτι. Μην το χρησιμοποιείτε για τον ψεκασμό στρωμάτων ή ράντζων όπου κοιμούνται νεογνά.
- Αφαιρέστε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία και τις γυάλες πριν από την εφαρμογή.
- Σε χώρους που υποβάλλονται συχνά σε υγρό καθαρισμό, ψεκάστε ρωγμές και εσοχές μόνο με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1 μ. Για να το πετύχετε αυτό, μπορεί να είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε ειδικό εξοπλισμό ψεκασμού και να διατηρείτε την κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια όπου γίνεται η εφαρμογή.
- Ψεκάστε αρμούς τοίχων/πατώματος, μοκέτες, χαλιά κλπ, και ρωγμές και εσοχές όπου μπορούν να βρουν κάλυψη τα έντομα. Η μόνη καθολική εφαρμογή αυτού του προϊόντος είναι η εφαρμογή σε χαλιά ή μοκέτες. Προχωρήστε σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά ψεκάστε σε επικαλυπτόμενες ζώνες με απόσταση 0,5 μ. για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού υγρού.
- Το ψεκαστικό υγρό μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν έχει υποστεί βλάβη.
- Για τον έλεγχο εντόμων σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό: - ψεκάστε μόνο ρωγμές και εσοχές με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1 μ.
- Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του σκευάσματος μπορεί να φτάσει μέχρι 4 εβδομάδες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται. Ως εκ τούτου η εφαρμογή μπορεί να επαναλαμβάνεται ανάλογα την έκταση της προσβολής και μέχρι ένα μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως. Χώροι όπου εφαρμόστηκε το K-Othrine SC 7.5 μπορούν να κατοικηθούν ξανά από παιδιά, κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι επιφάνειες που ψεκάστηκαν. Μετά το στέγνωμα του ψεκασμένου υλικού συνιστάται καλός εξαερισμός των χώρων. Καθώς το K-Othrine SC 7.5 είναι υπολειμματικό εντομοκτόνο δεν συνιστάται η απόπλυση ή ο καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα του χώρου μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η μόλυνση.
- Καθώς η υπολειμματική διάρκεια δράσης των εντομοκτόνων σκευασμάτων γενικά μειώνεται σε πορώδεις επιφάνειες, συνιστάται όποτε είναι δυνατό η προτίμηση εφαρμογής τους σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Έλεγχος Εντόμων σε Κτηνιατρικές εγκαταστάσεις:

- Μην το ψεκάσετε απευθείας πάνω σε ζώα.
- Μην εφαρμόζετε σε χώρους που είναι σε απευθείας επαφή με ζώα.
- Αποφεύγετε κάθε πιτσίλισμα ή διασπορά του ψεκαστικού νέφους που θα μπορούσε να μολύνει τα ζώα και χώρο σίτισης τους. Αν χρειάζεται, καλύψτε το χώρο σίτισης με πλαστικό και απομακρύνετε τα ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σωστή υγιεινή της κτηνιατρικής εγκατάστασης και καλό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων που να

επιτρέπει την εύκολη και συχνή απομάκρυνση της κοπριάς.

- Διάστημα επανεισόδου: 6 ώρες (αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες από τον ψεκασμό).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όπου υπάρχουν λύματα/απόβλητα από κατοικία ζώων και/ή οι χώροι αποθήκευσης κοπριάς μπορούν να εκκενώνονται προς την δημοτική μονάδα αποχέτευσης λυμάτων ή προς επιφανειακά ύδατα.

Αρχές στρατηγικής για την διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατό, οι εφαρμογές πρέπει να συνδυάζονται και με μη-χημικά μέτρα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επί της ετικέτας.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να γίνονται στοχεύοντας τις πλέον ευάλωτα στάδια ανάπτυξης των παρασίτων.
- Όπου απαιτείται εκτεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται, και περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανή ένδειξη ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η εγγύτητα μη ψεκασμένων χώρων μπορεί να συμβάλλει στον κίνδυνο επαναμόλυνσης.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις στην ετικέτα, όταν εφαρμόζονται σωστά, δεν αποδίδουν το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και εμφανίζεται ανθεκτικότητα, η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής κατηγορίας θα πρέπει να διακόπτεται.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται ώστε τα κατοικίδια ζώα, τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές να μην έρχονται σε επαφή με αυτό.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται, καταναλώνονται ή αποθηκεύονται, τρόφιμα ή ζωοτροφές
- Αφαιρείτε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή. Καλύψτε δεξαμενές αποθήκευσης νερού, επιφάνειες παρασκευής φαγητού, εξοπλισμό παρασκευής φαγητού, και σκεύη σίτισης με αδιαπέραστο πλαστικό πριν από την εφαρμογή. Μετά την επεξεργασία αφαιρέστε όλο το πλαστικό και καθαρίστε τις επιφάνειες.
- Μην εφαρμόζετε σε χώρους που υποβάλλονται σε καθαρισμό ρουτίνας με υγρά.
- Οι επαγγελματίες χρήστες συνιστάται να φορούν γάντια και ολόσωμη φόρμα τόσο κατά την ανάμιξη όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.
- Μακριά από παιδιά

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Ενδέχεται να παρουσιαστεί δερματική ευαισθησία όπως αίσθηση καύσου ή κεντρίσματος στο πρόσωπο και στους βλεννογόνους. Ωστόσο, αυτές οι αισθήσεις δεν προκαλούν πληγές και είναι μεταβατικής φύσεως (μεγ. διάρκεια 24 ώρες).
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
- Πλύνετε τα χέρια και το δέρμα που εκτέθηκε πριν φάτε ή μετά τη χρήση.
- Ξεπλύνετε άμεσα. οποιαδήποτε μόλυνση από το δέρμα και τα μάτια

- Αποφύγετε την υπερβολική μόλυνση στα ρούχα εργασίας και πλένετε τα ρούχα τακτικά.
- Μην πιάνετε υφάσματα στα οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν μέχρι να στεγνώσουν και να αεριστούν καλά πριν από τη χρήση.
- Μην μολύνετε εδάφη, υδάτινους όγκους ή κανάλια με χημικά ή χρησιμοποιημένα δοχεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν ούτε το αραιωμένο διάλυμα του βιοκτόνου προϊόντος μέσω του συστήματος αποχέτευσης.

Η παρακάτω φράση πρέπει να αναφέρεται μόνο στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας: Το υπολείμμα του βιοκτόνου προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για Απόβλητα 2008/98/ΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων καθώς και τους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς.

Αποθηκεύετε τα βιοκτόνα προϊόντα στους αρχικούς περιέκτες. Μην αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα. Περιέκτες με υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να χειρίζονται ανάλογα.

Κωδικός απορρίμματος για παρασιτοκτόνα: 20 01 19

Κωδικός απορρίμματος για συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα ή που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες: 15 01 10

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης 2 χρόνια.

Να διατηρείται ο περιέκτης (το δοχείο) ερμητικά κλειστός.

Διατηρείται μόνο μέσα στον αρχικό περιέκτη.

Προστατέψτε από παγετό.

Να διατηρείται σε ασφαλή χώρο.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

6. Άλλες πληροφορίες

Ισχυρισμοί της ετικέτας σχετικά με τους οργανισμούς-στόχους πρέπει να διατυπώνονται όπως ορίζεται στο SPC.

Εάν απαιτείται εφαρμογή σε ευαίσθητα υφάσματα ή υλικά, που μπορεί να υποστούν βλάβη από το νερό, δοκιμάστε το ψεκαστικό διάλυμα πρώτα σε μικρή και κρυφή περιοχή του υφάσματος.