

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** 1351.0

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

**Číslo autorizácie:** SK22-022-00-000

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3:** SK-0014749-0011

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	4
5. Všeobecné pokyny pre použitie	7
5.1. Pokyny na používanie	7
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	7
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	7
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	7
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	8
6. Ďalšie informácie	8

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

Eimü Film-Dip-Konzentrat
--------------------------

### 1.2. Držiteľ autorizácie

**Názov a adresa držiteľa autorizácie**

Názov/Meno	Ferdinand Eimermacher GmbH und Co. KG
Adresa	Westring 24 48356 Nordwalde Nemecko

**Číslo autorizácie**

SK22-022-00-000 1-7
---------------------

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3**

SK-0014749-0011
-----------------

**Dátum autorizácie**

04/10/2022
------------

**Dátum skončenia platnosti autorizácie**

05/08/2032
------------

### 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

**Meno/Názov výrobcu**

F. Eimermacher GmbH & Co. KG
------------------------------

**Adresa výrobcu**

Westring 24 48356 Nordwalde Nemecko
-------------------------------------

**Miesto výrobných priestorov**

Westring 24 48356 Nordwalde Nemecko
-------------------------------------

### 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Independent Iodine Europe N.V
<b>Adresa výrobcu</b>	Hoogeind 43 2940 Stabroek Belgicko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Acf Minera SA, Chile no data Santiago Čile
<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	SQM Europe N.V.
<b>Adresa výrobcu</b>	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerpen Belgicko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Sociedad Quimica y Minera SA no data Santiago Čile
<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Norkem Limited
<b>Adresa výrobcu</b>	Bexton lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Spojené kráľovstvo
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo no data Santiago Čile
<b>Účinná látka</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	ISP Europe
<b>Adresa výrobcu</b>	Waterfield KT20 5HQ Tadworth Spojené kráľovstvo
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	ISP Chemicals inc., Highway 95 Industrial Complex P.O. Box 37 Calvert City, Kentucky Spojené štáty americké

## 2. Zloženie a úprava výrobku

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1,5625
Polyvinylpyrrolidone iodine		Účinná látka	25655-41-8		0,000001
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Iná ako účinná látka	112-34-5	203-961-6	0
Phosphoric acid	orthophosphoric acid	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0
Methanol	Methan-1-ol	Iná ako účinná látka	67-56-1	200-659-6	0
Alcohols C9-C11, ethoylated	AlcoholsC9-C11, ethoylated	Iná ako účinná látka	68439-46-3	500-446-0	0
Fatty alcohol alkoxyate 4	Fattyalcohol alkoxyate 4	Iná ako účinná látka	111905-53-4		0

## 2.2. Typ úpravy

SL - Rozpustný koncentrát

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia

Môže byť korozívna pre kovy.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Môže spôsobiť poškodenie orgánov štítnej žľazy pri dlhšej alebo opakovanej expozícii oral.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre..

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.Pokožku opláchnite vodou.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.Pokožku opláchnite sprchou.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára..

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára..

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

Zneškodnite nádobu v súlade s príslušnými národnými predpismi.

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

#### Použitie 1 - Dezinfekcia strukov (po dojení), rozprašovanie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje  Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne  Výrobok je koncentrát na dezinfekciu strukov u kráv, oviec a kôz (po dojení) pripravený na použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Rozprašovanie (s dávkovacím čerpadlom).
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Rozprašovanie (na každý struk): 5-15 ml/krava, 3-5 ml/koza, 3-5 ml/ovca Riedenie (%): 20 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: 2x/denne (po dojení), Doba pôsobenia: 5 minút.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová fľaša (HDPE): 500 ml (tlakový dávkovač), 1000 ml, Kanister (HDPE): 5 L, 20 L, 25 L, Sud (HDPE): 200 L, IBC nádrž (HDPE): 1000 L.

#### 4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nádobu na striekanie naplňte výrobkom pripraveným na použitie.  
Struky zvieratá po dojení úplne postriekajte (max. 2x denne).  
Výrobok musí byť rozriedený vodou (100 ml výrobku na 400 ml pitnej vody = 20 % rozriedenie). Na dávkovanie množstva koncentrátu sa používa odmerka. Potrebné množstvo nalejte do 10-litrového vedra a rozriedte vypočítaným množstvom vody podľa pokynov na etikete. Takto získanú zmes potom premiešajte pomocou miešacej tyče a naplňte ňou aplikačné zariadenie.  
Aplikácia: 5-15 ml na kravu / 3-5 ml na kozu / 3-5 ml na ovcu.  
Dbajte na to, aby kravy stáli až do uschnutia produktu (aspoň 5 minút). Produkt ponechajte na strukoch až do ďalšieho dojenia.  
Pred nasledujúcim dojením struky dôkladne a systematicky očistite mokrou alebo suchou handrou, aby ste ich pred nasadením dojacieho zariadenia na ďalšie dojenie zbavili zvyškov výrobku.  
Výrobok sa pred použitím musí zahriať na teplotu vyššiu 20 °C.

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred UV-žiarením/slniečným svetlom a teplom.  
Počas aplikácie používajte ochranné rukavice, odolné voči chemikáliám (materiál určí držiteľ povolenia v časti s informáciami o výrobku), kombinézu a čižmy odolné voči chemikáliám.  
Po manipulácii starostlivo umyte ruky.  
Odporúčame taký pracovný postup, aby nedochádzalo k nasledovnému: inhalácia výparov alebo aerosólov/hmly. Aplikujte iba v dobre vetraných priestoroch.  
Ak je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po dojení, musí sa na dezinfekciu pred dojením použiť iný výrobok bez obsahu jódu.  
Uchovávajte mimo dosahu detí.

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Špecifiká možných nežiadúcich priamych alebo nepriamych vedľajších účinkov: Pri bežnom použití výrobku v súlade s etiketou nie sú známe.  
Návod na poskytnutie prvej pomoci:  
Pri kontakte s pokožkou: Po kontakte s pokožkou, okamžite umyte veľkým množstvom vody.  
Pri zasiahnutí očí: Okamžite oplachujte najmenej 15 minút veľkým množstvom vody, aj pod očnými viečkami. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.  
Po požití: Po požití okamžite zavolajte lekársku pomoc (volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára) a majte pri sebe balenie alebo štítok.

#### 4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Po ošetrovaní nepoužitý výrobok a obal zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. V závislosti od miestnych požiadaviek možno použitý výrobok spláchnuť do komunálnej kanalizácie alebo vyhodiť na skládku hnoja. Zabráňte uvoľneniu do individuálnej čističky odpadových vôd.

#### 4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri všeobecné skladovacie podmienky a trvanlivosť výrobku.

### 4.2 Opis použitia

#### Použitie 2 - Dezinfekcia strukov (po dojení), namáčanie

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	-
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	<p>Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnútorne</p> <p>Výrobok je koncentrát na dezinfekciu strukov u kráv, oviec a kôz (po dojení) pripravený na použitie.</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Spôsob: namáčanie Detailný opis: -</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Aplikačná dávka: Namáčanie (na každý struk): 4-6 ml/krava 1-2 ml/koza 1-2 ml/ovca Riedenie (%): 20%, 100 ml výrobku zriediť v 400 ml vody. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: 2x/denne (po dojení), Doba pôsobenia: 5 minút.</p>
<b>Katégoria(ie) používateľ'ov</b>	Profesionálne
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Plastová fľaša (HDPE): 500 ml (tlakový dávkovač), 1000 ml, Kanister (HDPE): 5 L, 20 L, 25 L, Sud (HDPE): 200 L, IBC nádrž (HDPE): 1000 L.</p>

#### 4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nádobu na namáčanie naplňte výrobkom pripraveným na použitie.  
Celé struky zvieratá po dojení namočte do roztoku (maximálne 2x denne).  
Výrobok musí byť rozriedený vodou (100 ml výrobku na 400 ml pitnej vody = 20 % rozriedenie) Na dávkovanie množstva koncentráту sa používa odmerka. Potrebné množstvo nalejte do 10-litrového vedra a rozriedte vypočítaným množstvom vody podľa pokynov na etikete. Takto získanú zmes potom premiešajte pomocou miešacej tyče a naplňte ňou aplikačné zariadenie.  
Aplikácia: 4-6 ml na kravu / 1-2 ml na kozu / 1-2 ml na ovcu.  
Dbajte na to, aby kravy stáli až do uschnutia produktu (aspoň 5 minút). Produkt ponechajte na strukoch až do ďalšieho dojenja.  
Pred nasledujúcim dojením struky dôkladne a systematicky očistite mokrou alebo suchou handrou, aby ste ich pred nasadením dojacieho zariadenia na ďalšie dojenie zbavili zvyškov výrobku.  
Výrobok sa pred použitím musí zahriať na teplotu vyššiu 20 °C.

#### 4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred UV-žiarením/slnecným svetlom a teplom. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.  
Odporúčame taký pracovný postup, aby nedochádzalo k nasledovnému: inhalácia výparov alebo aerosólov/hmly. Aplikujte iba v dobre vetraných priestoroch.  
Ak je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po dojení, musí sa na dezinfekciu pred dojením použiť iný výrobok bez obsahu jódu.



Uchovávajte mimo dosahu detí.

#### **4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Špecifiká možných nežiadúcich priamych alebo nepriamych vedľajších účinkov: Pri bežnom použití výrobku v súlade s etiketou nie sú známe.  
Návod na poskytnutie prvej pomoci:  
Pri kontakte s pokožkou: Po kontakte s pokožkou, okamžite umyte veľkým množstvom vody.  
Pri zasiahnutí očí: Okamžite oplachujte najmenej 15 minút veľkým množstvom vody, aj pod očnými viečkami. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.  
Po požití: Po požití okamžite zavolajte lekársku pomoc (volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára) a majte pri sebe balenie alebo štítok.

#### **4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Po ošetrovaní nepoužitý výrobok a obal zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. V závislosti od miestnych požiadaviek možno použitý výrobok spláchnuť do komunálnej kanalizácie alebo vyhodiť na skládku hnoja. Zabráňte uvoľneniu do individuálnej čističky odpadových vôd.

#### **4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Pozri všeobecné skladovacie podmienky a trvanlivosť výrobku.

### **5. Všeobecné pokyny pre použitie**

#### **5.1. Pokyny na používanie**

Pozri pokyny na používanie meta SPC 4 špecifické pre dané použitie.  
Vždy si prečítajte etiketu alebo sprievodný leták pred použitím a dodržiavajte všetky poskytnuté pokyny.

#### **5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika**

Pozri opatrenia na zmiernenie rizika pri používaní meta SPC 4 špecifické pre dané použitie.

#### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Pozri údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia meta SPC 4 špecifické pre dané použitie.

#### **5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Pozri návod na bezpečné zneškodnenie výrobku alebo jeho obalu meta SPC 4 špecifické pre dané použitie.

## 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Nádoby uchovávajúte pevne uzavreté, na chladnom mieste. Chráňte pred UV-žiarením/slniečným svetlom. Neskladujte pri teplotách nad 40°C.

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania:

Neuchovávajúte v blízkosti potravín, nápojov a krmív.

Skladovateľnosť výrobku predstavuje 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

## 6. Ďalšie informácie