

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0016895-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0016895-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	7
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	8
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	8
6. Další informace	8

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50%
TravelDeet 50% spray

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Primmed BV
	Adresa	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nizozemsko
Číslo povolení	CZ-0016895-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0016895-0000	
Datum udělení povolení	14/01/2015	
Datum skončení platnosti povolení	24/12/2024	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Tropenzorg B.V.
Adresa výrobce	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Niverpack, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Nizozemsko
	Belcofill BV, Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgie

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	23 - N,N-diethyl-m-toluamid
Název výrobce	Vertellus Performance Material Inc.
Adresa výrobce	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené státy
Umístění výrobních závodů	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené státy

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
N,N-diethyl-m-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	50
ethanol		Neúčinná látka			49,999

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti	<p>Vysoce hořlavá kapalina a páry.</p> <p>Způsobuje vážné podráždění očí.</p> <p>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p>
Pokyny pro bezpečné zacházení	<p>Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.</p> <p>Uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p>Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.</p> <p>Nevdechujte aerosoly.</p> <p>Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.</p>

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obal /obal na sběrné místo pro drobný chemický odpad..

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Použití jako prostředek proti komárům a klíšťatům pro člověka.

Typ přípravku	Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Použití jako prostředek proti komárům a klíšťatům pro člověka. Komárovití (Culicidae): Komáři rodu - Culex spp Komáři rodu - Anopheles spp Komáři rodu - Aedes spp Klíšťatovití - Ixodoidea
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Culicidae: Obecný název: Mosquitoes Vývojové stadium: Dospělci Hmyz, savci (například hlodavci) Latinský název: Ixodoidea Obecný název: Ticks Vývojové stadium: Dospělci Hmyz, savci (například hlodavci)
Oblast použití	Vnitřní Venkovní V interiéru v dobře větraných prostorech a venku.
Metoda(y) aplikace	Metoda: Stříkání Podrobný popis: <ul style="list-style-type: none">Úsporné množství přípravku naneste pečlivě na nezakryté části těla; rovnoměrně ho rozetřete na kůži.Oblékejte dlouhé kalhoty a/nebo triko s dlouhým rukávem.Držte rozstříkovač ve vzdálenosti minimálně 15 cm od pokožky, nestříkejte přímo na obličej. Pro ochranu obličeje proti kousnutí/bodnutí naneste Care Plus DEET nejprve do dlaní a poté si ho rozetřete na obličej.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: • Úsporné množství přípravku naneste pečlivě na nezakryté části těla; rovnoměrně ho rozetřete na kůži. Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace:

	Nanášejte přípravek maximálně jednou denně.
Kategorie uživatelů	Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	Láhev, Plast: HDPE , 60ml 60ml nádobka z vysokohustotního polyethylenu s rozstříkovačem Opatřeno reliéfním označením rizik.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- Úsporné množství přípravku naneste pečlivě na nezakryté části těla; rovnoměrně ho rozetřete na kůži.
- Oblékejte dlouhé kalhoty a/nebo triko s dlouhým rukávem.
- Držte rozstříkovač ve vzdálenosti minimálně 15 cm od pokožky, nestříkejte přímo na obličej. Pro ochranu obličeje proti kousnutí/bodnutí naneste Care Plus DEET nejprve do dlaní a poté si ho rozetřete na obličej.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Nepoužívejte u dětí mladších 18 let.
- Nepoužívejte více než jednou denně.
- Nenanášejte pod oblečení.
- Zamezte styku s očima, sliznicí, nosem nebo rty a s narušenou pokožkou.
- Nenanášejte Care Plus DEET na místa, na kterých je kůže kvůli pohybu kloubů ohýbána častěji, než je běžné; nenanášejte tedy do podkolenních nebo loketních jamek.
- Používáte-li výrobek spolu s opalovacím přípravkem, naneste nejprve tento opalovací přípravek, počkejte 30 minut a až poté naneste Care Plus DEET.
- Zamezte styku s potravinami.
- Před jídlem nebo pitím si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

- Přípravek Care Plus DEET není vhodný pro použití u zranitelných skupin, jako jsou těhotné a kojící ženy.
- Jakmile již nepotřebujete chránit před komáry nebo klíšťaty, nebo pokud se objeví podráždění, pokožku ošetřenou tímto přípravkem omyjte.
- Produkt používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- Produkt nevdechujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zamezte styku s plasty (např. obroučkami brýlí), se syntetickým nebo koženým oblečením a s lakovanými povrchy.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

První pomoc:

Při vdechnutí: Zaveďte postiženého na čerstvý vzduch a umístěte ho do polohy, ve které se mu pohodlně dýchá. Pokud postižený stále cítí nevolnost, poradte se s lékařem.

Při zasažení očí: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při požití: Nechte postiženého vypít jednu či dvě sklenice vody, vypláchnout ústa a vyvolejte u něj zvracení prstem v krku. Pokud postižený upadl do bezvědomí, nevyvolávejte u něj zvracení, ani mu nic nedávejte do úst. Pokud postižený cítí nevolnost, neprodleně kontaktujte lékaře.

Při styku s otevřenou ranou: omyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, poradte se s lékařem.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Rozstříkovač již nepoužívejte pro jiné účely.

Zbytky výrobku zlikvidujte nejlépe jako drobný chemický odpad.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Předpokládaná trvanlivost výrobku je 5 let v původní nádobce.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

- Úsporné množství přípravku naneste pečlivě na nezakryté části těla; rovnoměrně ho rozetřete na kůži.
- Oblékejte dlouhé kalhoty a/nebo triko s dlouhým rukávem.
- Držte rozstříkovač ve vzdálenosti minimálně 15 cm od pokožky, nestříkejte přímo na obličej. Pro ochranu obličeje proti kousnutí/bodnutí naneste Care Plus DEET nejprve do dlaní a poté si ho rozetřete na obličej.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Nepoužívejte u dětí mladších 18 let.
- Nepoužívejte více než jednou denně.
- Nenanášejte pod oblečení.
- Zamezte styku s očima, sliznicí, nosem nebo rty a s narušenou pokožkou.
- Nenanášejte Care Plus DEET na místa, na kterých je kůže kvůli pohybu kloubů ohýbána častěji, než je běžné; nenanášejte tedy do podkolenních nebo loketních jamek.
- Používáte-li výrobek spolu s opalovacím přípravkem, naneste nejprve tento opalovací přípravek, počkejte 30 minut a až poté naneste Care Plus DEET.
- Zamezte styku s potravinami.
- Před jídlem nebo pitím si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
- Přípravek Care Plus DEET není vhodný pro použití u zranitelných skupin, jako jsou těhotné a kojící ženy.
- Jakmile již nepotřebujete chránit před komáry nebo klíšťaty, nebo pokud se objeví podráždění, pokožku ošetřenou tímto přípravkem omyjte.
- Produkt používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.
- Produkt nevdechujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zamezte styku s plasty (např. obroučkami brýlí), se syntetickým nebo koženým oblečením a s lakovanými povrchy.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

Při vdechnutí: Zaveďte postiženého na čerstvý vzduch a umístěte ho do polohy, ve které se mu pohodlně dýchá. Pokud postižený stále cítí nevolnost, poraďte se s lékařem.

Při zasažení očí: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při požití: Nechte postiženého vypít jednu či dvě sklenice vody, vypláchnout ústa a vyvolejte u něj zvracení prstem v krku. Pokud postižený upadl do bezvědomí, nevyvolávejte u něj zvracení, ani mu nic nedávejte do úst. Pokud postižený cítí nevolnost, neprodleně kontaktujte lékaře.

Při styku s otevřenou ranou: omyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Rozstříkovač již nepoužívejte pro jiné účely.
Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Předpokládaná doba trvanlivosti přípravku je 5 let v původním obalu.

6. Další informace