

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

VI-POWER WAX BLOCK

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0191

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0028753-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	VI-POWER WAX BLOCK
-------------------	--------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	EKOSAN International d.o.o.
	Διεύθυνση	Dunajska cesta 136 1000 Ljubljana Σλοβενία
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0191
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0028753-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		13/07/2022
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	EKOSAN doo
Διεύθυνση παρασκευαστή	Batajnički drum 13, br 7 11080 Beograd Σερβία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	EKOSAN doo, Kružni put 100 11309 Leštane - Beograd Σερβία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Βρωμαδιολόνη
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Dr. Tezza s.r.l. - Via Tre Ponti 22 37059 S.Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,0027 % (β/β)
Denatonium benzoate	benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diazanium; benzoate	Μη δραστική ουσία	3734-33-6	223-095-2	0,001 % (β/β)
Calcium hydroxide	calcium; dihydroxide	Μη δραστική ουσία	1305-62-0	215-137-3	0,375 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση { 1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης: }.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς..

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Ποντικοί – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο -
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0.0027 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Τσάντα/σάκος με σήμανση ή εκτύπωση σε PE/Αλουμίνιο/ Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg. Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε επισημασμένο ή τυπωμένο κουβά HDPE (σφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει δολώματα

μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.

Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε τυπωμένο χαρτοκιβώτιο ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 3 kg έως 25 kg (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακουλάκια χωριστά συσκευασμένα σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως στη συνέχεια, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και να αφαιρούνται τα σώματα τρωκτικών. Ξαναγεμίστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σταθμούς δολώματος κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Αρουραίοι – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό με τα τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο -
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δόλωμα ανά σταθμό δολώματος. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας σταθμοί δολώματος, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών δολώματος πρέπει να είναι 5 μέτρα. Αραίωση (%): -

	Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Τσάντα/σάκος με σήμανση ή εκτύπωση σε PE/Αλουμίνιο/ Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε επισημασμένο ή τυπωμένο κουβά HDPE (σφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε τυπωμένο χαρτοκιβώτιο ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 3 kg έως 25 kg (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακουλάκια χωριστά συσκευασμένα σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν σώματα τρωκτικών. Ξαναγεμίστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σταθμούς δολώματος κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Ποντικοί και/ή αρουραίοι – επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν έχει σχέση με τα μυοκτόνια.

<p>Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</p>	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -</p>
<p>Πεδίο(α) χρήσης</p>	<p>χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>Υπαίθριος γύρω από κτίρια</p>
<p>Μέθοδος(οι) εφαρμογής</p>	<p>Μέθοδος: άλλο: Ready-to-use bait</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις.</p>
<p>Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Ποντίκι σπιτιού: 60 g δόλωμα ανά σταθμό δολώματος. Καφέ αρουραίος: 100 g δόλωμα ανά σταθμό δολώματος. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας σταθμοί δολώματος, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών δολώματος πρέπει να είναι 5 μέτρα.</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -</p>
<p>Κατηγορία(ες) χρηστών</p>	<p>επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Τσάντα/σάκος με σήμανση ή εκτύπωση σε PE/Αλουμίνιο/ Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε επισημασμένο ή τυπωμένο κουβά HDPE (σφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε τυπωμένο χαρτοκιβώτιο ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε ξεχωριστές συσκευασμένες σακούλες σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα με μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 10 kg.</p>

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τους σταθμούς δολώματος σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισκέπτονται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στο] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως στη συνέχεια, προκειμένου να ελέγξετε εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και αφαιρούν πτώματα τρωκτικών. Ξαναγεμίστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε έναν σταθμό δολώματος στον οποίο το δόλωμα έχει υποστεί ζημιά από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Κατά την τοποθέτηση σταθμών δολώματος κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, ποτάμια άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (επαγγελματίες)".

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Ποντικοί – Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν έχει σχέση με τα μυοκτόνια.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο -
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ready-to-use bait Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 60 g δόλωμα ανά σταθμό δολώματος. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας σταθμοί δολώματος, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών δολώματος πρέπει να είναι 5 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Τσάντα/σάκος με σήμανση ή εκτύπωση σε PE/Αλουμίνιο/ Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο): από 10 g έως 100 g

(που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).

Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε επισημασμένο ή τυπωμένο κουβά HDPE (σφραγισμένο): 10 g έως 100 g (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).

Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε φακελάκι από χαρτόνι με ετικέτα ή εκτύπωση ή σε χαρτόνι με ετικέτα ή εκτύπωση: από 10 g έως 100 g (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως στη συνέχεια, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και να αφαιρούνται τα σώματα τρωκτικών. Ξαναγεμίστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν έχει σχέση με τα μυοκτόνια.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο -
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ready-to-use bait Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δόλωμα ανά σταθμό δολώματος. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας σταθμοί δολώματος, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών δολώματος πρέπει να είναι 5 μέτρα.

	Αραιώση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Τσάντα/σάκος με σήμανση ή εκτύπωση σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο): από 100 g έως 300 g (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε επισημασμένο ή τυπωμένο κουβά HDPE (σφραγισμένο): από 100 g έως 300 g (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστερ (θερμικά συγκολλημένο) σε χαρτοκιβώτιο με ετικέτα ή τυπωμένο χαρτόνι ή σε επισημασμένο ή τυπωμένο χαρτόνι: από 100 g έως 300 g (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).</p>

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν σώματα τρωκτικών. Ξαναγεμίστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν έχει σχέση με τα μυοκτόνια.

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Υπαίθριος γύρω από κτίρια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ready-to-use bait Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο δόλωμα για χρήση σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δόλωμα κεριού ανά σταθμό δολώματος. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας σταθμοί δολώματος, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών δολώματος πρέπει να είναι 5 μέτρα Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Τσάντα/σάκος με σήμανση ή εκτύπωση σε PE/Αλουμίνιο/ Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο): από 100 g έως 300 g (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε επισημασμένο ή τυπωμένο κουβά HDPE (σφραγισμένο): από 100 g έως 300 g (που περιέχει δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).</p> <p>Τσάντα/σάκος σε PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρα (θερμικά συγκολλημένο) σε χαρτοκιβώτιο με ετικέτα ή τυπωμένο χαρτόνι ή σε επισημασμένο ή τυπωμένο χαρτόνι: από 100 g έως 300 g (που περιέχουν δολώματα μυοκτονίας 10-20 g σε μπλοκ κεριού).</p>

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους σταθμούς δολώματος σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε έναν σταθμό δολώματος στον οποίο το δόλωμα έχει υποστεί ζημιά από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.
- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον εβδομαδιαίως στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν σώματα τρωκτικών. Ξαναγεμίστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές οδηγίες χρήσης (ευρύ κοινό)".

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματίες

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης πριν από τη χρήση του.
- Διενέργεια έρευνα πριν από το δόλωμα της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπια εκτίμηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη των τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητάς τους και να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι άμεσα εφικτά για τρωκτικά (π.χ. χυμένο σιτάρι ή απόβλητα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή λίγο πριν από τη θεραπεία, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά πιο δύσκολη την αποδοχή του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Εξετάστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. τρύπες βύσματος, αφαιρέστε τα πιθανά τρόφιμα και ποτά στο μέτρο του δυνατού) για να βελτιώσετε την πρόσληψη προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισης.
- Οι σταθμοί δολωμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές ταξιδιού, θέσεις φωλιάσματος, τροφοδοσίες, τρύπες, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δολώματος πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισημαίνονται με σαφή ένδειξη ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. Ενότητα "Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιδράσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος" για τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και ειδοποίηση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και να αναφέρει τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης, να είναι διαθέσιμα παράλληλα με τα δολώματα.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να ανασυρθεί από τον σταθμό δολώματος.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα αγροκτήματος και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (καουτσούκ) κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος.
- Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το φαινομενικό μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των σταθμών δολώματος σε άλλα μέρη και τη δυνατότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.
- Εάν μετά από περίοδο θεραπείας 35 ημερών συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όπου έχουν αποκλειστεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε σκεφτείτε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους σταθμούς δολώματος στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Γενικό Δημόσιο

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης πριν από τη χρήση του.
- Πριν από τη χρήση προϊόντων τρωκτικοκτόνου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι άμεσα εφικτά για τρωκτικά (π.χ. χυμένο σιτάρι ή απόβλητα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή λίγο πριν από τη θεραπεία, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά πιο δύσκολο να επιτευχθεί η αποδοχή του δολώματος.
- Οι σταθμοί δολώματος θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές ταξιδιού, θέσεις φωλιάσματος, τροφοδοσίες, τρύπες, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δολώματος πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Τοποθετήστε σταθμούς δολώματος μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, αγροτικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε σταθμούς δολώματος μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε σταθμούς δολώματος κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό.
- Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους σταθμούς δολώματος στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Επαγγελματίες

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε τυχόν τυχαίους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής θεραπείας και του περιβάλλοντός τους) για την εκστρατεία ελέγχου των τρωκτικών.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. Ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:
 - το προϊόν δεν θα διατίθεται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες").
 - το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις (π.χ. "χρήση μόνο σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβίαση").
 - οι χρήστες επισημαίνουν σωστά τους σταθμούς δολώματος με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα 5.3 του SPC (π.χ. ετικέτα σταθμών δολώματος σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά μέσα σε 35 ημέρες. Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. Ετικέτα και/ή φυλλάδιο) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας έως το τέλος της θεραπείας (δηλαδή η δραστηριότητα των τρωκτικών εξακολουθεί να παρατηρείται), ο χρήστης πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει ένα παράσιτο υπηρεσία ελέγχου.
- Μην πλένετε τους σταθμούς δολώματος με νερό μεταξύ εφαρμογών.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Γενικό Δημόσιο

- Εξετάστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (βιδώστε τρύπες, αφαιρέστε τα πιθανά τρόφιμα και ποτά στο μέτρο του δυνατού) για να βελτιώσετε την πρόσληψη προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή για ανίχνευση δραστηριότητας τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. Ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι: το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις (π.χ. "χρήση μόνο σε σταθμούς δολώματος ανθεκτικούς σε παραβιάσεις"). οι χρήστες επισημαίνουν σωστά δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα 5.3 του SPC (π.χ. "ετικέτα σταθμών δολώματος σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά μέσα σε 35 ημέρες. Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. Ετικέτα και/ή φυλλάδιο) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας έως το τέλος της θεραπείας (δηλαδή η δραστηριότητα των τρωκτικών εξακολουθεί να παρατηρείται), ο χρήστης πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει ένα παράσιτο υπηρεσία ελέγχου.
- Αναζητήστε και αφαιρέστε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δολώματος.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Επαγγελματίες

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση που:

Δερματική έκθεση, πλύνετε το δέρμα με νερό και μετά με νερό και σαπούνι.

Έκθεση στα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό ή ξέπλυμα ματιών, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.

- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείστε ή ανοίξτε". "περιέχει τρωκτικοκτόνο" "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης" · "δραστική ουσία (εξ)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων ή 118.

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

Γενικό Δημόσιο

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση που:

Δερματική έκθεση, πλύνετε το δέρμα με νερό και μετά με νερό και σαπούνι.

Έκθεση στα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό ή ξέπλυμα ματιών, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος [εισαγάγετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα]. Επικοινωνήστε με κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο [εισαγάγετε συγκεκριμένες πληροφορίες χώρας].

- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείστε ή ανοίξετε". "περιέχει τρωκτικοκτόνο" "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης" · "δραστική ουσία (ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε ένα κέντρο δηλητηριάσεων [εισαγάγετε τον εθνικό αριθμό τηλεφώνου]".

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Επαγγελματίες

- Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το άφατο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Ευρύ κοινό

- Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το άφατο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Επαγγελματίες

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία υψηλότερη από 35 ° C. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

- Φυλάσσετε σε μέρη που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και αγροτικών ζώων.

- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

Γενικό Δημόσιο

-
- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία υψηλότερη από 35 ° C. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
 - Φυλάσσετε σε μέρη που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και αγροτικών ζώων.
 - Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ενδέχεται να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την αποτελεσματική κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, μην χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες κατά την απόρριψή τους.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια βαφή.