

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: Spenių mirkymo produktai jodo pagrindu

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0020125-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** EU-0020125-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	3
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	3
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta PCS 1 – koncentratui profesionaliam naudojimui, skiedimui santykiu 1: 3, 1: 4 ir 1: 7	3
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	5
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	12
6. Kita informacija	14
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	14
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta PCS 2 – paruošti naudoti produktai profesionaliam naudojimui prieš ir po melžimo	16
2. Meta SPC sudėtis	17
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	17
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	18
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	39
6. Kita informacija	40
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	41
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta PCS 3 – paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui prieš ir po melžimo (LuxSpray 15)	43
2. Meta SPC sudėtis	43
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	44
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	44
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	65
6. Kita informacija	67
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	67

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

Spenių mirkymo produktai jodo pagrindu

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	GEA Farm Technologies GmbH
	Adresas	Siemensstraße 25-27 59199 Bönen Vokietija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020125-0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0020125-0000	
Autorizacijos liudijimo data	19/11/2019	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/10/2029	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	GEA Farm Technologies
Gamintojo adresas	Wyllye Works BA12 9HT Warminster Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Wyllye Works, Watery Lane BA12 9HT Warminster Jungtinė Karalystė
	Gewerbestraße 5 5325 Plainfeld Austrija
	ul. Ołowiana 10 85-461 Bydgoszcz Lenkija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	SQM Europe N.V.
Gamintojo adresas	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp Belgija
Gamybos vieta	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes 4290 Piso 4 Santiago Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Gamintojo adresas	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Japonija
Gamybos vieta	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Japonija

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Norkem Ltd
Gamintojo adresas	Norkem House, Bexton Lane, WA16 9FB Knutsford Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	OFICINA CALA CALA S/N Unknown POZO ALMONTE Čilė

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,16 - 2,47
C9-11 alkoholio etoksilatų	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekinių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0 - 2,35

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 1 – koncentratui profesionaliam naudojimui, skiedimui santykiu 1: 3, 1: 4 ir 1: 7

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,58 - 2,47
C9-11 alkoholio etoksilat	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekinių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	1,51 - 2,35

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali pakenkti organams (skyd liaukei) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .
Gali išdinti metalus.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Neįkvėpti garų.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietinius reikalavimus.
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius reikalavimus.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Koncentratui profesionaliam naudojimui, skiedimui santykiu 1: 3, 1: 4 ir 1: 7, mirkymui po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti atskiesto produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai trečdaliai spenio ilgio. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Atskiesto produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml; (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Produktą reikia atskiesti atitinkamu etiketėje nurodytu santykiu: 25 % (1 dalis produkto ir 3 dalys vandens), 20 % (1 dalis produkto ir 4 dalys vandens) arba 12,5 % (1 dalis produkto ir 7 dalys vandens). Darbinių tirpalų jodo koncentracija yra nuo 0,29 iki 0,52 %. Taikymo skaičiaus ir laikas: Vienam gyvuliui 2 kartai per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į atskiestą produktą iškart po melžimo.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dirbant su koncentratu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir naudoti akių apsaugą (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Koncentratai profesionaliam naudojimui, skiedimui santykiu 1: 3, 1: 4 ir 1: 7, purškimui po melžimo.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: apipurškimas
Išsamus aprašymas:

Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra atskiesto produkto talpykloje. Atskiestas produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami atskiestu produktu.

Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą atskiestu produktu. Purkštuvu apipurškšti du apatinius spenių trečdalius.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Atskiesto produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Produktą reikia atskiesti atitinkamu etikečių nurodytu santykiu: 25 % (1 dalis produkto ir 3 dalys vandens), 20 % (1 dalis produkto ir 4 dalys vandens) arba 12,5 % (1 dalis produkto ir 7 dalys vandens). Darbinių tirpalų jodo koncentracija yra nuo 0,29 iki 0,52 %.

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Vienam gyvuliui 2 kartai per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, apipurkšti atskiestu produktu iškart po melžimo.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dirbant su koncentratu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir naudoti akių apsaugą (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparius batus (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Būtina dėvėti apsauginį apsiaustą (bent 6 tipo, EN 13034).

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Koncentratai profesionaliam naudojimui, skiedimui santykiu 1: 3, 1: 4 ir 1: 7, apdorojimui putomis po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrasis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrasis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklėlį, susimaišo su oru ir susidaro putas. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Atskiesto produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Produktą reikia atskiesti atitinkamu etikedėje nurodytu santykiu: 25 % (1 dalis produkto ir 3 dalys vandens), 20 % (1 dalis produkto ir 4 dalys vandens) arba 12,5 % (1 dalis produkto ir 7 dalys vandens). Darbinių tirpalų jodo koncentracija yra nuo 0,29 iki 0,52 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Vienam gyvuliui 2 kartai per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į atskiestą produktą iškart po melžimo.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dirbant su koncentratu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir naudoti akių apsaugą (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę arba informacinį lapelį ir laikykitės visų pateiktų nurodymų.

Prieš naudojimą produktą reikia laikyti aukštesnėje nei 20 ° C temperatūroje.

Prieš naudojimą atskiesti produktą etiketėje nurodytu santykiu.

Koncentrato skiedimas rankiniu būdu. Siekiant gauti reikiamą skiedimo santykį į tinkamo dydžio talpyklą įpilti koncentrato ir vandens produkto etiketėje nurodytu santykiu. Gerai išmaišyti.

Prieš pritvirtinant melžiklį reikia pašalinti nuo spenių visus mirkalų likučius vienkartinė servetėle arba daugkartinio naudojimo šluoste. Vienai karvei reikia naudoti vieną šluostę.

Siekiant baktericidinio ir mielicidinio produkto poveikio, produkto sąlytis su oda turi tęstis mažiausiai 60 sekundžių.

Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žiūrėti 2.1.4.2 punktą atitinkamam naudojimui būdai.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Prieš naudodami pakartotinai, nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius.

Įkvėpus: atsitiktinai įkvėpus perkaitimo ar degimo metu susidariusių garų, reikia išeiti į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: atsargiai nuplauti vandeniu ir muilu. Jei odos sudirgimas nepraeina, pasitarti su gydytoju. Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po vokais, ne trumpiau nei 15 minučių. Kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus: skalauti burną ir gerti daug vandens. Niekada nieko neduoti į burną sąmonės netekusiui asmeniui. Pasitarti su gydytoju.

Didelius išsiliejusius produkto kiekius reikia surinkti chemikalų išsiliejimo rinkiniu, surinkti absorbuojančia medžiaga, pvz., diatomitu, ir pašalinti kaip pavojingas atliekas.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po procedūros nepanaudotą produktą ir jo pakuotę išmeskite pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų, galima išpilti į buitinių nuotekų sistemas arba mėšlo saugyklas. Vengti patekimo į atskirą ūkio nuotekų valymo įrenginį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio.

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

Tinkamumo laikas – 12 mėnesių.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Ioklene Concentrate, CoarsDual

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0020125-0001 1-1

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 alkoholio etoksilatatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	1,51

Prekinis pavadinimas

Clinidip L Concentrate, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0020125-0002 1-1

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 alkoholio etoksilatatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	1,96

Prekinis pavadinimas

Dunglison Super IO 421 Concentrate, Clinidip Superconcentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0020125-0003 1-1

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 alkoholio etoksilatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekinių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	2,35

Prekinis pavadinimas

Priodine, Diamond Predip

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0020125-0004 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 alkoholio etoksilatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekinių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	2,21

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 2 – paruošti naudoti produktai profesionaliam naudojimui prieš ir po melžimo

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,16 - 0,5
C9-11 alkoholio etoksilatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekinių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0 - 0,56

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Gali ėsdinti metalus.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius reikalavimus.
talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietinius reikalavimus.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, mirkymui prieš melžimą

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti paruošto naudoti produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenių trečdaliai. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %. Taikymo skaičius ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, purškimui prieš melžimą.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: apipurškimas
Išsamus aprašymas:

Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra paruošto naudoti produkto talpykloje. Paruoštas naudoti produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami paruoštu naudoti produktu.

Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą paruoštu naudoti produktu. Purkštuvu apipurškšti du apatinius spenių trečdalius.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, apdorojimui putomis prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)**

Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: mirkymas
Išsamus aprašymas:

Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklelį, susimaišo su oru ir susidaro putos. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai.
Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, mirkymui po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti paruošto naudoti produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,50 %. Taikymo skaičiaus ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo. Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Paruošti naudoti produktai - paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, purškimui po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: apipurškimas Išsamus aprašymas: Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra paruošto naudoti produkto talpykloje. Paruoštas naudoti produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami paruoštu naudoti produktu. Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą paruoštu naudoti produktu. Purkštuvu apipurškšti du apatinius spenių trečdalius.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).

	<p>Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,50 %.</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 10 l</p> <p>DTPE talpykla, 20 l</p> <p>DTPE talpykla, 25 l</p> <p>DTPE talpykla, 200 l</p> <p>DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p> <p>DTPE talpykla, 5 l</p> <p>Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.</p> <p>Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.</p>

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, apipurkšti paruoštu naudoti produktu iškart po melžimo. Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Būtina dėvėti apsauginį apsiaustą (bent 6 tipo, EN 13034).

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Paruošti naudoti produktai - paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, apdorojimui putomis po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: mirkymas
Išsamus aprašymas:
Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklelį, susimaišo su oru ir susidaro putos. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai.
Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,50 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.



4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo. Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7 Naudokite aprašymą

Naudojimas 7 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, mirkymui prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos</p>
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti paruošto naudoti produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti.</p> <p>Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %. Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.</p> <p>Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 10 l</p> <p>DTPE talpykla, 20 l</p> <p>DTPE talpykla, 25 l</p>

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo:

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo.

Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Šį produktą galima naudoti prieš ir po melžimo. Tačiau, nenaudoti produkto kartu su kitu, jodo sudėtyje turinčiu, produktu.

4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8 Naudokite aprašymą

Naudojimas 8 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, purškimui prieš ir po melžimo.

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: apipurškimas Išsamus aprašymas: Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra paruošto naudoti produkto talpykloje. Paruoštas naudoti produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami paruoštu naudoti produktu. Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą paruoštu naudoti produktu. Purkštuvu apipurškšti du apatinius spenių trečdalius.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %.

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.

Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.8.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo:

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, apipurkšti paruoštu naudoti produktu iškart po melžimo.

Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.8.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Būtina dėvėti apsauginį apsiaustą (bent 6 tipo, EN 13034).

Šį produktą galima naudoti prieš ir po melžimo. Tačiau, nenaudoti produkto kartu su kitu, jodo sudėtyje turinčiu, produktu.

4.8.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9 Naudokite aprašymą

Naudojimas 9 - Paruošti naudoti produktai - paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, apdorojimui putomis prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos</p>
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklelį, susimaišo su oru ir susidaro putos. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %. Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.</p> <p>Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 10 l</p> <p>DTPE talpykla, 20 l</p> <p>DTPE talpykla, 25 l</p>

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.9.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo:

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo.

Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.9.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Apdorojant putomis, mūvėti apsaugines chemines pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Šį produktą galima naudoti prieš ir po melžimo. Tačiau, nenaudoti produkto kartu su kitu, jodo sudėtyje turinčiu, produktu.

4.9.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę arba informacinį lapelį ir laikykitės visų pateiktų nurodymų.

Prieš naudojimą produktą reikia laikyti aukštesnėje nei 20 ° C temperatūroje.

Produktą galima naudoti per visą laktacijos laikotarpį.

Prieš pritvirtinant melžiklį reikia pašalinti nuo spenių visus mirkalų likučius vienkartinę servetėlę arba daugkartinio naudojimo šluostę. Vienai karvei reikia naudoti vieną šluostę.

Siekiant baktericidinio ir mielicidinio produkto poveikio, produkto sąlytis su oda turi tęstis mažiausiai 60 sekundžių

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žiūrėti 4.2 punktą atitinkamam naudojimo būdui.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos

instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Prieš naudodami pakartotinai, nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius.

Įkvėpus: atsitiktinai įkvėpus perkaitimo ar degimo metu susidariusių garų, reikia išeiti į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: atsargiai nuplauti vandeniu ir muilu. Jei odos sudirgimas nepraeina, pasitarti su gydytoju. Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po vokais, ne trumpiau nei 15 minučių. Kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus: skalauti burną ir gerti daug vandens. Niekada nieko neduoti į burną sąmonės netekusiems asmeniui. Pasitarti su gydytoju.

Didelius išsiliejusius produkto kiekius reikia surinkti chemikalų išsiliejimo rinkiniu, surinkti absorbuojančia medžiaga, pvz., diatomitu, ir pašalinti kaip pavojingas atliekas.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po procedūros nepanaudotą produktą ir jo pakuotę išmeskite pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų, galima išpilti į buitinių nuotekų sistemas arba mėšlo saugyklas. Vengti patekimo į atskirą ūkio nuotekų valymo įrenginį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio.

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

Tinkamumo laikas – 12 mėnesių.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslai sudėtis

Prekinis pavadinimas	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0020125-0005 1-2	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 alkoholio etoksilatų	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0,305

Prekinis pavadinimas	LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0020125-0006 1-2	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 alkoholio etoksilatatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0,56

Prekinis pavadinimas

LuxDip 50B, Postguard

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0020125-0007 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 alkoholio etoksilatatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0

Prekinis pavadinimas

LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal locare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, Coars Iodogel

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0020125-0008 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 alkoholio etoksilatatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0,5

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 3 – paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui prieš ir po melžimo (LuxSpray 15)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,16 - 0,16
C9-11 alkoholio etoksilatatas	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0,166 - 0,166

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius reikalavimus.

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietinius reikalavimus.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, mirkymui prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrasis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Metodas: atvira sistema: mirkymas

Naudojimo metodas (-ai)

Išsamus aprašymas:

Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti paruošto naudoti produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti.

Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16–0,30 %.
Taikymo skaičius ir laikas:
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, purškimui po melžimo.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

-

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: apipurškimas
Išsamus aprašymas:
Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra paruoštas naudoti produkto talpykloje. Paruoštas naudoti produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami paruoštu naudoti produktu.
Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą paruoštu naudoti produktu. Purkštuvu apipurškšti du apatinius spenių trečdalius.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpykla, 10 l
DTPE talpykla, 20 l
DTPE talpykla, 25 l
DTPE talpykla, 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l
DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, apdorojimui putomis prieš melžimą

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklelį, susimaišo su oru ir susidaro putos. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %. Taikymo skaičiaus ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, mirkymui po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrasis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: mirkymas
Išsamus aprašymas:

Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti paruošto naudoti produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti.

Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą

melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija 0,16 %.
Taikymo skaičius ir laikas:
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, purškimui po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: atvira sistema: apipurškimas Išsamus aprašymas: Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra paruošto naudoti produkto talpykloje. Paruoštas naudoti produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami paruoštu naudoti produktu. Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą paruoštu naudoti produktu. Purkštuvu apipurkšti du apatinius spenių trečdalius.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %. Taikymo skaičiaus ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 25 l DTPE talpykla, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l DTPE talpykla, 5 l</p> <p>Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.</p> <p>Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra</p>

sertifikuotos JT.

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo. Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, apdorojimui putomis po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklelį, susimaišo su oru ir susidaro putos. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %. Taikymo skaičius ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 25 l DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo. Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7 Naudokite aprašymą

Naudojimas 7 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, mirkymui prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo indu. Įpilti paruošto naudoti produkto į tradicinio mirkymo indo su atbuliniais vožtuvais talpyklą. Užsukti aplikatoriaus dalį. Suspausti talpyklą, kad aplikatorius užsipildytų tirpalu. Pamerkti spenius į tirpalą taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Po kiekvieno melžimo likusį nepanaudotą tirpalą išpilti. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams. Prieš kitą melžimą indus reikia pripildyti nauju tirpalu.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %. Taikymo skaičiai ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą . Vienam gyvuliui 2 kartai per parą po melžimo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo:

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo.

Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant, mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).
Šį produktą galima naudoti prieš ir po melžimo. Tačiau, nenaudoti produkto kartu su kitu, jodo sudėtyje turinčiu, produktu.

4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8 Naudokite aprašymą

Naudojimas 8 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, purškimui prieš ir po melžimo.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

-

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visos

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrasis pavadinimas: mielės
Vystymo stadija: Visos

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: atvira sistema: apipurškimas
Išsamus aprašymas:
Naudojimas su pneumatiniu purkštuvu. Purškimo sistemos įsiurbimo vamzdelis yra paruošto naudoti produkto talpykloje. Paruoštas naudoti produktas siurbiamas į purškimo vamzdelį, esantį melžimo patalpoje. Tada, du apatiniai spenių trečdaliai apipurškiami paruoštu naudoti produktu.
Naudojimas su rankiniu purkštuvu. Užpildyti purkštuvu talpą paruoštu naudoti produktu. Purkštuvu apipurkšti du apatinius spenių trečdalius.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml).
Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą .
Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.



4.8.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo:
Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, apipurkšti paruoštu naudoti produktu iškart po melžimo.
Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.8.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).
Būtina dėvėti apsauginį apsiaustą (bent 6 tipo, EN 13034).
Šį produktą galima naudoti prieš ir po melžimo. Tačiau, nenaudoti produkto kartu su kitu, jodo sudėtyje turinčiu, produktu.

4.8.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9 Naudokite aprašymą

Naudojimas 9 - Paruošti naudoti produktai – paruoštas naudoti skystis profesionaliam naudojimui, apdorojimui putomis prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visos Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: Visos
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema: mirkymas Išsamus aprašymas: Naudojimas su mirkymo putose indu. Paspaudus mirkymo indo talpą, skystis, patekdamas pro tankų tinklelį, susimaišo su oru ir susidaro putos. Pamerkti spenius į putas taip, kad būtų apsemti du apatiniai spenio trečdaliai. Tą patį tirpalą vieno melžimo metu galima naudoti keliems gyvuliams.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Paruošto naudoti produkto kiekis, naudojamas vienam gyvuliui per vieną kartą: karvės ir buivolės – 3-10 ml (rekomenduojama 5 ml); avys – 1,5-5 ml (rekomenduojama 1,5 ml); ožkos – 2,5-6 ml (rekomenduojama 2,5 ml). Skiedimas (%): Paruošto naudoti produkto jodo koncentracija yra 0,16 %. Taikymo skaičiaus ir laikas: Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą prieš melžimą. Vienam gyvuliui naudoti 2 kartus per parą po melžimo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 25 l

DTPE talpykla, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

DTPE talpykla, 5 l

Visų talpyklų, išskyrus 200 l (200 kg) ir 1 000 l (1 000 kg), spalva gali būti sidabrinė arba natūrali (baltai permatoma). 200 l (200 kg) talpyklos yra arba sidabro, arba mėlynos spalvos. IBC konteineriai yra natūralios spalvos.

Visos talpyklos yra uždarytos sandarumą žyminčiais dangteliais arba kamšteliais ir yra sertifikuotos JT.

4.9.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo:

Spenius, mažiausiai per 2/3 ilgio, pamerkti į paruoštą naudoti produktą iškart po melžimo.

Kad būtų užtikrintas pakankamas sąlyčio laikas, reikia pasirūpinti, kad produktas po naudojimo nebūtų nuvalytas (pvz., karvės turi pastovėti mažiausiai 5 minutes).

4.9.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Apdorojant putomis, mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Šį produktą galima naudoti prieš ir po melžimo. Tačiau, nenaudoti produkto kartu su kitu, jodo sudėtyje turinčiu, produktu.

4.9.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę arba informacinį lapelį ir laikykitės visų pateiktų nurodymų.

Prieš naudojimą produktą reikia laikyti aukštesnėje nei 20 ° C temperatūroje.

Produktą galima naudoti per visą laktacijos laikotarpį.

Prieš pritvirtinant melžiklį reikia pašalinti nuo spenių visus mirkalų likučius vienkartinė servetėle arba daugkartinio naudojimo šluoste. Vienai karvei reikia naudoti vieną šluostę.

Siekiant baktericidinio ir mielicidinio produkto poveikio, produkto sąlytis su oda turi tęstis mažiausiai 60 sekundžių.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žiūrėti 4.2 punktą atitinkamam naudojimui būdai.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Prieš naudodami pakartotinai, nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius.

Įkvėpus: atsitiktinai įkvėpus perkaitimo ar degimo metu susidariusių garų, reikia išeiti į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: atsargiai nuplauti vandeniu ir muilu. Jei odos sudirgimas nepraeina, pasitarti su gydytoju. Patekus į akis: nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po vokais, ne trumpiau nei 15 minučių. Kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus: skalauti burną ir gerti daug vandens. Niekada nieko neduoti į burną sąmonės netekusiems asmeniui. Pasitarti su gydytoju.

Didelius išsiliejusius produkto kiekius reikia surinkti chemikalų išsiliejimo rinkiniu, surinkti absorbuojančia medžiaga, pvz., diatomitu, ir pašalinti kaip pavojingas atliekas.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po procedūros nepanaudotą produktą ir jo pakuotę išmeskite pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų, galima išpilti į buitinių nuotekų sistemas arba mėšlo saugyklas. Vengti patekimo į atskirą ūkio nuotekų valymo įrenginį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio.

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

Tinkamumo laikas – 12 mėnesių.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslus sudėtis

Prekinis pavadinimas

LuxSpray 15, Kristal locare Pre, Super Pre,
Priodine RTU

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė
autorizacija)

EU-0020125-0009 1-3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 alkoholio etoksilatų	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (6 mol EO vidutinis molinis santykis) Galimi įvairūs prekių ženklų pavadinimai, įskaitant „Imbentin C-91-060“	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	614-482-0	0,166

