

**SL**

***PRILOGA***

**POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

Brodifacoum 25ppm Blocks - Professional and Non-Professional Use

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

**Številka dovoljenja:** SI-0030245-0000

**Številka proizvoda v R4BP:** SI-0030245-0000

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Solo 25 Blox Jaguar 25 Blox Final 25 Blox Brodifacoum zavitki 25 ppm - Za profesionalno uporabo
--------------	--

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Bell Laboratories Netherlands B.V.
	Naslov	De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam drugo: Netherlands
Številka dovoljenja		SI-0030245-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0030245-0000
Datum dovoljenja		09/01/2023
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		01/07/2025

### 1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Bell Laboratories Inc.
Naslov proizvajalca	6551 N Towne Rd WI 53598 Windsor Združene države
Kraj proizvodnih obratov	6501 N Towne Rd WI 53598 Windsor Združene države

### 1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Brodifakum
Ime proizvajalca	Activa S.r.l
Naslov proizvajalca	Via Feltre 32 20132 Milano Italija
Kraj proizvodnih obratov	Tezza s.r.l. Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italija

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-napthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna snov	56073-10-0	259-980-5	0,0025
Kalijev sorbat	Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat	Neaktivna snov	24634-61-5	246-376-1	1

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H373: Lahko škoduje organom (krvi) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ..
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

## Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Tabela 1. Uporaba št. 1 – Hišne miši – Strokovni uporabniki - Notranjost objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  Notranjost objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: ## - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20-50 g na posamezno vabo na postaji za vabo. če je potrebna več kot ena postaja za vabo, naj bo razdalja med vabami 2 do 4 metre.  Redčenje (%): -  Število in časovni razpored uporabe:  Visoka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsaka 2 metra Nizka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsake 4 metre  Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

---

#### **4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Postaje za vabe morate preverjati vsaj na 2 do 3 dni ob začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

- *[Kadar so na voljo]* Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte splošna navodila za uporabo

### **4.2. Opis uporabe**

**Tabela 2. Tabela 2. Uporaba št. 2 – Hišne miši – Usposobljeni strokovnjaki - Notranjost objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  Notranjost objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: ## - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 do 50 g na posamezno vabo na mestu za vabo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe:  Visoka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsaka 2 metra Nizka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsake 4 metre  Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka.

- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

---

#### 4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in v bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev v skladu z veljavnimi kodeksi za najboljše prakse.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
- Izdelka ne uporabljajte kot trajne vabe za preprečevanje infestacije glodavcev ali nadzor njihove aktivnosti.
- Izdelek ni namenjen za pulzno nastavljanje vab.

#### 4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### 4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

#### 4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

### 4.3. Opis uporabe

**Tabela 3. Tabela 3. Uporaba št. 3 – Podgane – Strokovni uporabniki – Notranjost objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
-----------------	--



Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i>  Splošno ime: brown rat  Razvojna faza: mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i>  Splošno ime: brown rat  Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i>  Splošno ime: drugo: Črna podgana  Razvojna faza: mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i>  Splošno ime: drugo: Črna podgana  Razvojna faza: odrasli</p>
Področje(-a) uporabe	<p>uporaba v zaprtih prostorih</p> <p>Notranjost objektov</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na postaji za vabo</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Visoka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 5 metrov.  Nizka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 10 metrov.</p> <p>Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- 
- Podgane: Postaje za vabe morate preverjati na samo 5 do 7 dni po začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.
  - [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

#### **4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### **4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte splošna navodila za uporabo

### **4.4. Opis uporabe**

**Tabela 4. Tabela 4. Uporaba št. 4 – Podgane – Usposobljeni strokovnjaki – Notranjost objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i>  Splošno ime: brown rat  Razvojna faza: mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i>  Splošno ime: brown rat  Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i>  Splošno ime: drugo: Črna podgana  Razvojna faza: mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i>  Splošno ime: drugo: Črna podgana  Razvojna faza: odrasli</p>
Področje(-a) uporabe	<p>uporaba v zaprtih prostorih</p> <p>Notranjost objektov</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na postaji za vabo</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p>Visoka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 5 metrov.  Nizka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 10 metrov.</p> <p>Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in v bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev v skladu z veljavnimi kodeksi za najboljše prakse.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.

- 
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
  - Izdelka ne uporabljajte kot trajne vabe za preprečevanje infestacije glodavcev ali nadzor njihove aktivnosti.
  - Izdelek ni namenjen za pulzno nastavljanje vab.

#### **4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### **4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka.
- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

#### **4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte splošna navodila za uporabo

### **4.5. Opis uporabe**

#### **Tabela 5. Tabela 5. Uporaba št. 5 – Hišne miši – Strokovni uporabniki – Zunanost okoli objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
-----------------	--

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Zunanost okoli objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: ## - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 do 50 g na posamezno vabo na mestu za vabo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe:  Visoka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsaka 2 metra. Nizka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsake 4 metre. Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabo zaščitite pred vremenskimi pogoji (npr. dežjem, snegom itd.). Postaje za vabe namestite na področja, kjer ni nevarnosti za poplave.

Postaje za vabe morate preverjati vsaj na 2 do 3 dni ob začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

- V postajah za vabe zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.

- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

---

#### 4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.

#### 4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### 4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### 4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

### 4.6. Opis uporabe

**Tabela 6. Tabela 6. Uporaba št. 6 – Hišne miši – Usposobljeni strokovnjaki – Zunanost okoli objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Zunanost okoli objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: ## - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 do 50 g na posamezno vabo na mestu za vabo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe:  Visoka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsaka 2 metra. Nizka raven infestacije: (20-50) g vabe na mesto za vabe, na vsake 4 metre.  Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe zaščitite pred vremenskimi pogoji. Za nameščanje vab izberite področja, kjer ni nevarnosti za poplave.
  - Zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
  - Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka.
  - Pri zunanji uporabi morate postaje za vabe pokriti in namestiti na strateška mesta za čim manjšo izpostavljenost neciljnim vrstam.
- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

---

#### **4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.6.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
- Tega izdelka ne uporabljajte kot trajne vabe za preprečevanje infestacije glodavcev ali nadzor njihove aktivnosti.
- Ta izdelek ni namenjen za pulzno nastavljanje vab.
- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.

#### **4.6.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Pri nameščanju vab v bližini površinskih voda (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, nasipov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode preprečite stik z vodo.

#### **4.6.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.6.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.7. Opis uporabe**



**Tabela 7. Tabela 7. Uporaba št. 7 – Podgane – Strokovni uporabniki – Zunanost okoli objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i>          Splošno ime: brown rat          Razvojna faza: mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i>          Splošno ime: brown rat          Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i>          Splošno ime: drugo: Črna podgana          Razvojna faza: mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i>          Splošno ime: drugo: Črna podgana          Razvojna faza: odrasli</p>
Področje(-a) uporabe	<p>uporaba na prostem</p> <p>Zunanost okoli objektov in območja skladiščenja hrane</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Visoka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 5 metrov.</p> <p>Nizka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 10 metrov.</p> <p>Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih. Poskrbite za stalno oskrbo s svežo vabo 14-28 dni ali dokler znaki aktivnosti podgan ne prenehajo.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	

---

Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))
--

#### **4.7.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

- Vabe zaščitite pred vremenskimi pogoji. Za nameščanje vab izberite področja, kjer ni nevarnosti za poplave.
- Zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
- Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka.
- Pri zunanji uporabi morate postaje za vabe pokriti in namestiti na strateška mesta za čim manjšo izpostavljenost neciljnim vrstam.
- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

#### **4.7.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.7.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.

#### **4.7.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Pri nameščanju postaj za vabe v bližini površinskih voda (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, nasipov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode preprečite stik z vodo.

#### **4.7.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.7.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### 4.8. Opis uporabe

**Tabela 8. Tabela 8. Uporaba št. 8 – Podgane - Usposobljeni strokovnjaki - Zunanost okoli objektov in območja skladiščenja hrane**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: drugo: Črna podgana Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: drugo: Črna podgana Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Zunanost okoli objektov in območja skladiščenja hrane
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje, in pokritih mestih za vabe.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe:  Visoka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 5 metrov.  Nizka raven infestacije: (100-225) g vabe na mesto za vabe, na vsakih 10 metrov.  Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih. Poskrbite za stalno oskrbo s svežo vabo 14-28 dni ali dokler znaki aktivnosti podgan ne prenehajo.

Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.8.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe zaščitite pred vremenskimi pogoji. Za nameščanje vab izberite področja, kjer ni nevarnosti za poplave.
  - Zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
  - Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka.
  - Pri zunanji uporabi morate postaje za vabe pokriti in namestiti na strateška mesta za čim manjšo izpostavljenost necljnim vrstam.
- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

#### 4.8.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.8.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
- Tega izdelka ne uporabljajte kot trajne vabe za preprečevanje infestacije glodavcev ali nadzor njihove aktivnosti.
- Ta izdelek ni namenjen za pulzno nastavljanje vab.
- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.

#### 4.8.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

#### 4.8.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

#### 4.8.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

### 4.9. Opis uporabe

**Tabela 9. Tabela 9. Uporaba št. 9 – Podgane – Usposobljeni strokovnjaki – Kanalizacija**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči  Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	drugo: Drugo  Kanalizacija
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: - Vaba, pripravljena na pritrditev ali uporabo v stacionarnih postajah za vabe ali pokritih mestih za vabe, s čimer preprečite stik vabe z odpadnimi vodami.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na vstopno odprtino v kanal  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe: Visoka raven infestacije: 100 do 225 g na vstopno odprtino v kanal. Nizka raven infestacije: 100 do 225 g na vstopno odprtino v kanal.

	Redno preverjajte, ali je vaba zaužita, in zamenjajte zaužito ali pokvarjeno vabo, dokler se zaužitje ne preneha. Ponovite uporabo vab v primerih, ko obstajajo dokazi o novi infestaciji.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### **4.9.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

- Vabe morate namestiti tako, da ne pridejo v stik z vodo in jih voda ne more odplaviti.
- *[Kadar so na voljo]* Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

#### **4.9.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.9.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- *[Če tako zahtevajo državni predpisi ali zakonodaja]* Vabe nameščajte le v kanalizacijske sisteme, ki so povezani s čistilno napravo.
- Ta izdelek ni namenjen za pulzno nastavljanje vab.

#### **4.9.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### **4.9.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošna navodila za uporabo

#### 4.9.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

#### 4.10. Opis uporabe

**Tabela 10. Tabela 10. Uporaba št. 10 – Hišne miši – Splošna javnost – Notranjost objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Rodenticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: odrasle živali in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo, v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 do 50 g na posamezno vabo na postaji za vabo. Redčenje (%): - Število in časovni razpored uporabe: 20-50 g na posamezno vabo na postaji za vabo. Če je potrebna več kot ena postaja za vabo, naj bo razdalja med postajami za vabo 2 do 4 metre. Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

---

--	--

#### 4.10.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje za vabe morate preverjati vsaj na 2 do 3 dni ob začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

#### 4.10.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.10.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.10.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.10.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.10.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.11. Opis uporabe

**Tabela 11. Tabela 11. Uporaba št. 11 – Podgane – Splošna javnost – Notranjost objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
-----------------	--



Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Rodenticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: odrasle živali in mladiči  Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: drugo: Črna podgana Razvojna faza: drugo: odrasle živali in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  Notranjost objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo, v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na postaji za vabo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe:  100-225 g na posamezno vabo na postaji za vabo. Če je potrebna več kot ena postaja za vabo, naj bo razdalja med mesti za vabe 5 do 10 metrov.  Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.11.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje za vabe morate preverjati na samo 5 do 7 dni po začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

---

#### 4.11.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.11.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.11.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.11.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošno navodilo za uporabo

#### 4.11.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošno navodilo za uporabo

### 4.12. Opis uporabe

**Tabela 12. Tabela 12. Uporaba št. 12 – Podgane – Splošna javnost – Zunanost okoli objektov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Rodenticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat

	<p>Razvojna faza: drugo: odrasle živali in mladiči</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i></p> <p>Splošno ime: drugo: Črna podgana</p> <p>Razvojna faza: drugo: odrasle živali in mladiči</p>
Področje(-a) uporabe	<p>uporaba na prostem</p> <p>- Vaba, pripravljena na uporabo, v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo, v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 100 do 225 g na posamezno vabo na postaji za vabo</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>100-225 g na posamezno vabo na postaji za vabo. Če je potrebna več kot ena postaja za vabo, naj bo razdalja med postajami za vabo 5 metrov.</p> <p>Določite območja, kjer bodo glodavci verjetno našli in zaužili vabo. Običajno so ta območja ob stenah, ob izgrizenih odprtinah, v kotih in na skritih mestih.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Velikosti paketa 3 kg – 10 kg (zavitki po 15 g, 20 g, 28 g, 50 g, 200 g, 225 g, dobavljeni v neprozornih vedrih iz polietilena visoke gostote (HDPE) s pokrovom iz polietilena nizke gostote (LDPE))

#### 4.12.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje za vabe namestite na področja, kjer ni nevarnosti za poplave.
- V postajah za vabe zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
- Postaje za vabe morate preverjati na samo 5 do 7 dni po začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

---

**4.12.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

**4.12.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte splošno navodilo za uporabo

**4.12.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte splošno navodilo za uporabo

**4.12.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte splošno navodilo za uporabo

**4.12.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte splošno navodilo za uporabo

---

## Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO<sup>1</sup>

### 5.1. Navodila za uporabo

#### Usposobljeni strokovnjaki

- Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije o izdelku in vse spremne informacije, ki jih prejmete z izdelkom ali na mestu nakupa.
- Pred nameščanjem vab izvedite ogled infestiranega območja in oceno na terenu, da identificirate vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določite verjetni razlog in obseg infestacije.
- Odstranite hrano, ki je dosegljiva glodavcem (npr. raztrošeno zrnje ali odpadki hrane). Razen tega ne izvajajte čiščenja infestiranega območja tik pred nameščanjem vab, ker s tem samo zmotite populacijo glodavcev in otežite sprejem vab.
- Izdelek lahko uporabljate samo kot del integriranega sistema upravljanja škodljivcev, vključno s higienskimi ukrepi in, kjer je mogoče, s fizičnimi načini nadzora.
- Izdelek morate namestiti v neposredno bližino območij, kjer ste opazili aktivnost glodavcev (npr. poti gibanja, legla, mesta hranjenja, luknje, brlogi itd.).
- Kjer je mogoče, morate postaje za vabe pritrditi na tla ali druge strukture.
- Postaje za vabe morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in premikanje ali odpiranje postaj ni dovoljeno (glejte odsek 5.1.3 za seznam informacij, ki morajo biti navedene na oznaki).
- [Če tako zahtevajo državni predpisi ali zakonodaja] Ko je izdelek v uporabi na javnih področjih, morajo biti mesta uporabe označena med obdobjem uporabe in ob vabah mora biti prikazano obvestilo z razlago nevarnosti za primarno ali sekundarno zastrupitev z antikoagulanti ter prvimi potrebnimi ukrepi v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odvreči iz postaje za vabo.
- Izdelek namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih ljubljencev in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Izdelka ne nameščajte v bližini hrane, pijače in krme za živali ter tudi pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Pri ravnanju z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN374).
- Med uporabo izdelka ne smete jesti, piti ali kaditi. Po uporabi izdelka si umijte roke in neposredno izpostavljeno kožo.
- Pogostost obiskov na območju uporabe določi izvajalec v skladu s pregledom, ki je bil izveden ob začetku uporabe. Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili zadevnega kodeksa najboljših praks.
- Če je uživanje vab nizko v primerjavi z velikostjo infestacije, premislite o spremembi mest uporabe vab in o možnosti spremembe formulacije vab.
- Če po pretečenem obdobju uporabe 35 dni škodljivci vabe še vedno uživajo in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če izločite vse ostale elemente, je najbolj verjetno, da so prisotni odporni glodavci, zato premislite o uporabi rodenticidov brez antikoagulacijskega učinka, kjer je to mogoče, ali o uporabi rodenticida z močnejšim antikoagulacijskim učinkom. Premislite tudi o uporabi pasti kot alternativnem nadzoru.

---

<sup>1</sup>Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

---

## Strokovni uporabniki

- Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije o izdelku in vse spremne informacije, ki jih prejmete z izdelkom ali na mestu nakupa.
- Pred nameščanjem vab izvedite ogled infestiranega območja in oceno na terenu, da identificirate vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določite verjetni razlog in obseg infestacije.
- Odstranite hrano, ki je dosegljiva glodavcem (npr. raztrošeno zrnje ali odpadki hrane). Razen tega ne izvajajte čiščenja infestiranega območja tik pred nameščanjem vab, ker s tem samo zmotite populacijo glodavcev in otežite sprejem vab.
- Izdelek lahko uporabljate samo kot del integriranega sistema upravljanja škodljivcev, vključno s higienskimi ukrepi in, kjer je mogoče, s fizičnimi načini nadzora.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Postaje za vabe morate namestiti v neposredno bližino območij, kjer ste opazili aktivnost glodavcev (npr. poti gibanja, legla, mesta hranjenja, luknje, brlogi itd.).
- Kjer je mogoče, morate postaje za vabe pritrditi na tla ali druge strukture.
- Postaje za vabe morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in premikanje ali odpiranje postaj ni dovoljeno (glejte odsek 5.3 za seznam informacij, ki morajo biti navedene na oznaki).
- [Če tako zahtevajo državni predpisi ali zakonodaja] Ko je izdelek v uporabi na javnih področjih, morajo biti mesta uporabe označena med obdobjem uporabe in ob vabah mora biti prikazano obvestilo z razlago nevarnosti za primarno ali sekundarno zastrupitev z antikoagulantni ter prvimi potrebnimi ukrepi v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odvreči iz postaje za vabo.
- Izdelek namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih ljubljencev in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Izdelka ne nameščajte v bližini hrane, pijače in krme za živali ter tudi pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Pri ravnanju z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN374).
- Med uporabo izdelka ne smete jesti, piti ali kaditi. Po uporabi izdelka si umijte roke in neposredno izpostavljeno kožo.
- Če je uživanje vab nizko v primerjavi z velikostjo infestacije, premislite o spremembi mest uporabe vab in o možnosti spremembe formulacije vab.
- Če po pretečenem obdobju uporabe 35 dni škodljivci vabe še vedno uživajo in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če izločite vse ostale elemente, je najbolj verjetno, da so prisotni odporni glodavci, zato premislite o uporabi rodenticidov brez antikoagulacijskega učinka, kjer je to mogoče, ali o uporabi rodenticida z močnejšim antikoagulacijskim učinkom. Premislite tudi o uporabi pasti kot alternativnemu ukrepu za nadzor.
- Po koncu obdobja uporabe odstranite preostale vabe ali postaje za vabe.

## Nepoklicni uporabniki

- 
- Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije o izdelku in vse spremne informacije, ki jih prejmete z izdelkom ali na mestu nakupa.
  - Pred uporabo rodenticidov razmislite o nekemičnih metodah nadzora (npr. pasti).
  - Odstranite hrano, ki je dosegljiva glodavcem (npr. raztrošeno zrnje ali odpadki hrane).
- Razen tega ne izvajajte čiščenja infestiranega območja tik pred nameščanjem vab, ker s tem samo zmotite populacijo glodavcev in otežite sprejem vab.
- Postaje za vabe namestite v neposredno bližino območij, kjer ste opazili aktivnost glodavcev (npr. poti gibanja, legla, mesta hranjenja, luknje, brlogi itd.).
  - Kjer je mogoče, morate postaje za vabe pritrditi na tla ali druge strukture.
  - Postaje za vabe namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih ljubljencev in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
  - Postaj za vabe ne nameščajte v bližini hrane, pijače in krme za živali ter tudi pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
  - Postaj za vabe ne nameščajte blizu sistemov za odtok vode, kjer bi lahko prišle v stik z vodo.
  - Med uporabo izdelka ne smete jesti, piti ali kaditi. Po uporabi izdelka si umijte roke in neposredno izpostavljeno kožo.
  - Po koncu obdobja uporabe odstranite preostale vabe ali postaje za vabe.

## 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

### Usposobljeni strokovnjaki

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite o izvajanju nadzora glodavcev.
- V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ali letak) je jasno navedeno, da je izdelek namenjen samo usposobljenim strokovnim uporabnikom z licenco, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami glede usposabljanja (npr. »samo za strokovno uporabo«).
- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino.
- Izdelkov ni dovoljeno uporabljati več kot 35 dni brez ocene stanja infestacije in učinkovitosti uporabe vab.
- Uporabe različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo močjo ne smete rotirati za namene upravljanja odpornosti. Za rotacijo različnih sredstev razmislite o uporabi rodenticidov brez antikoagulacijskega učinka, kjer je to mogoče, ali o uporabi rodenticida z močnejšim antikoagulacijskim učinkom.
- Postaj za vabe in pripomočkov v uporabi v pokritih in zaščitenih mestih za vabe ne pomivajte z vodo med različnimi obdobji uporabe.
- Mrtve glodavce zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Kadar uporabljate postaje za vabe, ki so odporne na odpiranje, morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in poseganje vanje ni dovoljeno.
- Preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce med uporabo vab v rednih intervalih (razen pri uporabi v kanalizaciji), vsaj tako pogosto, kot se preverjajo in/ali polnijo vabe. Mrtve glodavce zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

### Strokovni uporabniki

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite o izvajanju nadzora glodavcev.
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev preverite in odstranjujte mrtve glodavce med uporabo vab v rednih intervalih (npr. vsaj dvakrat na teden).
- Izdelkov ni dovoljeno uporabljati več kot 35 dni brez ocene stanja infestacije in učinkovitosti uporabe vab.
- Vab, ki vsebujejo antikoagulacijske aktivne učinkovine, ne uporabljajte kot trajne vabe za preprečevanje infestacije glodavcev ali nadzor njihove aktivnosti.
- V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ali letak) je jasno navedeno, da izdelek ni namenjen splošni javnosti (npr. »samo za strokovno uporabo«). Uporabniki morajo postaje za vabe pravilno označiti z informacijami iz poglavja 5.2.3 povzetka značilnosti izdelka (npr. »označevanje postaj v skladu s priporočili za izdelek«).

- 
- Z uporabo tega izdelka bi se morali glodavcev rešiti v 35 dneh. V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ ali letak) je jasno priporočeno, da mora uporabnik v primeru suma na nizko učinkovitost ob koncu obdobja uporabe (npr. še vedno je mogoče opaziti aktivnost glodavcev) pridobiti nasvet dobavitelja izdelka ali poklicati službo za nadzor škodljivcev.
  - Med posameznimi obdobji uporabe postaj za vabe ne pomivajte z vodo.
  - Mrtve glodavce zavržite v skladu z lokalnimi predpisi..

### **Nepoklicni uporabniki**

- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
  - Vab, ki vsebujejo antikoagulacijske rodenticide, ne uporabljajte kot trajne vabe (npr. za preprečevanje infestacije glodavcev ali zaznavanje njihove aktivnosti).
  - V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ ali letak) je jasno navedeno, da je izdelek treba uporabljati v ustreznih postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje (npr. »uporaba samo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje«). Uporabniki morajo postaje za vabe pravilno označiti z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti izdelka (npr. »označevanje postaj v skladu s priporočili za izdelek«).
  - Pri uporabi tega izdelka bi se morali glodavcev rešiti v 35 dneh. V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ ali letak) je jasno priporočeno, da mora uporabnik v primeru suma na nizko učinkovitost ob koncu obdobja uporabe (npr. še vedno je mogoče opaziti aktivnost glodavcev) pridobiti nasvet dobavitelja izdelka ali poklicati službo za nadzor škodljivcev.
- Preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce med uporabo vsaj tako pogosto, kot se preverjajo postaje za vabe.
- Mrtve glodavce zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Ta izdelek vsebuje antikoagulacijsko učinkovino. Pri zaužitju lahko simptomi, ki so lahko tudi zakasneni, vključujejo krvavenje iz nosu in krvaveče dlesni. V resnih primerih lahko pride do pojava modric in prisotnosti krvi v blatu ali urinu.
  - Protistrup: Vitamin K1, ki ga lahko odmeri samo medicinsko/veterinarsko osebje.
  - V primeru:
    - izpostavljenosti kože jo umijte z vodo ter nato še z vodo in milom.
    - izpostavljenosti oči jih izperite s tekočino za izpiranje oči ali z vodo, veke imejte odprte vsaj 10 minut.
    - izpostavljenosti ust jih pazljivo izperite z vodo. Nezavestnim osebam nikoli ne dajajte ničesar v usta. Ne izzovite bruhanja. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite vsebnik izdelka ali oznako na izdelku.
- Če izdelek zaužije hišni ljubljencek, se za pomoč obrnite na veterinarskega kirurga.
- Postaje za vabe morajo biti označene z naslednjimi informacijami: »Ne premikajte in ne odpirajte«; »Vsebuje rodenticid«; »Ime proizvoda ali številka odobritve«; »aktivne snovi« in »V primeru nesreče pokličite center za pomoč pri zastrupitvah [vstavite nacionalno telefonsko številko]«.
  - Nevarno za divje živali.

### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

- Ob koncu obdobja uporabe nezaužite vabe in embalažo odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.
- Priporočamo uporabo rokavic.



---

## **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Vsebnik hranite zaprt in zaščiten pred neposredno sončno svetlobo.
- Hranite na mestih, kjer je dostop preprečen otrokom, pticam, hišnim ljubljencem in domačim živalim.
- Rok trajanja: 24 mesecev.

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

- Zaradi načina delovanja z zakasnitvijo rodenticidi z antikoagulacijskim učinkom začnejo delovati 4 do 10 dni po zaužitju vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Mrtvih glodavcev se ne dotikajte z golimi rokami, pri njihovem odstranjevanju vedno nosite rokavice ali uporabljajte orodja, kot so klešče prijemale.
- Ta izdelek vsebuje sredstvo za grenenje in barvilo.

Način uporabe: VI.2 uporaba na pokritih mestih in VI.2.1 v postajah za vabe (uporaba na pokritih mestih)

Namen uporabe: VII.2 varovanje zdravja.

Vrsta formulacije: VIII.3.3 vaba v zavitkih (formulacija v trdni obliki).