

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** PREDATOR PARAZIT repellent ANTI LICE repellent

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

**Číslo povolení:** CZ-0027980-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0027980-0000

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	7

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

PREDATOR PARAZIT repellent ANTI LICE repellent

### 1.2. Držitel povolení

<b>Jméno (název) a adresa držitele povolení</b>	Jméno (název)	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice Česká republika
<b>Číslo povolení</b>	CZ-0027980-0000	
<b>Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3</b>	CZ-0027980-0000	
<b>Datum udělení povolení</b>	28/01/2022	
<b>Datum skončení platnosti povolení</b>	06/04/2027	

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

<b>Název výrobce</b>	Leroy cosmetics s.r.o.
<b>Adresa výrobce</b>	Nejdecká 600 69144 Lednice Česká republika
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Nejdecká 600 69144 Lednice Česká republika

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
<b>Název výrobce</b>	Merck S.L.U.
<b>Adresa výrobce</b>	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španělsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španělsko
<b>Účinná látka</b>	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
<b>Název výrobce</b>	Merck KGaA
<b>Adresa výrobce</b>	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španělsko

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20

### 2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina
------------------------------

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.  
Způsobuje vážné podráždění očí.

## Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obal /obsah jako nebezpečný odpad.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Sprej, který odpuzuje vši, které parazitují u lidí (široká veřejnost)

##### Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

##### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Repellent

##### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Pediculidae;  
Obecný název: veš dětská  
Vývojové stadium: Dospělci

##### Oblast použití

Vnitřní

Používejte v dobře větraných prostorách.

Repellent proti vším se stříká pumpičkou PREDATOR PARAZIT repellent ANTI LICE repellent je přípravek k přímému použití, který po odšívovacím ošetření chrání člověka před vší dětskou (Pediculus capitis). Přípravek se aplikuje na vlasy, zadní část krku a za uši.

##### Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání  
Podrobný popis:

Přípravek je připraven k přímému použití a aplikuje se pomocí pumpičky přímo na vlasy.

##### Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: Dospělí: až 1,05 g přípravku nebo 9 stříků na aplikaci; děti od 0 do 11 let: 0,5 g nebo asi 4 stříky na aplikaci  
Ředění (%): Přípraven k použití (není třeba ředit)  
Počet a načasování aplikace:

Přípravek je připraven k přímému použití a aplikuje se pomocí pumpičky přímo na vlasy.

Načasování: Repellent proti vším se stříká pumpičkou PREDATOR PARAZIT repellent ANTI LICE repellent je přípravek, který po odšívovacím ošetření chrání člověka před vší dětskou (Pediculus capitis). Po umytí vlasů přípravek aplikujte znovu, nejspíše

však přípravek aplikujte po 2 dnech.  
Dávka na použití:

- Dospělí: až 1,05 g nebo asi 9 stříky na aplikaci.
- Děti od 0 do 11 let: 0,5 g nebo asi 4 stříky na aplikaci.

Přípravek se obvykle používá jednou denně. Při opakované aplikaci dodržujte maximální denní povolený počet aplikací:

- dospělí a děti starší 1 roku: 3krát denně
- děti od 0 do 1 roku: 2krát denně

Pokud je biocidní přípravek aplikován u dětí mladších 11 let, musí aplikaci provádět dospělý.

#### Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

#### Velikost balení a obalový materiál

Plastová láhev z HDPE o objemu 25,0–250,0 ml.

Láhev je uzavřena pumpičkou, která je chráněna krytkou.

#### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Zkontrolujte, zda se ve vlasech nenacházejí žádné vši. Nejprve použijte odlišovací prostředek.

Rovnoměrně naneste přípravek na čisté a suché nebo ručníkem vysušené vlasy blízko ke kořínkům a nejprve provedte aplikaci na zadní straně krku a za ušima. Poté přestříkejte vlasy ze vzdálenosti 20 cm (sprejem pohybujte). Zkontrolujte, že pokožka hlavy a vlasy jsou dostatečně navlhčené.

Aplikaci opakujte po umytí vlasů. Pokud je biocidní přípravek aplikován u dětí mladších 11 let, musí aplikaci provádět dospělý.

Přípravek se obvykle používá jednou denně. Při opakované aplikaci dodržujte maximální denní povolený počet aplikací:

- dospělí a děti starší 1 rok: 3krát denně,
- děti od 0 do 1 roku: 2krát denně.

Pro zajištění neustálé ochrany: Nejpozději po 2 dnech opakujte aplikaci na čisté a ručníkem vysušené vlasy. Pokud byly vlasy v kontaktu s vodou (například po dešti nebo plavání), můžete aplikaci opakovat dříve, dokud hrozí zavšivení.

#### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o přípravku.  
Neaplikujte přípravek na tvář ani v okolí očí.  
Při aplikaci chraňte oči dítěte a zabraňte vdechnutí přípravku.  
Neaplikujte přes řezné rány, poranění či na podrážděnou pokožku.  
Jen pro vnější použití.  
Používejte v dobře odvětrávaných prostorech.  
Zabraňte vdechnutí výparů / postřiku.  
Syntetické materiály by se měly při aplikaci chránit.  
Pokud je ošetření neúčinné, měli by uživatelé informovat přímo držitele povolení.

#### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Způsobuje vážné podráždění očí.

**V případě vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch.

**V případě zasažení očí:** Vypláchněte velkým množstvím vody. Kontaktuje očního lékaře.

**V případě požití:** Okamžitě dejte postiženému napít vodu (nanejvýš dvě sklenice). Konzultujte lékaře.

**Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a zpožděné:** Způsobuje vážné podráždění očí.

**Indikace nutného okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:** Žádné informace nejsou k dispozici.

**Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy.**

Informace pro nepohotovostní personál: Zabraňte vdechnutí výparů a aerosolů. Zabraňte kontaktu s látkou. Zajistěte dostatečnou ventilaci. Vyklidte nebezpečnou oblast, dodržujte nouzové postupy a poradte se s profesionálem.

**Opatření na ochranu životního prostředí:** Nevypouštějte přebytečnou kapalinu do odpadu.

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Odpadní materiál musí být likvidován jako nebezpečný odpad.

Chemikálie ponechte v původních obalech.

Nevyhazujte společně s dalším odpadem.

S nevyčištěnými nádobami zacházejte stejně jako s přípravkem samotným.

Nevypouštějte přebytečnou kapalinu do odpadu.

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

**Podmínky skladování:** Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Tento přípravek by neměl být dlouhodobě skladován při teplotách nad 40 °C.

**Doba použitelnosti přípravku:** 18 měsíců

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Dodržujte pokyny na štítku. Uchovávejte mimo dosah ohně, horkých povrchů a zdrojů vznícení.

Chraňte přípravek před statickým výbojem.

**Správa vystavení životnímu prostředí:** Přípravek se nesmí vylévat do odpadu.

### 5. Obecná pravidla pro používání

## 5.1. Pokyny pro používání

Zkontrolujte, zda se ve vlasech nenacházejí žádné vši. Nejprve použijte odlišovací prostředek. Rovnoměrně naneste přípravek na čisté a suché nebo ručníkem vysušené vlasy blízko ke kořínkům a nejprve proveďte aplikaci na zadní straně krku a za ušima. Poté přestříkejte vlasy ze vzdálenosti 20 cm (sprejem pohybujte). Zkontrolujte, že pokožka hlavy a vlasy jsou dostatečně navlhčené.

Aplikaci opakujte po umytí vlasů. Pokud je biocidní přípravek aplikován u dětí mladších 11 let, musí aplikaci provádět dospělý. Přípravek se obvykle používá jednou denně. Při opakované aplikaci dodržujte maximální denní povolený počet aplikací:

- dospělí a děti starší 1 rok: 3krát denně
- děti od 0 do 1 roku: 2krát denně

Pro zajištění neustálé ochrany: Nejpozději po 2 dnech opakujte aplikaci na čisté a ručníkem vysušené vlasy. Pokud byly vlasy v kontaktu s vodou (například po dešti nebo plavání), můžete aplikaci opakovat dříve, dokud hrozí zavšivení.

## 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o přípravku.

Neaplikujte přípravek na tvář ani v okolí očí.

Při aplikaci chraňte oči dítěte a zabraňte vdechnutí přípravku.

Neaplikujte přes řezné rány, poranění či na podrážděnou pokožku.

Jen pro vnější použití. Používejte v dobře odvětrávaných prostorech.

Zabraňte vdechnutí výparů / postříku.

Syntetické materiály by se měly při aplikaci chránit.

Pokud je ošetření neúčinné, měli by uživatelé informovat přímo držitele povolení.

## 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Způsobuje vážné podráždění očí.

**V případě vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch.

**V případě zasažení očí:** Vypláchněte velkým množstvím vody. Kontaktuje očního lékaře.

**V případě požití:** Okamžitě dejte postiženému napít vodu (nanejvýš dvě sklenice). Konzultujte lékaře.

**Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a zpožděné:** Způsobuje vážné podráždění očí.

**Indikace nutného okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:** Žádné informace nejsou k dispozici.

**Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy.**

Informace pro nepohotovostní personál: Zabraňte vdechnutí výparů a aerosolů. Zabraňte kontaktu s látkou. Zajistěte dostatečnou ventilaci. Vyklidte nebezpečnou oblast, dodržujte nouzové postupy a poradte se s profesionálem.

**Opatření na ochranu životního prostředí:** Nevypouštějte přebytečnou kapalinu do odpadu.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

## 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odpadní materiál musí být likvidován jako nebezpečný odpad.

Chemikálie ponechte v původních obalech.

Nevyhazujte společně s dalším odpadem.

S nevyčištěnými nádobami zacházejte stejně jako s přípravkem samotným.

## 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování



**Podmínky skladování:** Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Tento přípravek by neměl být dlouhodobě skladován při teplotách nad 40 °C.

**Doba použitelnosti přípravku:** 18 měsíců

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Dodržujte pokyny na štítku. Uchovávejte mimo dosah ohně, horkých povrchů a zdrojů vznícení. Chraňte přípravek před statickým výbojem.

**Správa vystavení životnímu prostředí:** Přípravek se nesmí vylévat do odpadu.

## 6. Další informace

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402