



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI,
DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

I.5.i.d.2/882

Spett.le
BASF Italia S.p.A.
C306 2
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
basfitalia.pec@legalmail.it
nicola.cavanagh@basf.com

**OGGETTO: Prodotto biocida: STORM Ultra, Veor, Rodicum Secure FL, Veor Secure, STORM
Ultra Secure, Secuvia, Secuvia Secure
Case number: BC-UY087892-80
Trasmissione decreto di modifica tecnica minore dell'autorizzazione
n. IT/2019/00556/MRP**

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica tecnica minore relativo al prodotto biocida indicato in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, *“Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: Renato Cabella e-mail: r.cabella-esterno@sanita.it
Referente amministrativo: Massimiliano Vaccari e-mail: m.vaccari-esterno@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E
DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 8
IT/2019/00556/MRP

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, gli artt.19 e ss.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n.528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto di prima autorizzazione del prodotto biocida di cui al dispositivo del presente decreto, rilasciato in data 04 giugno 2019;

VISTA l'istanza NA-MIC, case number BC-UY087892-80, presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 19 luglio 2023;

RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA:

la modifica tecnica minore del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	STORM Ultra, Veor, Rodicum Secure FL, Veor Secure, STORM Ultra Secure, Secuvia, Secuvia Secure
PRINCIPIO ATTIVO:	Flocoumafen
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	BASF Italia S.p.A. C306 2 Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB)
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2019/00556/MRP
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	01 luglio 2024
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PT14

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **BASF Italia S.p.A.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 SPC - sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornato e caricato nel Registro Europeo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

STORM Ultra

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Numero di autorizzazione:

Numero dell'approvazione del R4BP:

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	STORM Ultra STORM Ultra Secure Veor Veor Secure Secuvia Secuvia Secure Rodicum Secure FL
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	
	Indirizzo	
Numero di autorizzazione		
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>		
Data di rilascio dell'autorizzazione		
Data di scadenza dell'autorizzazione		

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Indirizzo del fabbricante	Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Svizzera
Ubicazione dei siti di fabbricazione	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch site 1 St. Michaels Industrial Estate WA8 8TJ Widnes Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch site 2 Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar- Ebenhausen Germania

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Flocoumafen
Nome del fabbricante	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Indirizzo del fabbricante	Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Svizzera
Ubicazione dei siti di fabbricazione	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch site 1 Lower Road WA8 8 NS Halebank Widnes Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Flocoumafen	4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4- tetrahydro-3- [4-(4- trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1- naphthyl]coumarin	principio attivo	90035-08-8	421-960-0	0,0025

2.2. Tipo/i di formulazione

XX Altro: Esca pronta all'uso: blocco

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	
Consigli di prudenza	

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Uso # 1 – Topi domestici – Uso amatoriale/Pubblico (non professionisti) – all’interno di edifici (Indoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All’interno degli edifici - General public – uso amatoriale (utilizzatori non professionisti)
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l’uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 15 g - 25 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: 15 g - 25 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 1 - 2 metri l’uno dall’altro.
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell’imballaggio	15 g – 100 g Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - Scatole di esche in pp a prova di manomissione pre-riempite riconfezionate in imballaggi PET/PE riciclabili o cartone richiudibile. - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile. - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

- Prima di utilizzare prodotti rodenticidi, dovrebbero essere presi in considerazione metodi di controllo non chimici (ad esempio trappole).

- Non posizionare le stazioni per esca vicino a sistemi di drenaggio dell'acqua dove potrebbero entrare in contatto con l'acqua.

- Rimuovere l'esca rimanente o le stazioni per esca alla fine del periodo di trattamento.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Le informazioni sul prodotto (ad esempio l'etichetta e / o il foglio illustrativo) devono mostrare chiaramente che:

- il prodotto deve essere utilizzato in adeguate stazioni per esca a prova di manomissione (ad esempio "utilizzare solo in stazioni di esca a prova di manomissione");
- gli utilizzatori devono etichettare correttamente le stazioni per esca in accordo alle informazioni riportate alla sezione 5.3 dell'SPC (ad esempio, "etichettare le stazioni per esca, in accordo alle raccomandazioni sul prodotto").

- L' utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni sul prodotto (ad es. etichetta e / o foglio illustrativo) dovrebbero chiaramente raccomandare che, in caso di sospetta mancanza di efficacia entro la fine del trattamento (cioè, in caso si osservi ancora l'attività dei roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere consiglio al fornitore del prodotto o chiamare un servizio di disinfestazione.

- Cercare di rimuovere i roditori morti durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza con cui vengono ispezionate le esche.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. . Uso # 2 – Ratti – Uso amatoriale/Pubblico (non professionisti) – all’interno di edifici (Indoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: ratto nero o dei tetti Fase di sviluppo: altro: giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All’interno degli edifici - General public – uso amatoriale (utilizzatori non professionisti)
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l’uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 50 g - 75 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: 50 g - 75 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 - 10 metri l’uno dall’altro.
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell’imballaggio	50 g – 300 g Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - Scatole di esche in pp a prova di manomissione pre-riempite riconfezionate in imballaggi PET/PE riciclabili o cartone richiudibile - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

- Prima di utilizzare prodotti rodenticidi, dovrebbero essere presi in considerazione metodi di controllo non chimici (ad esempio trappole).

- Non posizionare le stazioni per esca vicino a sistemi di drenaggio dell'acqua dove potrebbero entrare in contatto con l'acqua.

- Rimuovere l'esca rimanente o le stazioni per esca alla fine del periodo di trattamento.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.2.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Le informazioni sul prodotto (ad esempio l'etichetta e / o il foglio illustrativo) devono mostrare chiaramente che:

- il prodotto deve essere utilizzato in adeguate stazioni per esca a prova di manomissione (ad esempio "utilizzare solo in stazioni di esca a prova di manomissione");
- gli utilizzatori devono etichettare correttamente le stazioni per esca in accordo alle informazioni riportate alla sezione 5.3 dell'SPC (ad esempio, "etichettare le stazioni per esca, in accordo alle raccomandazioni sul prodotto").

- L' utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni sul prodotto (ad es. etichetta e / o foglio illustrativo) dovrebbero chiaramente raccomandare che, in caso di sospetta mancanza di efficacia entro la fine del trattamento (cioè, in caso si osservi ancora l'attività dei roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere consiglio al fornitore del prodotto o chiamare un servizio di disinfestazione.

- Cercare di rimuovere i roditori morti durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza con cui vengono ispezionate le esche.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.2.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3. Uso # 3 – Ratti – Uso amatoriale/Pubblico (non professionisti) – intorno agli edifici (Outdoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: ratto nero o dei tetti Fase di sviluppo: altro: giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Outdoor - Intorno agli edifici - General public – uso amatoriale (utilizzatori non professionisti)
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 50 g - 75 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: 50 g - 75 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 - 10 metri l'uno dall'altro.
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	50 g – 300 g Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - Scatole di esche in pp a prova di manomissione pre-riempite riconfezionate in imballaggi PET/PE riciclabili o cartone richiudibile - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad esempio, pioggia, neve, ecc.). Posizionare i contenitori con l'esca in aree non soggette ad allagamenti.
- Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.
- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire il contenitore quando necessario.
- Prima di utilizzare prodotti rodenticidi, dovrebbero essere presi in considerazione metodi di controllo non chimici (ad esempio trappole).
- Non posizionare le stazioni per esca vicino a sistemi di drenaggio dell'acqua o in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione), dove potrebbero entrare in contatto con l'acqua.
- Rimuovere l'esca rimanente o le stazioni per esca alla fine del periodo di trattamento.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.3.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Le informazioni sul prodotto (ad esempio l'etichetta e / o il foglio illustrativo) devono mostrare chiaramente che:
 - il prodotto deve essere utilizzato in adeguate stazioni per esca a prova di manomissione (ad esempio "utilizzare solo in stazioni di esca a prova di manomissione");
 - gli utilizzatori devono etichettare correttamente le stazioni per esca in accordo alle informazioni riportate alla sezione 5.3 dell'SPC (ad esempio, "etichettare le stazioni per esca, in accordo alle raccomandazioni sul prodotto").
- L' utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni sul prodotto (ad es. etichetta e / o foglio illustrativo) dovrebbero chiaramente raccomandare che, in caso di sospetta mancanza di efficacia entro la fine del trattamento (cioè, in caso si osservi ancora l'attività dei roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere consiglio al fornitore del prodotto o chiamare un servizio di disinfestazione.
- Cercare di rimuovere i roditori morti durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza con cui vengono ispezionate le esche.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.3.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4. Uso # 4 – Topi domestici – Professionisti – all’interno di edifici (Indoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All’interno degli edifici - Professionisti
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l’uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 15 g - 25 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: 15 g - 25 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 1 - 2 metri l’uno dall’altro.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell’imballaggio	1,5 kg – 10 kg Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - Scatole di esche in pp a prova di manomissione pre-riempite riconfezionate in imballaggi PET/PE riciclabili o cartone richiudibile - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.4.1. Istruzioni specifiche per l’uso

- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all’inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l’esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.
- [Se disponibile] Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.
- Rimuovere l’esca rimanente o le stazioni per esca alla fine del periodo di trattamento.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.4.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.4.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.4.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.5. Descrizione degli usi

Tabella 5. Uso # 5 – Ratti – Professionisti – all'interno di edifici (Indoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: altro: ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: altro: ratto nero o dei tetti Fase di sviluppo: altro: giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All'interno degli edifici - professionisti
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca

	Descrizione dettagliata: Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 50 g - 75 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: 50 g - 75 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 - 10 metri l'uno dall'altro.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1,5 kg – 10 kg Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - Scatole di esche in pp a prova di manomissione pre-riempite riconfezionate in imballaggi PET/PE riciclabili o cartone richiudibile - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.5.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.
- [Se disponibile] Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.
- Rimuovere l'esca rimanente o le stazioni per esca alla fine del periodo di trattamento

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.5.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.5.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.5.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.6. Descrizione degli usi

Tabella 6. Uso # 6 – Topi domestici e ratti – Professionisti– intorno agli edifici (Outdoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: ratto nero o dei tetti Fase di sviluppo: altro: giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Outdoor - Intorno agli edifici - professionisti
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Topo domestico: 15 g - 25 g per contenitori 0 Ratti: 50 g - 75 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Topo domestico: 15 g - 25 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 1 - 2 metri l'uno dall'altro. Ratti: 50 g - 75 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 - 10 metri l'uno dall'altro.

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1,5 kg – 10 kg Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - Scatole di esche in pp a prova di manomissione pre-riempite riconfezionate in imballaggi PET/PE riciclabili o cartone richiudibile - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.6.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in aree non soggette ad allagamenti.
- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni [per topi 2-3 giorni] [per ratti 5-7 giorni] all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.
- Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.
- [Se disponibile] Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.
- Rimuovere l'esca rimanente o le stazioni per esca alla fine del periodo di trattamento.

4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.6.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane.

4.6.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento dei contenitori con l'esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, assicurarsi che l'esca non entri in contatto con l'acqua.

4.6.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.6.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.7. Descrizione degli usi

Tabella 7. Uso # 7 – Topi domestici e ratti – Professionisti formati – all'interno di edifici (Indoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: ratto nero o dei tetti Fase di sviluppo: altro: giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Indoor - All'interno degli edifici - professionisti formati
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: delle esche: „Pulsed Baiting“.Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione. Punti esca coperti e protetti.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Topo domestico: 15 g - 25 g per contenitori 0 Ratti: 50 g - 75 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: „Pulsed Baiting“ Topo domestico: 15 g - 25 g di esca per punto d'esca. Ratti: 50 g – 75 g di esca per punto d'esca.
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1,5 kg – 10 kg

Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in:

- PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile
- PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.7.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Sostituire l'esca consumata solo dopo 3 giorni e poi a intervalli di massimo 7 giorni. Raccogliere le esche rovesciate e i roditori morti.
- La frequenza delle visite all'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento. Tale frequenza dovrebbe essere coerente con le raccomandazioni fornite dal codice delle buone pratiche pertinenti.
- [Se disponibile] Seguire le istruzioni specifiche fornite dal codice di buona pratica applicabile a livello nazionale.
- [Se disponibile] Seguire eventuali istruzioni aggiuntive fornite dal codice delle buone pratiche pertinenti.
- Rimuovere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento

4.7.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.7.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata e dintorni) della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, qualora disponibili].
- Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
- Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori.

4.7.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.7.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.7.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.8. Descrizione degli usi

Tabella 8. Uso # 8 – Topi domestici e ratti – Professionisti formati – intorno agli edifici (Outdoor)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: ratto nero o dei tetti Fase di sviluppo: altro: giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Outdoor – Intorno agli edifici - professionisti formati
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Applicazione delle esche: „Pulsed Baiting“.Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione. Punti esca coperti e protetti.Applicazione diretta delle esche pronte all'uso nelle tane.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Topo domestico: 15 g - 25 g per contenitori 0 Ratti: 50 g - 75 g di esca per contenitore Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: „Pulsed Baiting“ Topi domestici: 15 g - 25 g di esca per punto d'esca. Ratti: 50 g – 75 g di esca per punto d'esca. 50 g – 75 g di esca per tana.

Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1,5 kg – 10 kg Esca in blocchi (5 g / 25 g) ulteriormente confezionata in: - PP o HDPE o PET o PE o una combinazione di questi materiali, secchi con coperchi e barattoli rivendibili o un sacchetto flessibile e richiudibile - PP o PE o PET o HDPE, o una combinazione di questi, un contenitore sigillato come un barattolo, una latta o un cartone, o un sacchetto flessibile e richiudibile.

4.8.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Sostituire l'esca consumata solo dopo 3 giorni e poi a intervalli di massimo 7 giorni. Raccogliere le esche rovesciate e i roditori morti.

- La frequenza delle visite all'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento. Tale frequenza dovrebbe essere coerente con le raccomandazioni fornite dal codice delle buone pratiche pertinenti. Per l'uso esterno, i punti d'esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle specie non bersaglio.
- Le esche devono essere posizionate per ridurre al minimo l'esposizione alle specie non bersaglio e ai bambini.

- Coprire o bloccare gli ingressi di tane / cunicoli muniti di esche per ridurre i rischi di rigetto e di fuoriuscita dell'esca.
- [Se disponibile] Seguire le istruzioni specifiche fornite dal codice di buona pratica applicabile a livello nazionale.
- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti d'esca in aree non soggette ad allagamenti.

- Sostituire qualsiasi esca nei vari punti d'esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.
- Rimuovere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.
- [Se disponibile] Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

4.8.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.8.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata e dintorni) della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, se disponibili].
- Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
- Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori.

4.8.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento dei punti d'esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, assicurarsi che l'esca non entri in contatto con l'acqua

4.8.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

4.8.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'utilizzo

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

- Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.
- Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.
- Il prodotto deve essere posto nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui è stata osservata l'attività dei roditori (ad esempio: sentieri, siti di nidificazione, mangiatoie, buche, cunicoli ecc.).
- Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.
- Posizionare i contenitori per esca fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.
- Posizionare i contenitori per esca lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.

Professionisti e professionisti formati

- Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.
- Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.
- I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti (si veda sezione 5.3 relativa alle informazioni da riportare in etichetta).
- [Se richiesto dalla legislazione nazionale] Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.
- L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.
- Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale del guanto deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).
- Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.
- Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e bevaggio quanto più possibile).
- Non utilizzare i rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti (ad esempio per prevenire eventuali infestazioni o per monitorare attività dei roditori).
- Smaltire i roditori morti in conformità ai requisiti locali [Il metodo di smaltimento deve essere descritto specificamente nell'SCP nazionale e riportato sull'etichetta del prodotto].

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

- L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni relative al prodotto (ad esempio etichetta e/o fogli illustrativi) devono chiaramente suggerire che in caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio si osserva ancora attività di roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere suggerimenti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di disinfestazione.

- Verificare la presenza di roditori morti e rimuoverli durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza di visita fatta ai contenitori per esche.

Professionisti e professionisti formati

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, se disponibili].

- Il prodotto non deve essere usato per oltre 35 giorni senza una valutazione dello stato di infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Solo per professionisti

- Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere a intervalli frequenti i roditori morti durante il trattamento (ad esempio almeno due volte la settimana). [Ove applicabile, specificare se ispezioni più frequenti o giornalieri sono richieste].

- Le informazioni del prodotto (ad esempio etichetta e/o foglietto illustrativo) devono chiaramente indicare che:

- il prodotto non deve essere fornito al pubblico (ad esempio "solo per professionisti");
- il prodotto deve essere usato in appropriati contenitori per esche a prova di manomissione (ad esempio: "usare solo in appropriati contenitori per esche a prova di manomissione");
- gli utilizzatori devono adeguatamente etichettare i contenitori per esche con le informazioni presenti nella sezione 5.3 dell' SPC (ad esempio: "etichettare i contenitori per esche conformemente alle raccomandazioni del prodotto").

- Non lavare i contenitori per esca con acqua tra un'applicazione e l'altra.

Solo per professionisti formati

- Le informazioni sul prodotto (etichetta e/o foglietto illustrativo) devono chiaramente indicare che il prodotto deve essere unicamente fornito ad utilizzatori professionali formati in possesso della certificazione dimostrante la conformità con i requisiti formativi pertinenti (ad esempio "per soli professionisti formati").

- Non impiegare in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva.

- Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace.

- Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e protetti.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

- Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

- In caso di:

- Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

- Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

- Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto [inserire l'informazione specifica richiesta dalla legislazione nazionale]. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico [inserire l'informazione specifica richiesta dalla legislazione nazionale]

- I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni: "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza (e) attiva (e)" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni. [inserire il numero di telefono nazionale]".

- Pericoloso per la fauna selvatica.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente [il metodo di smaltimento deve essere descritto in maniera specifica nell'SPC nazionale e riportato nell'etichetta del prodotto].
- Si raccomanda l'utilizzo di guanti.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.
- Data di scadenza: 3 anni.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

- A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.
- I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.
- Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.