

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Ratimor meki mamac

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/19-12/42

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0013269-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Ratimor meki mamac Bromadiolone meki mamac
--------------------	---

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenija
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/19-12/42	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0013269-0000	
Datum autorizacije	03/12/2012	
Datum isteka autorizacije	31/12/2025	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Unichem d.o.o.
Adresa proizvođača	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Bromadiolon
Naziv proizvođača	Activa Srl
Adresa proizvođača	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

RB Mamac (spreman za uporabu)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	<p>H360D: Može naškoditi nerođenom djetetu.</p> <p>H372: Uzrokuje oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti { 1:navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost: }.</p>
Oznake obavijesti	<p>P201: Prije uporabe pribaviti posebne upute.</p> <p>P202: Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.</p> <p>P264: Nakon uporaberuke. temeljito oprati {0:...}</p> <p>P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.</p> <p>P280: Nositi zaštitne rukavice.</p> <p>P308 + P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:: zatražiti savjet.</p> <p>P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet .</p> <p>P405: Skladištiti pod ključem.</p> <p>P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.</p>

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Profesionalni korisnici – kućni miševi – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za suzbijanje infestacije kućnim miševima u zatvorenom treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [10 g - 20 g] pakiranim u: - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg - aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg - vreće od natron papira: do 25 kg - PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg - PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg - kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg - kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg

	<p>- plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg</p> <p>- PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 40 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 40 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 30 g mamca u polietilenskoj „kobasici“ u kolagenskom ili plastičnom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za miševe, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 0.1, 0.15, 0.2 ili 0.3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg</p>
--	---

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Slijediti dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Profesionalni korisnici - štakori – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima u zatvorenom treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [20 g] pakirane u: - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/ PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg

- aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg
- vreće od natron papira: do 25 kg
- PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg
- PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg
- kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg
- kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg
- plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg
- PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg

Ostala pakiranja

Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za štakore otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg

Ostala pakiranja

Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg

Ostala pakiranja

200 g mamca u kolegenu u plastičnoj film navlaci (kao kobasica) ili polietilenskom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za štakore, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg

Ostala pakiranja

0.1, 0.15, 0.2 ili 0.3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg

Ostala pakiranja

Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te pogledati je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela glodavaca. Mamac ponovno napunite prema potrebi.
- Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte 5.2

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte 5.4

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte 5.5

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Profesionalni korisnici - kućni miševi i/ili štakori – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miševi Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom, oko zgrada
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razrjeđenje (%): 0

	<p>Broj i vremenski raspored primjene: Za suzbijanje infestacije kućnim miševima na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije. Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima i na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.</p>
<p>Kategorija(e) korisnika</p>	<p>profesionalac</p>
<p>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</p>	<p>Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg.</p> <p>Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [miševi: 10 g - 20 g ili štakori: 20 g] pakiranim u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg - aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg - vreće od natron papira: do 25 kg - PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg - PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg - kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg - kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg - plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg - PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 30 g mamca u polietilenskoj „kobasici" u kolagenskom ili plastičnom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za miševe, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p>

	<p>Ostala pakiranja 200 g mamca u kolegenu u plastičnoj film navlaci (kao kobasica) ili polietilenskom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za štakore, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 0.1, 0.15, 0.2 ili 0.3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg</p>
--	---

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana (za štakore 5-7 dana) i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ovaj proizvod ne primjenjivati izravno u jazbine.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte 5.4

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte 5.5

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Osposobljeni profesionalni korisnici - kućni miš i/ili štakor - u zatvorenom

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: • Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja. • Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije. Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima u zatvorenom treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji ili drugom prekrivenom mjestu postavljanja) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [miševi: 10 g - 20 g ili štakori: 20 g] pakiranim u: - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg - aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg - vreće od natron papira: do 25 kg

- PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg
- PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg
- kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg
- kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg
- plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg
- PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg

Ostala pakiranja

Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg

Ostala pakiranja

Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg

Ostala pakiranja

30 g mamca u polietilenskoj „kobasici" u kolagenskom ili plastičnom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za miševe, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg

Ostala pakiranja

200 g mamca u kolegenu u plastičnoj film navlaci (kao kobasica) ili polietilenskom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za štakore, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg

Ostala pakiranja

0.1, 0.15, 0.2 ili 0.3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg

Ostala pakiranja

Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac
- Slijediti dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte 5.4

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte 5.5

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Osposobljeni profesionalni korisnici - miševi i/ili štakori – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom oko zgrada
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce

	<p>Detaljan opis: • Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja • Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca • Izravna primjena mamca u jazbinu</p>
Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu).</p> <p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije. Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji ili drugom prekrivenom mjestu postavljanja) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.</p> <p>Izravna primjena mamca u jazbinu: 20-200 g po jazbini.</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg.</p> <p>Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [miševi: 10 g - 20 g ili štakori: 20 g] pakirane u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg - aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg - vreće od natron papira: do 25 kg - PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg - PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg - kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg - kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg - plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg - PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševe ili štakore otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku</p>

	<p>ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 30 g mamca u polietilenskoj „kobasici“ u kolagenskom ili plastičnom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za miševe, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 200 g mamca u kolegenu u plastičnoj film navlaci (kao kobasica) ili polietilenskom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za štakore, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 0.1, 0.15, 0.2 ili 0.3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg</p>
--	--

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].
- Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.
- U slučaju primjene izravno u jazbine: Mamce treba postaviti na način da se smanji izloženost ne-ciljnih vrsta i djece. Pokriti ili na drugi način zatvoriti ulaze u legla s mamcima kako bi se smanjio rizik od odbacivanja ili prosipanja mamca.
- Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte 5.4

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte 5.5

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Osposobljeni profesionalni korisnici - štakori – vanjska otvorena područja i odlagališta otpada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Vanjska otvorena područja Vanjska odlagališta otpada
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: • Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja• Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca• Izravna primjena mamca u jazbinu
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Izravna primjena mamca u jazbinu: 20-200 g po jazbini.

Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg.</p> <p>Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [20 g] pakirane u: - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg - aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg - vreće od natron papira: do 25 kg - PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg - PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg - kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg - kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg - plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševе ili štakore otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg - PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za štakore otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 200 g mamca u kolegenu u plastičnoj film navlaci (kao kobasica) ili polietilenskom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za štakore, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 0,1, 0,15, 0,2 ili 0,3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg</p>

--	--

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].
- Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.
- U slučaju primjene izravno u jazbine: Mamce treba postaviti na način da se smanji izloženost ne-ciljnih vrsta i djece. Pokriti ili na drugi način zatvoriti ulaze u legla s mamcima kako bi se smanjio rizik od odbacivanja ili prosipanja mamca.
- Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte 5.4

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte 5.5

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. Osposobljeni profesionalni korisnici - štakori – kanalizacija

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	ostalo: Otro Kanalizacija
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: • Gotovi mamci koji se moraju učvrstiti ili primijeniti u kutijama za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama. • Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije štakorima u kanalizaciji treba upotrijebiti do 200 g mamca po šahtu. U slučaju jake infestacije postaviti 200 g mamca po šahtu. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije štakorima u kanalizaciji treba upotrijebiti do 200 g mamca po šahtu. U slučaju jake infestacije postaviti 200 g mamca po šahtu.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja - 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamac u jestivim papirnatim vrećicama [20 g] pakirane u: - polietilenske (PE) ili polipropilenske (PP) ili PE/PP ili papirno/PE vrećice u kartonskom ili vlaknastom omotu: do 20 kg - PE ili PP pakiranje: do 25 kg - aluminijske ili laminirane PP ili PET/PE vrećice sa ili bez vanjskog kartonskog omota: do 25 kg - vreće od natron papira: do 25 kg - PE, ili PE/PP, ili PP, ili papir/PE) vrećice i u vreće od natron papira: do 25 kg - PP ili PE kantice s poklopcem ili posude s poklopcem ili cijevi: do 20 kg - kartonske kutije ili kutije od vlaknatice s polietilenskom vrećom ili navlakom: do 20 kg - kartonske ili kutije od vlaknatice: do 20 kg - plastične (deratizacijske) kutije za mamce za miševе ili štakore otporne na otvaranje, prethodno napunjene ili za nadopunjavanje; pakirane u kartonske ili plastične zavarene spremnike ili folije: do 20 kg - PE ili PP blistere u kartonskim ili plastičnim zavarenim spremnicima ili folijama: do 20 kg

	<p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem pakiran u plastične (deratizacijske) kutije za mamce za štakore otporne na otvaranje; pakirane u vanjska kartonska ili blister pakiranja ili kartonsku navlaku ili zapečaćene vrećice toplinom ili zapečaćene vrećice toplinom izvana s kartonskim gornjim dijelom: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja Mamac na PP, PE ili PET pladnju (20 — 200 g) sa toplinom zavarenim poklopcem ili naljepnicom od plastične ili aluminijske folije u vanjskom kartonu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 200 g mamca u kolegenu u plastičnoj film navlaci (kao kobasica) ili polietilenskom vanjskom crijevu za primjenu u kutije za mamce za štakore, pakirano u vlaknaticu: do 10 kg</p> <p>Ostala pakiranja 0.1, 0.15, 0.2 ili 0.3 kg mamca u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja; tube pakirane u kartonskom omotu: do 20 kg</p> <p>Ostala pakiranja Pasta u plastičnom pakiranju za primjenu pomoću špatule ili neoštrog (dekoraterskog) noža: do 20 kg</p>
--	---

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac mora biti postavljen na način da ne može doći u kontakt s vodom i da se ne može isprati vodom.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Mamac se postavlja samo u kanalizacijske sustave koji su povezani sa pogonima za pročišćavanje otpadnih voda.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte 5.3

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte 5.4

4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte 5.5

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica navest će nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- Ako izgleda da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Na kraju tretmana ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

• Upute za uporabu koje se „odnose na mamce“:

- Mamci u vrećicama: Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamce.
- Pasta: Mamac u obliku paste nanosite pomoću dovoljno produljenog aplikatora (lopatica) kako biste smanjili izloženost ruke. Izbjegavajte posezanje u kantu. Očistite opremu (na primjer lopaticu ili kutije za mamac) papirnatim ručnikom ili mokrom krpom.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

-
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su **uočene** aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
 - Gdje je **moгуće**, zaštitne kutije trebaju biti **pričvršćene** na tlo ili druge strukturne predmete.
 - Kutije s mamcem trebaju biti jasno **označene** da sadrže rodenticide te da se ne smiju premješati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražite u odjeljku 5.3).
 - Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana **područja** trebaju se **označiti** tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u **slučaju** otrovanja.
 - Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao **odvući** iz kutije za mamce.
 - Proizvod treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, **domaćih** životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
 - Proizvod postaviti dalje od hrane, **pića** i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
 - Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica navest će nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu).
 - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda oprati ruke i izravno izloženu kožu.
 - O učestalosti pregleda tretiranog području **odlučuje** izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti **usklađena** s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najboljeg iskustva. Mjesta na kojima se rabi mamac u jazbine treba **posjećivati** češće od onih na kojima se koriste deratizacijske kutije za mamac.

 - Ako izgleda da je **količina** mamaca nedovoljna za **nazočnu** populaciju, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
 - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne **primjećuje** se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi **isključe**, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida li **jaćih** antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.

• Upute za uporabu koje se „odnose na mamce“:

- Mamci u vrećicama: [Za **vrećice** koje se ne mogu isprazniti - Ne otvarajte **vrećice** koje sadrže mamac].
- Pasta: Mamac u obliku paste nanosite **pomoću** dovoljno produljenog aplikatora (lopatica) kako biste smanjili izloženost ruke. Izbjegavajte posezanje u kantu. **Očistite** opremu (na primjer lopaticu ili kutije za mamac) papirnatim ručnikom ili mokrom krpom.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Profesionalni korisnici:

- Ako je **moгуće**, prije tretiranja obavijestiti sve **moгуće** prolaznike (na primjer korisnike) o kampanji za suzbijanje glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dva puta tjedno).
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez **provođenja** procjene infestacije i **učinkovitosti** tretiranja.
- Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za **sprječavanje** infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi:
 - da je proizvod nije namijenjen za **opću** uporabu (npr. "samo za profesionalne korisnike");
 - da se proizvod koristi u **odgovarajućim** kutijama za mamce koje su otporne na rukovanje/premještanje (npr. „koristite samo u zaštitnim kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja“),
 - da korisnici moraju ispravno **označiti** kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem **označite** u skladu s preporukama za proizvod“).
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana. Ako proizvod do kraja deratizacijskog postupka nije **učinkovit** (aktivnost glodavaca je i dalje primjetna), informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno uputiti korisnika da potraži savjet od **dobavljača** proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Kutije za mamce ne prati vodom **između** primjena.

- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.

- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod namijenjen samo za osposobljene profesionalne korisnike koji imaju certifikat o završenoj odgovarajućoj edukaciji (npr. "samo za osposobljene profesionalne korisnike").

- Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.

- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.

- Za sprječavanje pojave otpornosti, ne izmjenjivati proizvod sa drugim antioagulantnim rodenticidom slične ili slabije jačine. Za zamjenu proizvoda razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ako je moguće ili jačeg antikoagulantnog rodenticida.

- Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posuđe koje se upotrebljavalo na prekrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.

- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

5.3. Pojedivosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i fecesu.

- Antidot: Vitamin K1 - primjenjuje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

- U slučaju:

• Dodira s kožom - oprati kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.

• Dodira s očima - isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, držati kapke otvorenima, ispirati najmanje 10 minuta.

• Gutanja - oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju. Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinara.

- Zaštitne kutije moraju biti označene sa sljedećim informacijama: "ne pomicati; ne otvarati"; "sadrži rodenticid"; "RATIMOR MEKI MAMAC ili broj odobrenja"; "aktivna tvar: bromadiolon" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342"

- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.

• Preporučuje se uporaba rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Spremnik čuvati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

Rok valjanosti: 2 godine.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

- Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.
- Glodavci mogu prenositi bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti rukavice ili hvataljke kod sakupljanja i zbrinjavanja lešina.
- Proizvod sadrži goroku tvar i boju.

Ispravne H/P oznake su:

P308 + P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P314 - U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.