



PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych

Warszawa, 2011 -11- 0 3

Nr UR.RB: PL/2011/0003/A/MR

Liphatech S.A.S
Bonnell BP 3
47480 Pont du Casse
Francja

DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252)

wyda je się pozwolenie nr PL/2011/0003/A/MR na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego Rodilon Trio

1. Nazwa produktu biobójczego:

Rodilon Trio

2. Rodzaj produktu (grupa produktowa):

Kat. III, gr. 14 wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktow biobójczych (Dz.U. Nr 16, poz. 150)

3. Postać użytkowa produktu biobójczego:

Przynęta w postaci ziarna

4. Przeznaczenie produktu biobójczego:

Zwalczanie gryzoni: myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*)

5. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Liphatech S.A.S, Bonnell BP 3, 47480 Pont du Casse, Francja

6. Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórcy:

Substancja czynna:

Difetialon, CAS: 104653-34-1
[zaw. 0,025 g/kg]

Wytwórca:

Liphatech S.A.S, Bonnell BP 3, 47480 Pont du Casse, Francja

7. Nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego:

Liphatech S.A.S, Bonnel BP 3, 47480 Pont du Casse, Francja

8. Rodzaj opakowania:

Wiaderko – do 2,5 kg; (PP)

Pojemnik – do 800g; (PEHD, PP, PE)

9. Okres ważności produktu biobójczego:

5 lat od daty produkcji

10. Zakres i warunki obrotu i stosowania produktu biobójczego:

Produkt jest przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Do stosowania wewnątrz i wokół budynków.

11. Inne postanowienia decyzji:

Treść etykiety stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Dodatkowe wymagania:

Chronić przed dziećmi.

Zabezpieczyć przynętę przed dziećmi, ptakami oraz organizmami innymi niż docelowe (w szczególności psami, kotami, świniami i drobiem).

Przynętę należy umieścić w sposób bezpieczny tak, aby zminimalizować ryzyko spożycia jej przez inne zwierzęta lub dzieci. W miarę możliwości, zabezpieczyć przynętę przed rozwleczeniem.

W przypadku stosowania karmników deratyzacyjnych, należy je wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować.

W trakcie deratyzacji z dużą częstotliwością sprawdzać karmniki i usuwać nieżywe gryzonie, co najmniej tak często jak przeprowadzana jest kontrola i/lub uzupełnianie przynęty.

Nieżywe gryzonie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie używać rodentycydów o działaniu antykoagulacyjnym jako przynęty wykładanej na stałe.

Po deratyzacji usunąć wszystkie przynęty oraz tacki na przynętę i zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stosowania produktu w ogólnie dostępnych miejscach, miejsca te należy oznaczyć na okres deratyzacji oraz umieścić obok przynęty informację o niebezpieczeństwie bezpośredniego lub wtórnego zatrucia antykoagulantem, jak również o środkach, jakie należy podjąć w pierwszej kolejności w przypadku zatrucia.

Pozwolenie zachowuje ważność do dnia 31 października 2014r.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia niniejszej decyzji odstąpiono na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ponieważ uwzględniła ona w całości żądanie strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



z upoważnieniem Prezesa
WICEPREZES
ds. Wyrobów Medycznych


Joanna Kłusiewska

Załączniki:

1. Etykieta - saszetki
2. Etykieta - mieszanka

Otrzymują:

1. Strona
2. a/a

RODILON TRIO

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

Producent: LIPHATECH S.A.S
BONNEL BP3
47 480 PONT DU CASSE
FRANCJA

Podmiot odpowiedzialny LIPHATECH S.A.S
BONNEL BP3
47 480 PONT DU CASSE
FRANCJA

PREPARAT GRYZONIOBÓJCZY DO ZASTOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Substancja czynna: Difetialon 0,025 g/kg

Zakres stosowania: Do zwalczania szczurów (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*), oraz myszy (*Mus musculus*) wewnątrz oraz na zewnątrz wokół obiektów

Postać produktu: RODILON TRIO sporządzony jest na bazie naturalnej mieszanki zbożowej.. Produkt umieszczony jest w saszetkach gotowych do użycia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R52/53: Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

- S 2: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- S 13: Trzymać z dala od żywności, napojów i środków żywieniowych dla zwierząt.
- S 20/21: Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
- S 35: Produkt i opakowanie usuwać w bezpieczny sposób.
- S 46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę).
- S 49: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
- S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

Zastosowanie:

RODILON TRIO jest preparatem w postaci ziaren zbóż impregnowanych substancją czynną, przeznaczonym do zwalczania szczurów oraz myszy domowych wewnątrz obiektów i na zewnątrz, wokół obiektów Wokół budynków, na zewnątrz, produkt stosować używając karmników odpornych na manipulacje Identyfikacja gryzoni:

Zwyczaje żywieniowe szczurów i myszy różnią się: myszy spożywają niewielkie ilości w wielu miejscach, szczury jedzą do syta w jednym miejscu.

Określić rodzaj gryzoni na podstawie ilości tropów lub szkód (gniazda, jamy, odchody itp.). Stosowanie środka zależy od ilości szkodników ocenionej na tej podstawie.

Wyeliminować w miarę możliwości wszelkie alternatywne pożywienie

Sposób stosowania:

RODILON TRIO ma postać saszetek gotowych do wykładania i jest łatwy w użyciu. Nie otwierać saszetki. Umieścić saszetkę do wykładania jak najbliżej śladów gryzoni.

Saszetki RODILON TRIO wykladać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt i ptaków. Punkty wykładania trutki rozmieścić wzdłuż ścian oraz w miejscach, w których zaobserwowano ślady aktywności gryzoni.

Ziarna zabarwione na czerwono umożliwiają potwierdzenie spożycia preparatu przez gryzonie na podstawie barwy odchodów;

Trutkę najlepiej wykladać w specjalnie do tego przygotowanych karmnikach, które należy umocować do podłoża, Saszetki najlepiej umieścić w taki sposób aby zmniejszyć możliwość wynoszenia jej przez gryzonie, Trutkę należy również umieszczać na tackach w taki sposób aby ograniczyć dostęp organizmom niezwalczanym Nigdy nie umieszczać niezabezpieczonego produktu.

Uwzględnić poniższe zalecenia w strategii stosowania przynęt:

Gatunek	Liczba szkodników	Zalecana częstotliwość wykładania trutki i odstępy między kolejnymi zabiegami	Częstotliwość kontroli	Kontrola/Uzupełnianie trutki	Optymalny okres zabiegów i miejsca wykładania
Myszy	Duża	1 opakowanie (25 g) na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 1-1,5 metra.	✓ Wyłożyć preparat i przeprowadzić kontrolę po upływie 3 dni od pierwszego zabiegu.	✓ Podczas każdej kontroli uzupełniać ubytki w trutce. ✓ W przypadku ubytku całości wyłożonego preparatu, należy podwoić wykładaną ilość.	Cały rok Wewnątrz i wokół budynków
	Mała	1 opakowanie (25 g) na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 2-3 metry.	✓ Kontrolować punkty wykładania regularnie przez cały okres ubywania trutki (w miarę możliwości co tydzień lub co 15 dni).	✓ Regularnie uzupełniać świeżą trutkę aż do ustania oznak obecności myszy.	
Szczury: Szczury wędrowne i szczury śniade	Duża	4 opakowania (100 g) na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 4-5 metrów.	✓ Wyłożyć preparat i przeprowadzić kontrolę po upływie 3 dni od pierwszego zabiegu. ✓ Kontrolować punkty wykładania regularnie przez cały okres ubywania trutki (w miarę możliwości co tydzień lub co 15 dni).	✓ Podczas każdej kontroli uzupełniać ubytki w trutce. ✓ W przypadku ubytku całości wyłożonego preparatu, należy podwoić wykładaną ilość.	
	Mała	4 opakowania (100 g) na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 8-10 metrów		✓ Regularnie uzupełniać świeżą trutkę aż do ustania oznak obecności szczurów.	

Szczury i myszy mogą spożyć dawkę śmiertelną podczas pojedynczego żerowania. Pierwsze martwe gryzonie mogą pojawiać się po upływie 3 do 5 dni od spożycia preparatu.

Zwalczanie gryzoni może trwać 2 do 4 tygodni, w zależności od liczby szkodników.

Środki ostrożności:

- Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci
- Działa szkodliwie po połknięciu
- Preparat umieszczać w taki sposób aby ograniczyć możliwość spożycia przez niezwalczane gatunki a w szczególności dzieci
- Na karmnikach w których umieszcza się preparat należy umieścić informację o tym że zawierają rodentycydy
- Padłe gryzonie zbierać i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Nie stosować rodentycydów przeciwzakrzepowych jako przynęt stałych. Usunąć wszystkie pozostałe przynęty i tacki po zakończeniu stosowania i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.
- W Przypadku stosowania produktu w miejscach publicznych, miejsca te powinny być dokładnie oznakowane podczas akcji deratyzacyjnej. Informacje o możliwości wtórnego zatrucia przez antykoagulanty oraz postępowanie w przypadku zatrucia musi być dostępna

Objawy zatrucia:

Bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, osłabienie, podwyższone lub obniżone ciśnienie.

Pierwsza pomoc:

W przypadku skażenia oczu:

W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe, płukać oczy przy odwiniętych powiekach przez 15 -20 minut. Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.

W przypadku skażenia skóry:

Natychmiast zdjęć zanieczyszczoną odzież, skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem, a następnie obserwować czy pojawiają się jakieś wyżej opisane symptomy. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia:

Wypłukać usta dużą ilością wody. Natychmiast skonsultować się z lekarzem co do dalszego postępowania, pokaż opakowanie/ etykietę/ kartę charakterystyki Nie prowokować wymiotów bez wyraźnej instrukcji otrzymanej od lekarza lub centrum kontroli zatruc. Nie podawać niczego osobie nieprzytomnej

ANTIDOTUM – Witamina K1 – (pod kontrolą lekarza)

Magazynowanie:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym magazynie., z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia, w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych a w szczególności dzieci.

Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:

Substancji nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Produkt należy spalić lub skontaktować się z dostawcą, władzami lokalnymi lub uznaną firmą w celu jego odebrania i likwidacji. Preparatu nie można bezpiecznie zneutralizować. Nie wypuszczać go do systemów drenarskich ani do dróg wodnych. Zastosować się do lokalnych przepisów dotyczących usuwania odpadów i ochrony środowiska

Opakowania

Nie używać pustego opakowania w żadnym innym celu i zutylizować je zgodnie z powyższymi zaleceniami (najlepiej poprzez spalenie)

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W

TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

:

Ośrodki Toksykologiczne w Polsce:

Gdańsk - 58 349-28-31,

Kraków - 12 411-99-99,

Poznań - 61 847-69-46,

Warszawa - 22 619-66-54,

Skutek działania środka biobójczego:

W przypadku powtórnego pojawienia się gryzoni po wykonaniu zabiegu, należy powtarzać akcję deratyzacyjną.

Okres ważności –


5 lat

Nr serii:

Data produkcji:

2011 -11- 03

z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Wyrobów Medycznych


Joanna Kikowska
021104

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Żabkowska 41, 03-736 Warszawa
REGON 015249601
(8)

RODILON TRIO (mieszanka)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

Producent: LIPHATECH S.A.S
BONNEL BP3
47 480 PONT DU CASSE
FRANCJA

Podmiot odpowiedzialny LIPHATECH S.A.S
BONNEL BP3
47 480 PONT DU CASSE
FRANCJA

PREPARAT GRYZONIÓBÓJCZY DO ZASTOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Substancja czynna: Difetialon 0,025 g/kg

Zakres stosowania: Do zwalczania szczurów (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*), oraz myszy (*Mus musculus*) wewnątrz oraz na zewnątrz wokół obiektów

Postać produktu: RODILON TRIO sporządzony jest na bazie naturalnej mieszanki Ziaren zbóż.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R52/53: Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

- S 2: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- S 13: Trzymać z dala od żywności, napojów i środków żywieniowych dla zwierząt.
- S 20/21: Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
- S 35: Produkt i opakowanie usuwać w bezpieczny sposób.
- S 46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę).
- S 49: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
- S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

Zastosowanie:

RODILON TRIO jest preparatem w postaci ziaren zbóż impregnowanych substancją czynną, przeznaczonym do zwalczania szczurów oraz myszy domowych wewnątrz obiektów i na zewnątrz, wokół obiektów Wokół budynków, na zewnątrz, produkt stosować używając karmników odpornych na manipulacje Identyfikacja gryzoni:

Zwyczaje żywieniowe szczurów i myszy różnią się: myszy spożywają niewielkie ilości w wielu miejscach, szczury jedzą do syta w jednym miejscu.

Określić rodzaj gryzoni na podstawie ilości tropów lub szkód (gniazda, jamy, odchody itp.). Stosowanie środka zależy od ilości szkodników ocenionej na tej podstawie.

Wylimitować w miarę możliwości wszelkie alternatywne pożywienie

Sposób stosowania:

RODILON TRIO ma postać mieszanki ziaren zbóż, które należy wykladać w karmnikach deratyzacyjnych jak najbliższej śladów gryzoni.

RODILON TRIO wykladać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt i ptaków. Punkty wykładania trutki rozmieścić wzdłuż ścian oraz w miejscach, w których zaobserwowano ślady aktywności gryzoni.

Ziarna zabarwione na czerwono umożliwiają potwierdzenie spożycia preparatu przez gryzonia na podstawie barwy odchodów;

Trutkę najlepiej wykladać w specjalnie do tego przygotowanych karmnikach, które należy umocować do podłoża. Trutkę należy również umieszczać na tackach w taki sposób, aby ograniczyć dostęp organizmom niezwalczanym

Nigdy nie umieszczać niezabezpieczonego produktu.

Uwzględnić poniższe zalecenia w strategii stosowania przynęt:

Gatunek	Liczba szkodników	Zalecana częstotliwość wykładania trutki i odstępy między kolejnymi zabiegami	Częstotliwość kontroli	Kontrola/Uzupełnianie trutki	Optymalny okres zabiegów i miejsca wykładania
Myszy	Duża	25 g ziarna na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 1-1,5 metra.	✓ Wyłożyć preparat i przeprowadzić kontrolę po upływie 3 dni od pierwszego zabiegu.	✓ Podczas każdej kontroli uzupełniać ubytki w trutce. ✓ W przypadku ubytku całości wyłożonego preparatu, należy podwoić wykładaną ilość.	Cały rok Wewnątrz i wokół budynków
	Mała	25 g ziarna na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 2-3 metry.	✓ Kontrolować punkty wykładania regularnie przez cały okres ubywania trutki (w miarę możliwości co tydzień lub co 15 dni).	✓ Regularnie uzupełniać świeżą trutkę aż do ustania oznak obecności myszy.	
Szczury: Szczury wędrowne i szczury śniade	Duża	100 g ziarna na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 4-5 metrów.	✓ Wyłożyć preparat i przeprowadzić kontrolę po upływie 3 dni od pierwszego zabiegu.	✓ Podczas każdej kontroli uzupełniać ubytki w trutce. ✓ W przypadku ubytku całości wyłożonego preparatu, należy podwoić wykładaną ilość.	
	Mała	100 g ziarna na 1 punkt wyłożenia. Punkty wykładania rozmieścić co 8-10 metrów	✓ Kontrolować punkty wykładania regularnie przez cały okres ubywania trutki (w miarę możliwości co tydzień lub co 15 dni).	✓ Regularnie uzupełniać świeżą trutkę aż do ustania oznak obecności szczurów	

Szczury i myszy mogą spożyć dawkę śmiertelną podczas pojedynczego żerowania. Pierwsze martwe gryzonie mogą pojawiać się po upływie 3 do 5 dni od spożycia preparatu.

Zwalczanie gryzoni może trwać 2 do 4 tygodni, w zależności od liczby szkodników.

Środki ostrożności:

- Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci
- Działa szkodliwie po połknięciu
- Preparat umieszczać w taki sposób aby ograniczyć możliwość spożycia przez niezwalczane gatunki a w szczególności dzieci
- Na karmnikach w których umieszcza się preparat należy umieścić informację o tym że zawierają rodentycydy
- Padłe gryzonie zbierać i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Nie stosować rodentycydów przeciwzakrzepowych jako przynęt stałych. Usunąć wszystkie pozostałe przynęty i tacki po zakończeniu stosowania i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.
- W Przypadku stosowania produktu w miejscach publicznych, miejsca te powinny być dokładnie oznakowane podczas akcji deratyzacyjnej. Informacje o możliwości wtórnego zatrucia przez antykoagulanty oraz postępowanie w przypadku zatrucia musi być dostępna

Objawy zatrucia:

Bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, osłabienie, podwyższone lub obniżone ciśnienie.

Pierwsza pomoc:

W przypadku skażenia oczu:

W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe, płukać oczy przy odwiniętych powiekach przez 15 -20 minut. Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.

W przypadku skażenia skóry:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem, a następnie obserwować czy pojawią się jakieś wyżej opisane symptomy. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia:

Wypłukać usta dużą ilością wody. Natychmiast skonsultować się z lekarzem co do dalszego postępowania, pokaż opakowanie/ etykietę/ kartę charakterystyki Nie prowokować wymiotów bez wyraźnej instrukcji otrzymanej od lekarza lub centrum kontroli zatruc. Nie podawać niczego osobie nieprzytomnej

ANTIDOTUM – Witamina K1 – (pod kontrolą lekarza)

Magazynowanie:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym magazynie., z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia, w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych a w szczególności dzieci.

Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:

Substancji nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Produkt należy spalić lub skontaktować się z dostawcą, władzami lokalnymi lub uznaną firmą w celu jego odebrania i likwidacji. Preparatu nie można bezpiecznie zneutralizować. Nie wypuszczać go do systemów drenarskich ani do dróg wodnych. Zastosować się do lokalnych przepisów dotyczących usuwania odpadów i ochrony środowiska

Opakowania

Nie używać pustego opakowania w żadnym innym celu i zutylizować je zgodnie z powyższymi zaleceniami (najlepiej poprzez spalenie)

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

:

Ośrodki Toksykologiczne w Polsce:

Gdańsk - 58 349-28-31,

Kraków - 12 411-99-99,

Poznań - 61 847-69-46,

Warszawa - 22 619-66-54,

Skutek działania środka biobójczego:

W przypadku powtórznego pojawienia się gryzoni po wykonaniu zabiegu, należy powtarzać akcję deratyzacyjną.

Okres ważności –
5 lat

Nr serii:

Data produkcji:

z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Wyrobów Medycznych

Joanna Kilkowska

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Żabkowska 41, 03-736 Warszawa
REGON 015249601
(8)

2011 -11- 03