

**RO**

**ANEXĂ**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR  
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

Klerat Pellets

**Tip(uri) de produs**

TP 14: Rodenticide

**Numărul autorizației:** RO/2019/0183/MRA/UK-2015-0980

**Numărul deciziei de reglementare R4BP:** RO-0009183-0000

---

## Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

### 1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	Klerat Pellets
--------------------------------	----------------

### 1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Syngenta Crop Protection AG
	Adresă	Rosentalstrasse 67 4058 Basel Elveția
Numărul autorizației		RO/2019/0183/MRA/UK-2015-0980
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0009183-0000
Data autorizației		22/07/2013
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

### 1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	Syngenta Hellas SA
Adresa producătorului	2nd Km Kirotki odos 32011 Enofyta Viotias Grecia
Adresa locurilor de producție	Syngenta Hellas SA 32011 Enofyta Viotias Grecia

### 1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Brodifacum
Denumirea producătorului	Vertellus Specialties UK Ltd
Adresa producătorului	Hale Bank WA8 8NS Widnes Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Hale Bank WA8 8NS Widnes Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

---

## Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

### 2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	substanță activă	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (de greutate)

### 2.2. Tip(uri) de formulare

XX Altele: VIII.3.2 pellets

---

### Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	<p>H360D: Poate dăuna fătului.</p> <p>H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată { 1:indica#i calea de expunere, dacă există probe concludente că nici o altă cale de expunere nu provoacă acest pericol: }.</p>
Fraze de precau#ie	<p>P201: Procura#i instruc#iuni speciale înainte de utilizare.</p> <p>P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite #i în#elese toate măsurile de securitate.</p> <p>P280: Purta#i mănuși de protecție.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P405: A se depozita sub cheie.</p> <p>P501: Arunca#i conținutul la în conformitate cu legisla#ia.</p> <p>P501: Arunca#i recipientul la în conformitate cu legisla#ia.</p>

## Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

### 4.1. Descrierea utilizării

**Tabel 1. Utilizarea #1 - Șoareci și/sau șobolani de casă - Experți - La interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolanul maro Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui  Denumirea științifică: Rattus rattus Denumirea comună: altele: #obolanul de acoperi# Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui  Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: altele: #oarecele de casă Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior  La interior.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală  Descriere detaliată: Aplicare momeală Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării Puncte de momeală acoperite #i protejate.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #oareci - 5-15g de momeală per punct de momeală. #obolani - 20-50g de momeală per punct de momeală  Diluare (%): 0  Numărul #i calendarul de aplicare: #obolani Grad ridicat de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri Grad redus de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 10 metri  #oareci Grad ridicat de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 2 metri Grad redus de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i

---

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Momeală în tub sau găleată PP/PE. 3 Kg, 5 Kg și 10 Kg..
--	--

#### **4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare**

Îndepărtați produsul rămas la finalul perioadei de tratament.

Înlocuiți momeala mâncată numai după 3 zile și apoi la intervale maxime de 7 zile. Colectați momeala vărsată și rozătoarele moarte

#### **4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

În cazul în care este posibil, înainte de tratament, informați toate persoanele din preajmă (de ex. utilizatorii zonei tratate și a celor învecinate), în ceea ce privește campania de combatere a rozătoarelor.

Luați în considerare măsuri preventive de control (de ex. astuparea orificiilor, eliminarea alimentelor și a băuturilor din zonă), pentru a îmbunătăți asimilarea de produs și pentru a reduce posibilitatea unei invazii. Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, la intervale frecvente, conform regulamentelor prevăzute de codul relevant de bună practică.

Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu șoareci sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor

#### **4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

La poziționarea momelii în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că evitați contactul momelii cu apa.

#### **4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

#### **4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

#### **4.2. Descrierea utilizării**

**Tabel 2. Utilizarea #2 - Șoareci și/sau șobolani - Experți - La exterior, în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus  Denumirea comună: altele: #obolanul maro  Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui</p> <p>Denumirea stiintifica: Rattus rattus  Denumirea comună: altele: #obolanul de acoperi#  Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui</p> <p>Denumirea stiintifica: Mus musculus  Denumirea comună: altele: #oarecele de casă  Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui</p>
Domeniul (domeniile) de utilizare	<p>utilizare în exterior</p> <p>exterior, în jurul clădirilor</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală</p> <p>Descriere detaliata: Aplicare momeală Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării Puncte de momeală acoperite #i protejate. Aplicare directă în vizuină a momelii gata de utilizare</p>
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	<p>Frecven#a de aplicare: #oareci - 5-15g de momeală per punct de momeală. #obolani - 20-50g de momeală per punct de momeală</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare:  #obolani  Grad ridicat de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri  Grad redus de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 10 metri  #obolani</p> <p>20-60 g de momeală per vizuină.</p> <p>#oareci  Grad ridicat de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 2 metri  Grad redus de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Momeală în tub sau găleată PP/PE. 3 Kg, 5 Kg și 10 Kg.
--	---

#### 4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Protejați momeala contra condițiilor atmosferice. Poziționați punctele de momeală în zonele care nu sunt expuse inundațiilor.

Înlocuiți momeala de la punctele în care aceasta a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie. Pentru utilizarea în exterior, punctele de momeală trebuie acoperite și amplasate în zone strategice, pentru minimizarea expunerii la speciile nevizate.

Îndepărtați produsul rămas la finalul perioadei de tratament (cu excepția aplicării directe în vizuini).

Momelile trebuie amplasate astfel încât să minimizeze expunerea la speciile nevizate și la copii. Acoperiți sau blocați intrările vizuinilor cu momeală, pentru a reduce riscul respingerii sau vărsării momelii. Respectați toate instrucțiunile suplimentare furnizate de Codul de bună practică (sau echivalent).

Înlocuiți momeala mâncată numai după 3 zile și apoi la intervale maxime de 7 zile. Colectați momeala vărsată și rozătoarele moarte.

#### 4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este posibil, înainte de tratament, informați toate persoanele din preajmă (de ex. utilizatorii zonei tratate și a celor învecinate), în ceea ce privește campania de combatere a rozătoarelor.

Luați în considerare măsuri preventive de control (astuparea orificiilor, eliminarea alimentelor și a băuturilor din zonă), pentru a îmbunătăți asimilarea de produs și pentru a reduce posibilitatea unei invazii.

Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, la intervale frecvente, conform regulamentelor prevăzute de codul relevant de bună practică.

Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu șoareci sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.

#### 4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

La amplasarea punctelor de momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, anuri de irigație) sau sisteme de scurgere a apei, asigurați-vă că evitați contactul momelii cu apa.

#### 4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)



#### 4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

#### 4.3. Descrierea utilizării

**Tabel 3. Utilizarea #3 - Șoareci și/sau șobolani de casă - specialiști - La interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolanul maro Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui  Denumirea științifică: Rattus rattus Denumirea comună: altele: #obolanul de acoperi# Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui  Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: altele: #oarecele de casă Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior  La interior.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală  Descriere detaliată: Aplicare momeală Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #oareci - 5-15g de momeală per punct de momeală. #obolani - 20-50g de momeală per punct de momeală  Diluare (%): 0  Numărul #i calendarul de aplicare: #obolani Grad ridicat de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri Grad redus de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 10 metri  #oareci Grad ridicat de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 2 metri Grad redus de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioniști instruiți
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Momeală în tub sau găleată PP/PE. 3 Kg, 5 Kg și 10 Kg..

#### 4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează în cazul #oarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile, în cazul #obolanilor – numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

[Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.3)

#### 4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

#### 4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

### 4.4. Descrierea utilizării

**Tabel 4. Utilizarea #4 - Șoareci și/sau șobolani - Specialiști - La exterior, în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>Denumirea științifică: Rattus norvegicus  Denumirea comună: altele: #obolanul maro  Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui</p> <p>Denumirea științifică: Rattus rattus  Denumirea comună: altele: #obolanul de acoperi#  Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui</p> <p>Denumirea științifică: Mus musculus  Denumirea comună: altele: #oarecele de casă  Etapă de dezvoltare: altele: adul#i #i pui</p>
Domeniul (domeniile) de utilizare	<p>utilizare în exterior</p> <p>La exterior, în jurul clădirilor</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală</p> <p>Descriere detaliată: Aplicare momeală Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării</p>
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	<p>Frecven#a de aplicare: #oareci - 5-15g de momeală per punct de momeală. #obolani - 20-50g de momeală per punct de momeală</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare:  #obolani  Grad ridicat de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri  Grad redus de infestare - 20-50g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 10 metri</p> <p>#oareci  Grad ridicat de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 2 metri  Grad redus de infestare - 5-15g de momeală per punct de momeală, la distan#ă de câte 5 metri</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Momeală în tub sau găleată PP/PE. 3 Kg, 5 Kg #i 10 Kg.

---

#### 4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.

Capcanele se inspectează în cazul #oarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile la, în cazul #obolanilor – numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

[Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu introduceți produsul direct în vizuini.

#### 4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

#### 4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

---

## Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE<sup>1</sup>

### 5.1. Instrucțiuni de utilizare

Experți

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs, precum și toate informațiile care însoțesc produsul nostru, sau pe cele furnizate la punctul de vânzare.

Executați un test preliminar al zonei infestată și o evaluare la fața locului, pentru a identifica speciile de rozătoare, locul în care acestea acționează și pentru a stabili posibila cauză și dimensiunea infestării.

Îndepărtați alimentele accesibile rozătoarelor (de ex. cereale vărsate sau deșeurile alimentare). În plus, nu trebuie să faceți curățenie în zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru nu face altceva decât să perturbe populația de rozătoare, iar acceptarea momelii va fi mai dificilă de realizat.

Produsul ar trebui utilizat numai ca parte dintr-un sistem integrat de combatere a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Produsul ar trebui amplasat în imediata vecinătate a locurilor în care s-a explorat anterior activitatea rozătoarelor (de ex. trasee de deplasare, locurile cuiburilor, spațiile de hrănire, găurile, vizuinile, etc.).

În cazul în care este posibil, unitățile trebuie amplasate pe sol sau alte structuri.

Unitățile cu momeală trebuie etichetate clar, pentru a afișa conținutul de raticid și faptul că nu trebuie mutate sau deschise (vedeți secțiunea 5.3 pentru informațiile ce trebuie prezentate pe etichetă).

Momeala ar trebui securizată astfel încât să nu poată fi scoasă din unitatea respectivă.

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și a celor domestice sau a animalelor care nu sunt vizate.

Nu poziționați produsul în apropierea alimentelor, băuturilor și a hranei animalelor și nici în apropierea ustensilelor sau a suprafețelor care intră în contact cu acestea.

Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timp ce utilizați produsul. Spălați-vă pe mâini și pe pielea expusă direct, după utilizarea produsului.

În timpul etapei de manipulare a produsului, purtați mână de protecție, rezistente la substanțele chimice (materialul mănușilor trebuie specificat de către deținătorul autorizației în informațiile despre produs).

Frecvența vizitelor în zona tratată trebuie să fie la discreția operatorului, în funcție de analiza efectuată înainte de începerea tratamentului. Locațiile în care se folosește momeala în vizuină, ar trebui vizitate mai des decât cele în care se folosesc cutii securizate cu momeală. Frecvența ar trebui să corespundă cu recomandările furnizate de Codul de bună practică (sau echivalent).

Locațiile în care se folosește momeala în vizuină, ar trebui vizitate mai des decât cele în care se folosesc cutii securizate cu momeală.

În cazul în care consumul de momeală este relativ mic față de dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea punctelor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a trece la altă formulă a momelii.

În cazul în care se constată consumul momelii pe o perioadă de 35 de zile, dar nu se observă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza posibilă. Dacă s-au exclus alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente la tratament, așadar trebuie să luați în considerare utilizarea unui raticid non-anticoagulant, acolo unde este disponibil sau a unui raticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură alternativă de control.

Peleți de sine stătători: Amplasați momeala în punctul de momeală, folosind dispozitivul de dozare.

Specificați metodele pentru minimizarea prafului (de ex. șervețele umede).

Specialiști

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.

Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare).

Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

---

<sup>1</sup>Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

---

Analiza#i posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupa#i găurile, îndepărta#i cât mai mult posibil eventualele surse de hrană #i băutură) pentru a cre#te #ansa de consum al produsului #i pentru a reduce riscul de reinvadare.

Capcanele trebuie să fie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezen#a rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).

Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind con#inutul de rodenticide #i interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informa#iile care se înscriu pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum #i măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare. Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

Amplasa#i produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă #i alte animale nevizate.

Amplasa#i produsul la distan#ă de alimente, băuturi #i hrană pentru animale, precum #i de ustensilele sau suprafe#ele aflate în contact cu acestea.

[Atunci când este cazul, conform evaluării riscurilor:

Manipula#i produsul numai cu mânu#i de protec#ie împotriva substan#elor chimice (materialul mânu#ilor este specificat de titularul autoriza#iei în informa#iile privind produsul).

Dacă este relevant, specifica#i orice alt EIP (de exemplu, ochelari de protec#ie sau mască) obligatoriu la manipularea produsului.]

Nu consuma#i alimente sau băuturi #i nu fuma#i în timpul utilizării produsului.

După utilizarea produsului, spăla#i-vă mâinile #i pielea direct expusă.

Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, lua#i în considerare mutarea capcanelor în alte locuri #i o eventuală schimbare a formulei momelii.

Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile #i nu se observă o diminuare a activită#ii rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situa#ii.

Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezisten#ă, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

Lua#i în considerare #i utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

Îndepărta#i momeala rămasă sau capcanele la sfâr#itul perioadei de tratament.

Instruc#iuni de utilizare specifice diferitelor tipuri de momeli:

Pelete neagregate – granule sau boabe: Amplasa#i momeala în capcană folosind un recipient de dozare. Specifica#i metodele de reducere la minimum a prafului (de exemplu, #tergere umedă).

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Exper#i

În cazul în care este posibil, înainte de tratament, informa#i toate persoanele din apropiere despre campania de combatere a rozătoarelor.

Nu utiliza#i în zonele în care se suspectează o rezisten#ă la substan#a activă.

Produsele nu vor fi utilizate mai mult de 35 de zile, fără o evaluare a stării infestării #i a eficien#ei tratamentului.

În scopul gestionării rezisten#ei, nu trebuie să folosi#i prin rota#ie anticoagulan#i diferi#i cu poten#ă comparabilă sau mai slabă. Pentru utilizarea prin rota#ie, lua#i în calcul utilizarea unui raticid non-anticoagulant, dacă este disponibil sau a unui anticoagulant mai puternic.

Nu spăla#i unită#ile de momeală sau ustensilele folosite în punctele de momeală acoperite #i protejate cu apă, înainte de aplicare.

---

Elimina#i rozătoarele moarte în conformitate cu regulamentele locale.

Speciali#ti

Dacă este posibil, înainte de tratament, informa#i persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate #i ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].

Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, pe durata tratamentului căuta#i #i îndepărta#i frecvent rozătoarele moarte (de exemplu, cel pu#in de două ori pe săptămână)..

Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare #i a eficacită#ii tratamentului.

Nu utiliza#i momeli care con#in substan#e active anticoagulante ca momeli permanente pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.

Informa#iile despre produs (eticheta #i/sau prospectul) trebuie să indice în mod clar următoarele:

Produsul nu se furnizează publicului larg (de exemplu, „exclusiv pentru uz profesional”).

Produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării (de exemplu „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării”);

Utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informa#iile men#ionate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).

Acest produs ar trebui să elimine rozătoarele într-o perioadă de 35 de zile.

Informa#iile despre produs (eticheta #i/ sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar utilizatorului să contacteze furnizorul produsului sau un serviciu de deratizare în cazul în care există suspiciuni de ineficien#ă a produsului la sfâr#itul perioadei de tratament (se observă în continuare prezen#a rozătoarelor).

Nu spăla#i capcanele cu apă între aplicări.

Elimina#i rozătoarele moarte în conformitate cu cerin#ele locale.

### **5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Acest produs con#ine o substan#ă anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale #i gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafa#a pielii #i sânge în excremente sau în urină.

Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de:

expunere cutanată, spăla#i pielea cu apă, apoi cu apă #i săpun.

expunere oculară, clăti#i ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă #i #ine#i pleoapele deschise timp de cel pu#in 10 minute.

expunere orală, clăti#i atent gura cu apă.

Nu administra#i niciodată substan#e pe cale orală persoanelor incon#tiente.

Nu provoca#i voma.

---

În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului.

Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „denumirea produsului sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică [...]”.

Periculos pentru animalele sălbatice.

#### **5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale

Se recomandă utilizarea mănușilor.

#### **5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

Perioadă de valabilitate: 2 ani



---

## Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.