



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/19-12/50
URBROJ: 534-07-1/6-20-2
Zagreb, 13. siječnja 2020.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **VERTOX PASTA BAIT**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **26.4.2023.**

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Irske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda VERTOX PASTA BAIT.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 26.4.2023. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska,
2. Arhiva



1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovачki naziv(i) proizvoda

Trgovачki naziv	Vertox Pasta Pro
-----------------	------------------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Amay, Lyon, Francuska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/19-12/50	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0022094-0000	
Datum odobrenja	13.1.2020.	
Datum isteka odobrenja	26.4.2023.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newmann Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 13, Newmann Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjeno Kraljevstvo Hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GmbH Leinestr. 17 24539 Hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GmbH Leinestr. 17 24539 Neumünster Njemačka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Brodifakum
Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newmann Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Pratzka 54, 280 02 Kolín Češka

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl)-4-yl]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxyconnarin	Aktivna tvar	56073-10-0	239-980-5	0,005

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Vertox Pasta Bait

Vista proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/19-12/50

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0022094-0000

- 2.2. **Vrsta formulacije**
RB - mannac (pripremljen za uporabu); pasta

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJEŠTI

Oznaka upozorenja	H373 Može uzrokovati oštećenje organa (krvi) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H360D Može naškoditi nerođenom djetetu.
Oznake obavijesti	P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P280 Nositi zaštitne rukavice. P308+P313 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet ljecnika. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet ljecnika. P405 Skladitišiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj u na skladu s važećim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Profesionalni korisnici - miševi – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(ni) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> Kućni miš mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Način primjene	primjena manaca Mamci, spremni za uporabu, su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mannce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	5 do 20 g manaca po mjestu postavljanja. Jaka infestacija – 5 do 20 g manaca po mjestu izlaganja svaka 2 metra. Blaga infestacija – 5 do 20 g manaca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - - Za suzbijanje infestacije kućnim miševima u zatvorenom treba upotrijebiti 5 do 20 g manaca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja 5 kg. 10 g, 12 g ili 15 g pojedinačno pakirano u papirnatu vrećice isporučeno u: - spremnicima od PE/PP (kadiće ili kante) - kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE ili kartonskim ili PE vrećama u kartonskoj kutiji - vrećice od višeslojnog materijala papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili

višeslojnim PP vrećicama - u prodaji kao kave ili pakirane u kartonske kutije Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.	1 ili 2 x 10 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje manaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zavrtnjenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zavrtnjenom kartonskim vrhom.
Rasuti mannac pakiran u kadiće od PP ili PE sa toplinski zavrtnjenim poklopcem (10 g, 15 g ili 20 g). Kadiće su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadiće sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zavrtnjenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zavrtnjenom kartonskim vrhom.	1 ili 2 x 10 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje manaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zavrtnjenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zavrtnjenom kartonskim vrhom.
Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 48 g – 120, 144 96 g – 72, 96
Rasuti mannac pakiran u kadiće od PP ili PE sa toplinski zavrtnjenim poklopcem (10 g, 15 g ili 20 g). Kadiće su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadiće sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zavrtnjenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zavrtnjenom kartonskim vrhom.	1 x 15 g i-bag vrećica pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje manaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2, 3 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zavrtnjenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zavrtnjenom kartonskim vrhom.
Veličine pakiranja: 5 kg.	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 45 g – 120 60 g – 96
Rasuta pasta u PP ili PE ambalaži za primjenu sa špatlom.	Rasuta pasta u PP ili PE ambalaži za primjenu sa špatlom.
Veličine pakiranja: 5 kg.	Veličine pakiranja: 5 kg.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Postavljene zaštitne (deratizacijske) kutije sa mamcem treba provjeravati svaka 2 do 3 dana na početku tretiranja te nakon toga barem jednom tjedno, kako bi se utvrdilo je li mamac privlačen, jesu li kutije sa mamcem neoštećene i uklonilo uginule glodavce. Kada je potrebno, nadomjestiti pojedini mamac.

- [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nema.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojednosti o vjerojanim izvorim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nezgde za zaštitu okoliša

Kada se kutije sa mamcem postavljaju u blizini sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nema.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, izvjet skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Nema.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Profesionalni korisnici - štakori – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Clijni organizam(m) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Način primjene	primjena mamaca Mamci, spremani za uporabu, su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učešarosti	10 do 60 g po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. Slaba infestacija – 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. Za suzbijanje infestacije štakovima u zatvorenom treba upotrijebiti 10 - 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.
Kategorije korisnika	profesionalac

Većine pakiranja i ambalažni materijal

Najmanja većina pakiranja 5 kg.

10 g, 12 g ili 15 g pojedinačno pakirano u papirnate vrećice isporučeno u spremnicima od PE/PP (kadice ili kante) kartonskim kutijama iznutra presvućenim PE ili kartonskim ili PE vrećama u kartonskoj kutiji- vrećice od višeslojnog materijala papir/PE/AL, PP, PET/PE ili višeslojnim PP vrećicama - u prodaji kao takve ili pakirane u kartonske kutije.
Većine pakiranja: 5 kg: 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.

Rasuti mamac pakiran u kadice od vlaknaste ploče, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) sa toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije
Većine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg

Rasuti mamac pakiran u kadice od PP ili PE sa toplinski zabrtvljenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u blister vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrtom.
Većine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg

1, 2 ili 3 x 15 g l-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu, sve pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrtom.
Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od:

45 g – 120
60 g – 96

90 g – 60, 72

120 g – 48, 60, 72

180 g – 32, 48

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g l-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2, 3, ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrtom.
Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od:

40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72

	160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60
	Rasuta pasta u PP ili PE ambalaži za primjenu sa špatulom. Veličine pakiranja: 5 kg.

4.2.1. *Mjere za uporabu specifične za uporabu*

- Postavljene zaštitne (deratizacijske) kutije sa mamcem treba provjeravati 5 do 7 dana nakon početka tretiranja te barem jednom (jedno nakon toga, kako bi se utvrdilo je li mamac prihvaćen, jesu li kutije neotšete i kako bi se uklonilo uginule glodavce. Prema potrebi nadomjestiti pojedini mamac.
- [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nema

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinačno o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nezgode za zaštitu okolisa*

Kada se kutije sa mamcem postavljaju u blizini sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze*

Nema

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u neotšetenim uvjetima skladištenja*

Nema

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Profesionalni korisnici – kućni miševi i/ili štakori – na otvorenom nokolo zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštitna od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(i) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> i <i>Rattus norvegicus</i> kućni miš i smeđi štakor mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom nokolo zgrada
Nakini primjene	primjena mamaca Mamci, spremni za uporabu, su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i	Miševi: 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Jaka infestacija – 5 do 20 g

Kategorije korisnika	Veličine pakiranja i ambalažni materijal
profesionalac	manca po mjestu postavljanja svakih 2 metra. Slaba infestacija – 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra. Štakori: 10 do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Jaka infestacija – 10 do 60g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra. Slaba infestacija – 10 do 60g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metra. -- Za suzbijanje infestacije kućnim miševima na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metra u slučaju blage infestacije. Za suzbijanje infestacije štakorima na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti 10 - 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.
Najmanja veličina pakiranja 5 kg.	Rasuti mamac pakiran u kadice od PP ili PE sa toplinski zabrtvljenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) sa toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg
	Rasuti mamac pakiran u kadice od PP ili PE sa toplinski zabrtvljenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama složene kao 1/2x4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg
	1 ili 2 x 10 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje mamaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Veličine pakiranja: Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 40 g – 144 80 g – 72, 96
	1 x 12 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje mamaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku

<p>kućiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom.</p> <p>Više zaštitnih (deratizacijskih) kućija za miševe u pakiranjima od:</p> <p>48 g – 120, 144</p> <p>96 g – 72, 96</p>	<p>1 x 15 g t-bag vrećica pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kućiju za izlaganje mamaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2, 3 ili 4 pakovanja u kartonsku kućiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom.</p> <p>Više zaštitnih (deratizacijskih) kućija za miševe u pakiranjima od:</p> <p>45 g – 120</p> <p>60 g – 96</p>
<p>1, 2 ili 3 x 15 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kućijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonskoj kućiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom.</p> <p>Više zaštitnih (deratizacijskih) kućija za štakore u pakiranjima od:</p> <p>45 g – 120</p> <p>60 g – 96</p> <p>90 g – 60, 72</p> <p>120 g – 48, 60, 72</p> <p>180 g – 32, 48</p>	<p>1, 2 ili 3 x 15 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kućijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2, 3, ili 4 kom u kartonskoj kućiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenim kartonskim vrhom.</p> <p>Više zaštitnih (deratizacijskih) kućija za štakore u pakiranjima od:</p> <p>40 g – 144</p> <p>50 g – 120, 144</p> <p>60 g – 96, 120</p> <p>80 g – 72, 96</p> <p>90 g – 60, 72, 96</p> <p>100 g – 60, 72, 96</p> <p>120 g – 48, 60, 72</p> <p>150 g – 48, 60, 72</p> <p>160 g – 32, 48, 60, 72</p> <p>200 g – 32, 48, 60</p>
	<p>Rasuta pasta u PP ili PE ambalazi za primjenu sa spatulom.</p> <p>Velikine pakiranja: 5 kg.</p>

4.3.1. Upine za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od atmosferskih uvjeta (npr. kiše, snijega itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja
- Postavljene zaštitne (deratizacijske) kućije s manceom treba provjeravati [za miševe - najmanje 2 do 3 dana] [za štakore - 5 do 7 dana] na početku tretiranja te barem jednom tjedno nakon toga, kako bi se utvrdilo je li mamac

prithvaćen, jesu li kućije neoštećene i kako bi se uklonilo uginule glodavce. Prema potrebi nadonjestiti pojedini mamac.

- Zamjeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Proizvod ne postavljati izravno u rupu glodavaca.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojednosto o vjerojanim izvorima i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju izlaska za zaštitu okolisa

Kada se kućije sa manceom postavljaju u blizini površinskih voda (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze

Nema

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Nema

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba br. 4 – Osposobljeni profesionalci - kućini miševi i/ili štakori – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, očan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(n)i (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> i <i>Rattus norvegicus</i> kućni miš i smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom U zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca Mamci, spremni za uporabu, su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kućije za mance osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.
Količine kod primjene i učestalost	Miševi: 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja svakih 2 metra. Slaba infestacija – 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara Štakori: 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 10 do 60g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara Slaba infestacija – 10 do 60g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara
	Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kućiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije. Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti 10 - 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kućiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.

Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalci
Velikine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Najmanja veličina pakiranja 5 kg.</p> <p>10 g, 12 g ili 15 g pojedinačno pakirano u papirnate vrećice isporučeno u: - spremnicima od PE/PP (kadice ili kante)- kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE ili kartonskim ili PE vrećama u kartonskoj kutiji - vrećice od višeslojnog materijala papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili višeslojnim PP vrećicama - u prodaji kao takve ili pakirane u kartonske kutije. Veličine pakiranja: 5 kg: 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg Rasuti manac pakiran u kadice od PVC, PS, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) sa toplinski zaštitnim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije/veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg Rasuti manac pakiran u kadice od PP ili PE sa toplinski zaštitnim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g ili 60 g). Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zaštitnoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zaštitnom kartonskim vrhom. Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg 1 ili 2 x 10 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje manaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zaštitnoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zaštitnom kartonskim vrhom. Veličine pakiranja: Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 40 g – 144; 80 g – 72; 96 1 x 12 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje manaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zaštitnoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zaštitnom kartonskim vrhom. Veličine pakiranja: Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 48 g – 120; 144; 96 g – 72; 96 1 x 15 g t-bag vrećica pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje manaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2, 3 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zaštitnoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zaštitnom kartonskim vrhom. Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 45 g – 120; 60 g – 96 1, 2 ili 3 x 15 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu;</p>

sve pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zaštitnoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zaštitnom kartonskim vrhom. Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od: 45 g – 120; 60 g – 96; 90 g – 60; 72; 120 g – 48; 60; 72; 180 g – 32; 48
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2, 3, ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zaštitnoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zaštitnom kartonskim vrhom. Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od: 40 g – 144; 50 g – 120; 144; 60 g – 96; 120; 80 g – 72; 96; 90 g – 60; 72; 96; 100 g – 60; 72; 96; 120 g – 48; 60; 72; 150 g – 48; 60; 72; 160 g – 32; 48; 60; 72; 200 g – 32; 48; 60
Rasuta pasta u PP ili PE ambalaži za primjenu sa špatulom. Veličine pakiranja: 5 kg.

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju tretiranja ukloniti ostatke proizvoda.

- [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijesiti sve moguće proizlaktike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.

- Razmorniti mogućnosti primjene preventivnih mjera (zatvoriti npr. uklonite hranu i pice što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumnacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.

- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse)

- Ne koristiti proizvod kao trajni manac za prevenciju nagleda glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojednosto o vjerojatanim izvorima i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju izlaska

Kada se kutije sa mamcem postavljaju u blizini površinskih voda (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju, osigurati da manac ne dođe u dodir s vodom.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nema

4.4.5. Ako su specifične za uporabu, upute skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Nema

4.5. Opis uporabe

Tablica 5: Upraba br. 5 – Oспособljeni profesionalci - kućni miševi i/ili štakori – na otvorenom okolištu

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(i) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> i <i>Rattus norvegicus</i> kućni miš i smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom na otvorenom ukoliko zgrada
Način primjene	primjena mamaca Mamac, spreman za uporabu, su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.
Količine kod primjene i učestalost	Miševi: 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 5 do 20g mamca po mjestu izlaganja svakih 2 metra. Slaba infestacija – 5 do 20g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. Štakori: 10 do 60 g po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 10 do 60g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. Slaba infestacija – 10 do 60g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije. Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti 10 - 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije. Pulsno postavljanje mamca – Miševi: 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja svaka 2 metra Slaba infestacija – 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara Štakori: 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja. Jaka infestacija – 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara Slaba infestacija – 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalci
Većine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja većina pakiranja 5 kg: 10 g, 12 g ili 15 g pojedinačno pakirano u papirnate vrećice isporučeno u: - spremnicima od PE/PP (kadiće ili kane) - kartonskim kutijama iznutra presvućenim PE ili kartonskim ili PE vrećama u kartonskoj kutiji - vrećice od višeslojnog materijala papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili višeslojnim PP vrećicama - u prodaji kao takve ili pakirane u kartonske kutije. Većine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.
	Rasuti mamac pakiran u kadiće od vlaknaste ploče, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) sa toplinski završljenim poklopcem. Više kadića je pakirano u kartonske kutije Većine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg

Rasuti mamac pakiran u kadiće od PP ili PE sa toplinski završljenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Kadiće su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadiće sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski završljivoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski završljenom kartonskim vrhom.	Većine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg
1 ili 2 x 10 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje mamaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski završljivoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski završljenom kartonskim vrhom.	Većine pakiranja: Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 40 g – 144 80 g – 72, 96
1 x 12 g papirnata vrećica kao za čaj pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje mamaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski završljivoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski završljenom kartonskim vrhom.	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 48 g – 120, 144 96 g – 72, 96
1 x 15 g t-bag vrećica pakirano u zaštitnu (deratizacijsku) kutiju za izlaganje mamaca za miševe od HDPE ili PP koja je zaštićena od neovlaštenog otvaranja, sve pakirano po 1, 2, 3 ili 4 pakovanja u kartonsku kutiju ili u blister pakiranje ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski završljivoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski završljenom kartonskim vrhom.	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za miševe u pakiranjima od: 45 g – 120 60 g – 96
1, 2 ili 3 x 15 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski završljivoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski završljenom kartonskim vrhom.	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od: 45 g – 120 60 g – 96 90 g – 60, 72 120 g – 48, 60, 72 180 g – 32, 48
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2, 3, ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski završljivoj vrećici ili u	

vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenim kartonskim vrhom.
Više zaštitnih (dezarizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od:
40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72
160 g – 32, 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60
Rasuta pasta u PP ili PE ambalaži za primjenu sa špatulom.
Veličine pakiranja: 5 kg.

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamce zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesto postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
 - Zamjeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
 - [Gdje je primjenjivo] Stijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.
- Kod primjene izravno u jazbine: Mamce postaviti na način da se smanji mogućnost izlaganja ne-ciljnim organizmima i djeci. Prekriti ili blokirati ulaze u rupe u kojima je mamac postavljen da se smanji rizik od rasipanja i odbijanja mamca.
- Kod pulsnog postavljanja mamca: Zamijeniti pojedini mamac prvo nakon 3 dana, a zatim u intervalima od najviše 7 dana. Sakupiti rasuti mamac i uginule glodavce. [Gdje je primjenjivo] Stijediti specifične upute koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse na nacionalnoj razini.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće proklatnike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolnu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnosti primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak kao trajni mamac za prevenciju najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinačnost o vjerojajnim izravnim i posrednim načinima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okolisa

Kada se kućije sa mamcem postavljaju u blizini površinskih voda (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze

Nema

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u neobijeljenim uvjetima skladištenja

Nema

4.6. Opis upotrebe Tablica 6. Uporaba br. 6 – Osposobljeni profesionalci - štakori – kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštitna od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(m) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	Kanalizacija
Način primjene	primjena mamaca Mamce za izravnu primjenu za privlačenje ili postavljanje u zaštitne (dezarizacijske) kutije za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s opadnim vodama.
Količine kod primjene i učestalost	U kanalizaciji, postaviti 200 g do 300 g mamca svakih 30-50 m (ne više od 300 g po kanalizacijskom sahnu), - - U kanalizaciji, postaviti 200 g do 300 g mamca svakih 30-50 m (ne više od 300 g po kanalizacijskom sahnu).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalci
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja 5 kg.
	10 g, 12 g ili 15 g pojedinačno pakirano u papirnate vrećice isporučeno u: - spremnicima od PE/PP (kadice ili kane), kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE ili kartonskim ili PE vrećama u kartonskoj kutiji- vrećice od višeslojnog materijala papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili višeslojnim PP vrećicama - u prodaji kao takve ili pakirane u kartonske kutije.
	Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.
	Rasuti mamac pakiran u kadice od vlaknaste ploče, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) sa toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadića je pakirano u kartonske kutije
	Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.
	Rasuti mamac pakiran u kadice od PP ili PE sa toplinski zabrtvljenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Kadice su pakirane u zaštitne (dezarizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštitene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (dezarizacijskim) kutijama složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom.
	Veličine pakiranja: 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; 11 kg; 12 kg; 13 kg; 14 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 18 kg; 19 kg; 20 kg.
	1, 2 ili 3 x 15 g l-bag vrećice pričvršćene na fleksnu metalnu šipku u zaštitnim (dezarizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštitene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranja ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom.

	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od: 45 g – 120 60 g – 96 90 g – 60, 72 120 g – 48, 60, 72 180 g – 32, 48
	1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-bag vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za štakore od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu; sve pakirano po 1, 2, 3, ili 4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenim kartonskim vrhom.
	Više zaštitnih (deratizacijskih) kutija za štakore u pakiranjima od: 40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96 100 g – 60, 72, 96 120 g – 48, 60, 72 150 g – 48, 60, 72 160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60
	Rasuta pasta u PP ili PE ambalaži za primjenu sa spatulom. Većične pakiranja: 5 kg.

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamce treba postaviti na način da ne dođu u dodir s vodom i da ih voda ne može odnijeti.
- [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- [Ako to zahtijeva nacionalna politika ili zakonodavstvo] Postaviti mamce samo u kanalizacijski sustav koji je povezan s pogonom za obradu otpadnih voda.
- Proizvod ne koristiti u tretmanima s pulsirnim postavljanjem mamca.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinašni o vjerojanim izvorima i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okolika

Kada se kutije sa mamcem postavljaju u blizini površinskih voda (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nema

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Nema

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Profesionalni korisnici

- Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojani uzrok i opseg infestacije.

- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostaci hrane ili posuti zrnati proizvodi), osim toga nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uzemljuje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetocinima (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

- Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. zatepiti trupe, ukloniti potencijalnu hranu i pije što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

- Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (na primjer plitovi kretanja, legla, mjesta hranjenja, rupa, jazbina itd.).

- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticid i da se ne smiju prenositi ni otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražiti u odjeljku 5.3 SPČa).

- Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja, navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

- Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

- Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljanih životinja.

- Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pica i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

- Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

- Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

- Ako se sumnja da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, treba razmisliti o preinještavanju kutija s mamcima na dalja mjesta i mogućnosti zamjene drugom formulacijom mamca.

- Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opzra se smanjena aktivnost glodavaca, treba odrediti mogući uzrok tomu. Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci pa treba razmotriti upotrebu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti upotrebu zanki kao alternativne mjere kontrole.

- Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

- Upute za uporabu koje su "specifične za mamce":

- Mamac u vrećicama: Ne otvarati vrećice koje sadrže mamac.

- Pasta:

a) [Gdje je primjenjivo] Postaviti mamac u obliku paste koristeći dovoljno dugačak aplikator (spatulu) da se osigura izloženost ruke - izbjegavati poszezanje u kanalu.

o b) [Gdje je primjenjivo] Specificirati kako očistiti opremu (npr. spatulu) i kako izbjeci dodir s ostacima mamca.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu

- vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati otkriti vjerojani uzrok i opseg infestacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvod), osim toga nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prilivakanje mamaca.
- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.
- Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. zatepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
- Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (p. putovi kretanja, legla, mjesta hranjenja, trpa, jazbina itd.)
- Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticid i da se ne smiju premješati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražiti u odjeljku 5.3 SP/Ča).
- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i upute o postopcima prve pomoći u slučaju otrovanja, navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.
- Mamce treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Kutije s mamcem treba postaviti izvan doseg a djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.
- Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).
- Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.
- O učestalosti posjeta tretiranom području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene, što bi trebalo biti usklađeno s preporukama iz mjepodavneog kodeksa najbolje prakse.
- Ako se sumnja da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, treba razmisliti o premještanju kutija s mamcima na druga mjesta i mogućnost zamjene drugom formulacijom mamca.
- Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opaža se smanjena aktivnost glodavca, treba odrediti mogući uzrok tomu. Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci pa treba razmotriti upotrebu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti upotrebu zamki kao alternativne mjere kontrole.
- Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.
- Upute za uporabu koje su "specifične za mamce":
 - Mamac u vrećicama: [za vrećice koje se otvaraju - Ne otvarati vrećice koje sadrže mamac]
 - Pasta:
 - o a) [Gdje je primjenjivo] Postaviti mamac u obliku paste koristeći dovoljno dugačak aplikator (spatulu) da smanji izloženost ruku - izbjegavati posezanje u kantu.
 - o b) [Gdje je primjenjivo] Specificirati kako očistiti opremu (npr. spatulu) i kako izbjći dodir s ostacima mamca.
- Pulisno postavljanje mamca - Nadomjestiti pojedini mamac nakon 3 dana i zatim u intervalima od najviše 7 dana. Sakupiti rasuti mamac i uginule glodavce. [Gdje je primjenjivo] Slijediti specifične upute koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse na nacionalnoj razini.
- Prekrivena mjesta izlaganja i kutije za izlaganje mamaca – [Kod primjene na otvorenom, mjesta izlaganja moraju biti prekrivena i postavljena na strateška mjesta da se smanji izloženost ne-ciljnih vrsta]. [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.
- Postavljanje mamca u jazbine - Mamce postaviti na način da se smanji mogućnost izlaganja ne-ciljnih organizmima i djece. Prekriti ili blokirati ulaze u rupe u kojima je mamac postavljen da se smanji rizik od rasipanja i odliaganja mamca. [Gdje je primjenjivo] Slijediti sve dodatne smjernice koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Profesionalni korisnici
 - Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije, skladu sa smjernicama relevantnog Kodeksa dobre prakse.
 - Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otrovanje glodavce treba završiti u dvosmrcnu plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarsvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.
 - Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dvaput tjedno), u skladu s preporukama odgovarajućeg Kodeksa dobre prakse.
 - Proizvod se ne smije koristiti više od 35 dana bez procjene stanja infestacije i učinkovitosti tretmana.
 - Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Oposobljeni profesionalni korisnici:

- Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije, skladu sa smjernicama relevantnog Kodeksa dobre prakse.
- Informacije o proizvodu (i: Uputa i/ili deklaracija) trebaju sadržavati upozorenje da pripravak mogu nabaviti samo kvalificirani profesionalni korisnici koji posjeduju certifikat koji potvrđuje sukladnost s odgovarajućim zahtjevima izobrazbe (npr. "samo za osposobljene profesionalce"). - Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati više od 35 dana bez procjene brojnosti populacije i učinkovitosti primjene. Ne primjenjivati naznajnično antikoagulantne istog načina djelovanja ili slabije učinkovitosti radi upravljanja rezistencijom.
- Za naznajničnu upotrebu razmotriti upotrebu ne-antikoagulantnih rodenticida, ako su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantna.
- Izravno primljena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posude koje se upotrebljavalo na pokrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.
- Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otrovanje glodavce treba završiti u dvosmrcnu plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu, odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

Postavljanje mamca u jazbine - Gdje je to moguće, prije tretiranja obavijestiti stanare i korisnike o provođenju deratizacije [ako postoje, u skladu sa primjenjivim kodeksom dobre prakse]

5.3. Pojednostavnost i vjerojatnost izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i uključuju krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.

Antidot: Vitamin K1 koji smiju primjenjivati samo medicinski/veterinarski stručnjaci.

U slučaju:

Dodira s kožom: oprati izloženu kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.
 Dodira s očima: treba isprati oči tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta.

U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet ljecnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.

Ako je kućni ljubimac progutao proizvod, potražiti savjet veterinara.

Kutije za izlaganje mamaca moraju imati isključive sljedeće informacije: "ne mlatiti i ne otvarati", "sadrži rodenticid", "naziv proizvoda i broj odobrenja", "aktivna tvar(i)" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja [01/2348-342]".

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Po završetku tretiranja, zbrinuti ostatke mamca i pakiranje u skladu s lokalnim propisima. Ako je preporučeno, nositi rukavice.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i prozračnom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla. Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci,pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Držati samo u izvornom spremniku.

Rok upotrebe: 24 mjeseca.

6. OSTALE INFORMACIJE

Zbog odgođenog početka djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana do pojave vidljivih znakova otrovanja.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su klijesta.

Ovaj proizvod sadrži goraku tvar i boju.