

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-YH032682-30 για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **Ratoli Fresh Bait** ως προς το εμπορικό όνομα του προϊόντος, τη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας που περιέχεται σε αυτό και τη σήμανση και ταξινόμησή του,

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **Ratoli Fresh Bait** ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0024

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

18/12/2013

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

**IMPEX EUROPA, S.L.**

Avda de Pontevedra no 39, 36600 Pontevedra, Ισπανία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση  
στην τοπική αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd  
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd  
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Ratoli Secure Fresh Bait

2. Τύπος Προϊόντων: **ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα**

3. Κατηγορία χρηστών: **Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση**

4. Μορφή: **RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας**

**Δραστική ουσία:**

bromadiolone 0,0029% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate

**Βοηθητικές ουσίες:** 99,9971% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: **IMPEX EUROPA, S.L., Ισπανία**

**Γ) Δραστική ουσία**

1. Κοινή Ονομασία: **bromadiolone**

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, **97%**  
σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: **Laboratorios Agrochem S.L., Ισπανία**

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

**III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων**

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/08/2020.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.


3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν τηληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

#### IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

Ημερομηνία: 26/10/2018



**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**  
**Ratoli Secure Fresh Bait**

**Αρ. Άδειας: KY-0024**

## **1. Διοικητικές πληροφορίες**

### **1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Ratoli Secure Fresh Bait	Κύπρος

### **1.2. Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b> IMPEX EUROPA, S.L.
	<b>Διεύθυνση</b> Avda. de Pontevedra Nº 39, 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedra, Ισπανία
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0024
<b>Ημερομηνία χορήγησης άδειας</b>	18/12/2013
<b>Ημερομηνία λήξης άδειας</b>	31/08/2020

### **1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	IMPEX EUROPA, S.L.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Avda. de Pontevedra Nº 39, 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedra, Ισπανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Polígono Industrial Trabanca-Badiña, Calle C, Parcelas 22-24, Ισπανία

### **1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών**

<b>Δραστική ουσία</b>	bromadiolone
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Laboratorios Agrochem S.L.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud), 08292, Esparreguera (Barcelona) Ισπανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud), 08292, Esparreguera (Barcelona) Ισπανία

## **2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευασμάτος**

### **2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
bromadiolone	-	Δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,0029

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

### **2.2. Τύπος σκευασμάτος**

RB-Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

## **3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	-
<b>Δήλωση επικινδυνότητας</b>	
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>ΕU208</b> Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (στο αἷμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	-
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P102</b> Μακριά από παιδιά. <b>P103</b> Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. <b>P220</b> Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές <b>P262</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια <b>P301 + P310</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. <b>P314</b> Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. <b>P404</b> Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη <b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. <b>P501</b> Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Παρατηρήσεις	Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Άρμοδια Αρχή».
--------------	---

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Περιγραφή της χρήσης

#### Πίνακας 1. Ερασιτεχνική χρήση – Μέσα/Γύρω από τα κτήρια

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Οι δολωματικοί σταθμοί / τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται με το χέρι στη προσβεβλημένη με τρωκτικά περιοχή. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεωθούν στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα  <i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Τα δολώματα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται τυχαία.
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς (αρουραίοι ή ποντίκια).  <u>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:</u> Τα δολώματα τοποθετούνται όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά

	διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.  Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 40γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.  Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Μη επαγγελματίες (Ερασιτέχνες χρήστες)
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ατομικά σακουλάκια 10, 15, 20 και 50g εντός συσκευασίας των 100g, 200g, 250g, 300g, 500g και 1 kg.

## **Πίνακας 2. Επαγγελματική χρήση – Εσωτερική χρήση**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.  Οι δολωματικοί σταθμοί / τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται με το χέρι στη προσβεβλημένη με τρωκτικά περιοχή. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεωθούν στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα  <i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.  Τα δολώματα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται τυχαία.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	<u>Δολωματική εφαρμογή</u> Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.

	<p>Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 100γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους; σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>1) Ατομικά σακουλάκια 10, 15, 20 και 50g εντός συσκευασίας των 100g, 200g, 250g, 300g, 500g και 1 kg.</p> <p>2) Ατομικά σακουλάκια 10, 15, 20 και 50g εντός συσκευασίας των 100g, 200g, 250g, 300g, 500g, 1kg, 2kg, 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg.</p> <p><b>Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».</b></p>

### **Πίνακας 3. Επαγγελματική χρήση – Εξωτερική χρήση γύρω από τα κτήρια**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος (σταθμοί ασφαλείας) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απομάκρυνσης και η διασπορά του δολώματος από τα τρωκτικά. Το προϊόν μπορεί επίσης να τοποθετείται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα</p>
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	<p>Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p> <p>Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν επίσης να ασφαλίζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά.</p> <p>Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι</p>

	<p>δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	<p><u>Δολωματική εφαρμογή</u></p> <p>Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς.</p> <p>Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p> <p><u>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:</u> Τοποθετήστε δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολωμάτων αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεωρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 100γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής.</p> <p>Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες

<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ατομικά σακουλάκια 10, 15, 20 και 50g εντός συσκευασίας των 100g, 200g, 250g, 300g, 500g, 1kg.2kg, 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg  Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώληση του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».
--------------------------------------	--

#### **Πίνακας 4. Επαγγελματική χρήση – Υπαίθρια χρήση και Χωματερές**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για υπαίθρια χρήση σε χωματερές. Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος (σταθμοί ασφαλείας), ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στην τρύπα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απομάκρυνσης και η διασπορά του δολώματος από τα τρωκτικά. Το προϊόν μπορεί επίσης να τοποθετείται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Για υπαίθρια χρήση σε χωματερές. Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στην τρύπα. Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν επίσης να ασφαλίζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά. Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους.  Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	<u>Δολωματική εφαρμογή</u>  Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς.  Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία δόλωσης.  <u>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:</u> Τοποθετήστε δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα

	ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μείωστε την απόσταση σε 5 m.  Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ατομικά σακουλάκια 10, 15, 20 και 50g εντός συσκευασίας των 300g, 500g και 1 kg. 2kg, 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg.  <b>Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».</b>

#### **Πίνακας 5. Επαγγελματική χρήση – Σε υπονόμους**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της</b>	Για χρήση σε υπονόμους από επαγγελματίες.

<b>εγκεκριμένης χρήσης</b>	Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Για χρήση σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Η ευπάθεια (πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	<u>Δολωματική εφαρμογή</u>  Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένα / προστατευμένα σημεία δόλωσης. Το δόλωμα τοποθετείται ανά θέση σε υπάρχουσες κατασκευές ώστε να εξασφαλίσετε ότι το δόλωμα δεν θα παρασυρθεί με τό νερό. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των δολωμάτων και αντικατάσταση όσων έχουν καταναλωθεί ή καταστραφεί, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Να γίνεται επανάληψη του προγράμματος σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.  Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ατομικά σάκουλάκια τσαγιού 10, 15, 20 και 50g εντός συσκευασίας των 300g, 500g και 1 kg.2kg, 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg.  Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».

## 5. Οδηγίες για τη χρήση

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

#### Επαγγελματίες Χρήστες

-Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες

που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

-Διεξάγετε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη προσβεβλημένη περιοχή και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

-Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή παρά μόνο πριν τη εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

-Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

-Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι, φωλιές, τροφές, τρύπες, αυλάκια κλπ.).

-Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλα σημεία.

-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).

-Το δόλωμα πρέπει να ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρύνθει από τον δολωματικό σταθμό.

-Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

-Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.

-Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

-Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

-Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής πρέπει να βρίσκεται στη κρίση του επαγγελματία χρήστη, και εξαρτάται από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

-Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το διαφαινόμενο μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την αντικατάσταση των δολωματικών σημείων σε άλλες θέσεις και τη πιθανότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.

-Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

## **Ευρύ κοινό**

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή παρά μόνο πριν τη εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση από όπου παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι, φωλιές, χώροι φύλαξης τροφίμων, τρύπες, αυλάκια κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα εξαιρουμένου των συσκευασιών όπου το προϊόν είναι σε χύμα μορφή κόκκων (επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες)
- Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωματος μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωσης μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε σταθμούς δόλωσης κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του
- Αφαιρέστε το εναπομείναν δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

## **5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου**

### **Επαγγελματίες Χρήστες**

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία για ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέρα των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση του επιπέδου προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ή των μόνιμων εφαρμογών με δόλωμα υπό ορισμένες συνθήκες.
- Για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας, να μην γίνεται η εναλλαγή των αντιπηκτικών σκευασμάτων με αντίστοιχη ή ασθενέστερη δραστικότητα. Για εναλλασσόμενη χρήση εξετάστε την πιθανότητα, εάν υπάρχει, ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοτόνου, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού σκευάσματος.

-Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήθηκε σαν δολωματικός σταθμός με νερό μεταξύ εφαρμογών.

-Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### **Ευρύ Κοινό**

-Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (ανοίξτε τρύπες, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν)

-Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμη λύση (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά

-Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ετικέτα και / ή το φύλλο οδηγιών) πρέπει να καταστούν σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (δηλαδή παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα τρωκτικού), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσετε μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.

-Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.

-Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

Η βρωμαδιολόνη (*bromadiolone*) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 µg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες

#### **Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

Σε περίπτωση:

- Επαφής με το δέρμα, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
- Επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με κατάλληλο υγρό ή νερό, κρατήστε τα μάτια ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα στο άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Απορρίψτε τη συσκευασία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

-Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φώς.

-Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής

-Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

### **6. Άλλες πληροφορίες**

-