

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Clothianidin RB 1

Produkttyp(er)

PT18: Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

Godkännandenummer: 5557

R4BP-tillgångsnummer: SE-0021339-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	MAXFORCE PLATIN
-------------	-----------------

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	Bayer AB
	Adress	c/o Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S Sverige
Godkännandenummer		5557
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0021339-0000
Datum för godkännande		16/08/2019
Utgångsdatum för godkännande		15/07/2029

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Bayer S.A.S.- Division Crop Science
Tillverkarens adress	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Cedex 09 Fran krike
Tillverkningsställets belägenhet	Bayer S.A.S.- Division Crop Science site 1 Bayer SAS - Division Crop Science - Site Marle, Z.I. Antoine Laurent de Lavoisier F-02250 Marle-sur-Serre Frankrike Bayer S.A.S.- Division Crop Science site 2 Norbert/ Jacobson Co.—3060 Southpark Blvd 30294 Ellenwood, Georgia USA

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitrogu anidin (Klotianidin)
Tillverkarens namn	Bayer SAS
Tillverkarens adress	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Cedex 09 Fran krike
Tillverkningsställets belägenhet	Bayer SAS 16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin (Klotianidin)		verksamt ämne	210880-92-5	433-460-1	1,026 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

RB Bruksfärdigt bete

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208: Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-c hloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one/2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. { 1::} P273: Undvik utsläpp till miljön. P391: Samla upp spill.

	<p>Små t.ex. Tysk kackerlacka En droppe x 0,1 g Två droppar x 0,1 g</p> <p>Stor t.ex. Orientalisk kackerlacka, Amerikansk kackerlacka Två droppar x 0,1 g Tre droppar x 0,1 g</p> <p>Gelen ska lämnas: i minst 14 dagar för små kackerlackor i minst 4 veckor för orientalisk kackerlacka i minst 12 veckor för amerikansk kackerlacka för att uppnå optimal effekt. Om kackerlackor fortfarande är synliga efter en månad så kan färsk gel appliceras.</p> <p>Mot Silverfisk: 20 små droppar (ca 3 mm i diameter) eller 65 små droppar (ca 2 mm i diameter) motsvarar 0,1g - 0,2g per m² Gelen ska lämnas i minst 8 veckor för att uppnå optimal effekt. Om silverfiskar fortfarande är synliga därefter så kan färsk gel appliceras.</p> <p>Applicera inte mer än en gång per månad.</p>
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Förpackning och doseringsspruta, plast: PE, 10-30g Sprutan kan återförslutas med medföljande kork (PP).

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Vänligen se sektionerna 5.1 och 6

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vänligen se sektion 5.2

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Vänligen se sektion 5.3

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Vänligen se sektion 5.4

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Vänligen se sektion 5.5

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Produkten doseras med lämplig gelapplicator. Efter behandlingen ska den tomma patronen avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt. Om patronen endast har använts delvis ska den tas bort från applicatorn, förseglas med det medföljande locket och därefter förvaras enligt anvisningarna.

Före behandling ska området undersökas med lämplig metod för att identifiera var angrepp förekommer tex genom att använda fällor och/eller aerosoler för att jaga ut skadedjuren, leta efter spillning, ömsad hud, äggskal ect.

För maximal effekt ska produkten appliceras vid skadedjurens tillhåll och på vägen till deras födokällor. Ytterligare så ska alla andra födokällor för kackerlackor (avfall, matrester osv.) avlägsnas från det angripna området för att uppmuntra intag av gelen.

Produkten är speciellt användbar på områden där konventionella insekticider inte kan användas, såsom i närheten av elektiska eller elektroniska apparater.

På platser där man identifierat spridning av kackerlackor är det lämpligt att utöka appliceringen av produkten även till omkringliggande områden för att förbättra bekämpningen och undvika ytterligare spridning.

Applicering ska ske som punktbehandling (droppar eller smala strängar) i dolda, svåråtkomliga områden såsom hörn, sprickor och springor. Undvik väldigt dammiga, fuktiga och smutsiga ytor.

Produkten skall appliceras så att barn och husdjur inte kommer i kontakt med den.

Applicera inte produkten på ytor som våttorkas.

Applicera inte produkten i områden som nyligen behandlats med annan insekticid och undvik att kontaminera gelen med andra insekticider.

En effekt av bekämpningen kan förväntas väldigt snabbt och döda insekter kan ses inom 24 timmar efter påbörjad behandling. Maximal effekt uppnås mellan 6 dagar och 2 månader efter påbörjad bekämpning beroend på storleken på angreppet så länge gelen finns kvar.

Vid stora angrepp inspektera appliceringspunkterna regelbundet (en gång i månaden) och applicera mer gel vid behov.

För användning mot silverfisk: Applicera flera små droppar i områden där silvberfiskarna bor och gömmer sig, ex. Under trösklar, lister, paneler etc.

Undvik kontinuerlig användning av produkten.

Använd inte i djurinhägnader och burar.

Avlägsnande av gammal produkt/gel ska göras av professionell skadedjursbekämpare.

LÄS ANVISNINGARNA NOGA INNAN ANVÄNDNING

INFORMERA REGISTRERINGSINNEHAVAREN OM EFFEKTEN UTEBLIR

APPLICERA INTE PÅ ABSORBERANDE YTOR

EXPONERA INTE BETET FÖR SOLLJUS ELLER VÄRME (T.EX. ELEMENT)

SKYDDA FRÅN VATTEN

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- Undvik applicering på väldigt dammiga, fuktiga och smutsiga ytor. Applicera inte produkten på ytor som våttorkas. Speciell uppmärksamhet ska ges till springor, håligheter och andra ställen insekter kan gömma sig,

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

men även bakom och under maskiner, hushållsmaskiner och rördragningar. Produkten kan placeras i håligheter, ventilation, hiss schakt, elektiska och elektroniska apparater etc.

- Produkten ska inte användas i stallar, djurinhägnader och burar.
- Rekommenderas inte i byggnader där det finns insektsätande fåglar och reptiler.

- Förvaras oåtkomligt för barn och icke målorganismer/husdjur.
- Använd lämpliga skyddshandskar som uppfyller kraven i europeiska standarden EN 374 vid hantering av produkten.
- Unvik kontakt med huden.
- Tvätta händer och exponerad hud innan du äter och efter användning.
- Använd inte/applicera inte direkt på eller nära mat, foder eller drycker, eller på ytor eller redskap som sannolikt kommer att vara i direkt kontakt med mat, foder, drycker och boskap/husdjur. Applicera inte direkt på ytor där mat eller foder förvaras, tillagas eller äts.
- Applicera enbart på platser som är oåtkomliga för barn, husdjur och icke-målorganismer.
- Öppna inte eller försök att återfylla doseringssprutor.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Allmänna råd

Om större mängder spills är följande råd: Utrym riskområdet. Lägg och transportera den drabbade i en stabil position (liggande på sidan). Ta omedelbart av kontaminerade kläder och kassera på ett säkert sätt. Om nödvändigt ta den drabbade personen till läkare och ha om möjligt förpackning eller etikett till hands.

LÄMNA ALDRIG EN FÖRGIFTAD PERSON ENSAM!

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan användning. Tvätta huden med vatten. Om hudirritation eller klåda uppkommer: kontakta läkare..

Ögonkontakt: Om symtom uppkommer spola med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN._

Förtäring: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN om symtom uppkommer.

Råd till läkare och vårdpersonal: Ge symtomatisk behandling och vård.

VID KONTAKT MED GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ELLER LÄKARE HA FÖRPACKNING ELLER ETIKETT TILL HANDS.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Häll inte ut oanvänd produkt på marken, i vattendrag, i rör (handfat, toaletter osv.) eller i avloppet.

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Överblivet bete kan avlägnas med svamp eller våt trasa med en 5% natrium klorid lösning. Rengöringsmaterial (svamp, trasa osv.) ska placeras i torrsopporna.

Hårdnat bete kan avlägnas med spatel och ska placeras i torrsopporna.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara på en säker plats.

Skyddas från solljus.

Hållbarhet: 24 månader.

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Information: En del känsliga material såsom textilier kan fläckas av produkten. Prova först på en liten undanskymd yta om osäkerhet finns.

Potentiell resistensbildning mot klotianidin hos insekter som ska bekämpas ska tas hänsyn till vid användning av produkten. För att undvika resistens kan följande metoder användas:

- Tillämpa integrerade bekämpningsmetoder såsom kombinationer av kemiska och fysiska kontrollmetoder och god hygien, med hänsyn tagen till lokala förhållanden (klimatförhållanden, målorganismer, användningsvillkor osv.).
- Följ alltid produktens användningsinstruktioner som står på etiketten med avseende på applicering och dosering.
- Alternera produkter som innehåller aktiva substanser med ett annat verkningsätt.
- Det rekommenderas att använda Maxforce Platin i ett integrerat bekämpningsprogram.
- Regelbundna kontroller av effektiviteten bör genomföras för att säkerställa att resistens inte uppstår och för att undvika risker för återangrepp.
- I eventuella fall där användningsinstruktionerna åtföljts och det trots det uppvisas resistens ska liknande produkter undvikas som ersättare, särskilt neonikotinoider.
- Om bevis på resistens finns så ska alla åtgärder sättas in för att utrota den behandlade populationen. Åtgärderna kan innehålla ett antal olika både kemiska och mekaniska metoder.

Produkten innehåller klotianidin som är giftigt för bin.