

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** Klerat Wax Blocks

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

**Numărul curent:** RO/2019/0181/MRA/UK-2015-0907

**Numărul curent R4BP 3:** RO-0015469-0000

## Cuprins

|   |    |
|---|----|
| Informații administrative   | 1  |
| 1.1. Denumirea comercială a produsului  | 1  |
| 1.2. Detinatorul autorizației   | 1  |
| 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide   | 1  |
| 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active   | 1  |
| 2. Compoziția și formularea produsului  | 2  |
| 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid   | 2  |
| 2.2. Tipul preparatului   | 2  |
| 3. Fraze de pericol și de precauție   | 2  |
| 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)  | 3  |
| 5. Direcții generale de utilizare   | 12 |
| 5.1. Instrucțiuni de utilizare  | 12 |
| 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor  | 14 |
| 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului | 15 |
| 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia   | 16 |
| 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare  | 17 |
| 6. Alte informații  | 17 |

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

Klerat Cuburi de Ceară

### 1.2. Detinatorul autorizației

|  |                               |                                       |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b> | Numele                        | Syngenta Crop Protection AG           |
|  | Adresa                        | Rosentalstrasse 67 4058 Basel Elveția |
| <b>Numărul curent</b>                              | RO/2019/0181/MRA/UK-2015-0907 |                                       |
| <b>Numărul curent R4BP 3</b>                       | RO-0015469-0000               |                                       |
| <b>Data autorizației</b>                           | 22/07/2013                    |                                       |
| <b>Data de expirare a autorizației</b>             | 01/07/2024                    |                                       |

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Numele producatorului</b>         | Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd         |
| <b>Adresa producătorului</b>         | Dr. Köves János u. 3 H-2943 Bábolna Ungaria |
| <b>Adresa locurilor de producție</b> | Dr. Köves János u. 3 H-2943 Bábolna Ungaria |

### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Substanța activă</b>              | 11 - Brodifacum                       |
| <b>Numele producătorului</b>         | Vertellus Specialties UK Ltd          |
| <b>Adresa producătorului</b>         | Hale Bank WA8 8NS Widnes Regatul Unit |
| <b>Adresa locurilor de producție</b> | Hale Bank WA8 8NS Widnes Regatul Unit |

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC   | Funcția          | Numărul CAS | Numărul CE | Continut (%) |
|------------------|---|------------------|-------------|------------|--------------|
| Brodifacum       | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | Substanța activă | 56073-10-0  | 259-980-5  | 0,005        |

### 2.2. Tipul preparatului

|                               |
|-------------------------------|
| RB - Bait (gata de utilizare) |
|-------------------------------|

## 3. Fraze de pericol și de precauție

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fraze de pericol</b>   | <p>Poate dăuna fătului.</p> <p>Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.</p>   |
| <b>Fraze de precauție</b> | <p>Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.</p> <p>A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.</p> <p>Purtați mănuși de protecție.</p> <p>ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.</p> <p>A se depozita sub cheie.</p> <p>Aruncați conținutul la în conformitate cu legislația.</p> |

Aruncați recipientul la în conformitate cu legislația.

## 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

### 4.1 Modul de utilizare

#### Utilizarea 1 - Utilizarea #1 – Șoareci de casă și/sau șobolani – Experți – La interior

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Inaplicabil pentru rodenticide  |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: șobolan maro<br>etapă de dezvoltare: adulți și pui<br><br>denumirea științifică: Mus musculus<br>denumirea comună: șoarecele de casă<br>etapă de dezvoltare: adulți și pui<br><br>denumirea științifică: Rattus rattus<br>denumirea comună: șobolanul negru sau de acoperiș<br>etapă de dezvoltare: adulți și pui   |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | de interior<br><br>La interior  |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br><br>Aplicare momeală<br><br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării<br>Puncte de momeală acoperite și protejate.   |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: Șobolani - 1-3 blocuri (20-60g) de momeală per punct de momeală. Șoareci - 1 bloc (20g) de momeală per punct de momeală.<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Pregătit de utilizare.<br>Șobolani<br>Grad ridicat de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri.<br>Grad redus de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 10 metri.<br>Șoareci<br>Grad ridicat de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 2 metri.<br>Grad redus de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri. |

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

instruiți profesional

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

blocuri de ceară de 20g într-un tub sau o găleată PP/PE. 3kg, 5kg și 10kg.

**4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.  
Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile, apoi la intervale de cel mult 7 zile.  
Îndepărtați resturile de momeală și rozătoarele moarte.  
[Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

**4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul]".  
Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.  
Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.  
Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.  
Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.  
Acest produs se utilizează numai în circumstanțe excepționale, atunci când măsurile de combatere nechimice și formulele momelilor convenționale sunt considerate ineficace.  
Acest produs se utilizează numai la interior și în locuri inaccesibile copiilor sau animalelor nevizitate.

**4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

**4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

**4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

## 4.2 Modul de utilizare

### Utilizarea 2 - Utilizarea #2 - Șoareci și/sau șobolani - Experți - La exterior, în jurul clădirilor

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide  |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Inaplicabil pentru rodenticide   |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: șobolanul maro<br>etapă de dezvoltare: adult și pui<br><br>denumirea științifică: Mus musculus<br>denumirea comună: șoarecele de casă<br>etapă de dezvoltare: adult și pui<br><br>denumirea științifică: Rattus rattus<br>denumirea comună: șobolanul negru sau de acoperiș<br>etapă de dezvoltare: adult și pui   |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | în aer liber<br><br>În exterior, în jurul clădirilor   |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br><br>Aplicare momeală -<br><br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării<br>Puncte de momeală acoperite și protejate.<br>Aplicare directă în vizuină a momelii gata de utilizare   |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: Șobolani - 1-3 blocuri (20-60g) de momeală per punct de momeală. Șoareci - 1 bloc (20g) de momeală per punct de momeală.<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Pregătit de utilizare.<br>Șobolani<br>Grad ridicat de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri.<br>Grad redus de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 10 metri.<br>Șobolani<br><br>20-60 g de momeală per vizuină.<br><br>Șoareci<br>Grad ridicat de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 2 metri.<br>Grad redus de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri. |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>                     | instruiți profesional  |

## Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

blocuri de ceară de 20g într-un tub sau o găleată  
PP/PE. 3kg, 5kg și 10kg.

### 4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Protejați momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.

Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament

Momelile trebuie să fie amplasate astfel încât să reducă la minimum expunerea speciilor nevzate și a copiilor.  
Acoperiți sau blocați intrările în vizuinele cu momeală, pentru a reduce riscul de respingere și împrăștiere a acestora.  
[Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

### 4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este posibil, înainte de tratament, informați toate persoanele din preajmă (de ex. utilizatorii zonei tratate și a celor învecinate), în ceea ce privește campania de combatere a rozătoarelor.  
Luați în considerare măsuri preventive de control (astuparea orificiilor, eliminarea alimentelor și a băuturilor din zonă), pentru a îmbunătăți asimilarea de produs și pentru a reduce posibilitatea unei invazii.  
Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, la intervale frecvente, conform regulamentelor prevăzute de codul relevant de bună practică.  
Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu șoareci sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.

### 4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

### 4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

### 4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)



### 4.3 Modul de utilizare

#### Utilizarea 3 - Utilizarea #3 - Șobolani – Experti – Canalizare

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Inaplicabil pentru rodenticide  |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: șobolanul maro<br>etapă de dezvoltare: adult și pui   |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | în aer liber<br><br>Canalizare  |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br>Aplicare momeală<br>Momeala gata de utilizare se fixează sau se aplică în capcane astfel încât să se prevină intrarea în contact cu apele uzate.<br>Puncte de momeală acoperite și protejate. |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: 1-10 blocuri (20-200g) per gură de vizitare<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>pregătit de utilizare<br>1-10 blocuri (20-200g) per gură de vizitare.   |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>                     | instruiți profesional   |
| <b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>         | blocuri de ceară de 20g într-un tub sau o găleată<br>PP/PE. 3kg, 5kg și 10kg.   |

#### 4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Momelile trebuie să fie aplicate astfel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie îndepărtate de apă.  
[Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

### 4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Introduceți momelile numai în rețele de canalizare conectate la stația de epurare a apelor uzate.

Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii

### 4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.3)

### 4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

### 4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

## 4.4 Modul de utilizare

### Utilizarea 4 - Utilizarea #4 – Șoareci de casă și/sau șobolani – Specialiști – La interior

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Inaplicabil pentru rodenticide  |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: șobolan maro<br>etapă de dezvoltare: adulți și pui<br><br>denumirea științifică: Mus musculus<br>denumirea comună: șoarecele de casă<br>etapă de dezvoltare: adulți și pui<br><br>denumirea științifică: Rattus rattus<br>denumirea comună: șobolanul negru sau de acoperiș<br>etapă de dezvoltare: adulți și pui |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | de interior<br><br>La interior<br><br>Metoda: cerere momeală  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                      | Descriere detaliata:<br>Aplicare momeală<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării  |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>             | Frecvența de aplicare: Șobolani - 1-3 blocuri (20-60g) de momeală per punct de momeală. Șoareci - 1 bloc (20g) de momeală per punct de momeală.<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Pregătit de utilizare.<br>Șobolani<br>Grad ridicat de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri.<br>Grad redus de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 10 metri.<br>Șoareci<br>Grad ridicat de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 2 metri.<br>Grad redus de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri. |
| <b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>             | instruiți profesional   |
| <b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b> | blocuri de ceară de 20g într-un tub sau o găleată<br>PP/PE. 3kg, 5kg și 10kg.   |

#### 4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile la, în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar. [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.2)

#### 4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

#### 4.4.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

### 4.5 Modul de utilizare

#### Utilizarea 5 - Utilizarea #5 - Șoareci și/sau șobolani - Specialiști - La exterior, în jurul clădirilor

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul produsului</b>   | TP 14 - Rodenticide   |
| <b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>        | Inaplicabil pentru rodenticide  |
| <b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b> | denumirea științifică: Rattus norvegicus<br>denumirea comună: șobolanul maro<br>etapă de dezvoltare: adult și pui<br><br>denumirea științifică: Mus musculus<br>denumirea comună: șoarecele de casă<br>etapă de dezvoltare: adult și pui<br><br>denumirea științifică: Rattus rattus<br>denumirea comună: șobolanul negru sau de acoperiș<br>etapă de dezvoltare: adult și pui  |
| <b>Domeniul de utilizare</b>                                      | în aer liber<br><br>La exterior, în jurul clădirilor  |
| <b>Metoda (metodele) de aplicare</b>                              | Metoda: cerere momeală<br>Descriere detaliată:<br><br>Aplicare momeală -<br>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării  |
| <b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>                     | Frecvența de aplicare: Șobolani - 1-3 blocuri (20-60g) de momeală per punct de momeală. Șoareci - 1 bloc (20g) de momeală per punct de momeală.<br>Diluare (%): 0<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Pregătit de utilizare.<br>Șobolani<br>Grad ridicat de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri.<br>Grad redus de infestare: 20-60g de momeală per punct de momeală, la fiecare 10 metri.<br>Șoareci<br>Grad ridicat de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 2 metri.<br>Grad redus de infestare: 20g de momeală per punct de momeală, la fiecare 5 metri. |

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

instruiți profesional

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

blocuri de ceară de 20g într-un tub sau o găleată  
PP/PE. 3kg, 5kg și 10kg.

#### 4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.

Capcanele se inspectează în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile la, în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

[Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu introduceți produsul direct în vizuini.

#### 4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.4)

#### 4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile de utilizare (5.5)

## **5. Direcții generale de utilizare**

### **5.1. Instrucțiuni de utilizare**

## Experți

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.

Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare).

Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).

Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.

Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.

Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.

[Atunci când este cazul, conform evaluării riscurilor:

Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile privind produsul).

Dacă este relevant, specificați orice alt EIP (de exemplu, ochelari de protecție sau mască) obligatoriu la manipularea produsului.]

Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.

Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament.

Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici relevant.

Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.

Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații.

Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea

unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

#### Specialiști

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.

Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare).

Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

Capcanele trebuie să fie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).

Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.

Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.

Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.

[Atunci când este cazul, conform evaluării riscurilor:

Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile privind produsul).

Dacă este relevant, specificați orice alt EIP (de exemplu, ochelari de protecție sau mască) obligatoriu la manipularea produsului.]

Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului.

După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.

Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.

Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații.

Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

Îndepărtați momeala rămasă sau capcanele la sfârșitul perioadei de tratament.

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor



#### Experți

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].

Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să specifice în mod clar că produsul se furnizează exclusiv utilizatorilor experți, posesori ai unor certificări care să ateste îndeplinirea cerințelor de formare aplicabile (de exemplu, „numai pentru experți”).

A nu se utiliza în zone în care poate fi suspectată o rezistență la substanța activă.

Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului.

Nu utilizați prin rotație anticoagulanți diferiți, cu potență comparabilă sau mai mică, în scopul gestionării rezistenței.

Pentru utilizarea prin rotație, analizați posibilitatea folosirii unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui anticoagulant cu potență mai mare.

Între aplicări, nu spălați cu apă capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite și protejate.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

#### Specialiști

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].

Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, pe durata tratamentului căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).

Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului.

Nu utilizați momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.

Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să indice în mod clar următoarele:

Produsul nu se furnizează publicului larg (de exemplu, „exclusiv pentru uz profesional”).

produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii și a deteriorării (de exemplu „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării”);

utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informațiile menționate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).

Acest produs ar trebui să elimine rozătoarele într-o perioadă de 35 de zile.

Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar utilizatorului să contacteze furnizorul produsului sau un serviciu de deratizare în cazul în care există suspiciuni de ineficiență a produsului la sfârșitul perioadei de tratament (se observă în continuare prezența rozătoarelor).

Nu spălați capcanele cu apă între aplicări.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

### 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.

Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de:

expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

expunere orală, clătiți atent gura cu apă.

Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente.

Nu provocați voma.

În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului.

Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „denumirea produsului sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică [...]”.

Periculos pentru animalele sălbatice.

#### **5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale

## 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

Perioadă de valabilitate: 2 ani

## 6. Alte informații

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.