

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Klerat Waxblocks

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0027

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0003888-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Klerat Waxblocks
-------------------	------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I.
	Διεύθυνση	Anthousas Avenue 15349 Anthoussa Ελλάδα
Αριθμός άδειας		KY-0027
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0003888-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		22/07/2013
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Dr. Köves János u. 3 H-2943 Bábolna Ουγγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd, Dr. Köves János u. 3 H 2943 Bábolna Ουγγαρία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rosentalstrasse 67 4058 Βασιλεία Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Aurorium UK Ltd., Hale Bank WA8 8NS Widnes Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση -.
Δηλώσεις προφύλαξης	P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Επαγγελματική χρήση – Εσωτερική χρήση κατά των ποντικών ή/και αρουραίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: roof rat Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: roof rat Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: ποντίκια - 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης; αρουραίους - 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Για τους αρουραίους Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα. Για τα ποντίκια:

	Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεγέθη συσκευασιών: 3, 5 & 10 κιλά Υλικό συσκευασίας: Κύβοι των 20 γρ χύδην συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία σωληνάριο (κυλινδρική συσκευασία) ή κουβά PP/PE

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Να αντικαθιστάτε τα φαγωμένα δολώματα μόνο μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια να αφήνετε 7 ημέρες μεσοδιάστημα μεταξύ των αντικαταστάσεων. Συλλέξτε πιθανόν δόλωμα που έχει χυθεί όπως και να απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.4)

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.5)

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Επαγγελματική χρήση – Εξωτερική χρήση γύρω από τα κτήρια κατά των ποντικών ή/και αρουραίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: roof rat Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: roof rat Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης. Απευθείας εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος εντός των στοών.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: ποντίκια - 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης; αρουραίους - 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης

	<p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Για τους αρουραίους Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20-60 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα.</p> <p>Για τα ποντίκια: Υψηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλό επίπεδο προσβολής: 20 γραμ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Μεγέθη συσκευασιών: 3, 5 & 10 κιλά</p> <p>Υλικό συσκευασίας: Κύβοι των 20 γρ χύδην συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία σωληνάριο (κυλινδρική συσκευασία) ή κουβά PP/PE</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Αντικαταστήστε σε οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι προστατευμένοι και τοποθετημένοι σε στρατηγικά σημεία ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε οργανισμούς μη-στόχους. Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών (εκτός και αν εφαρμόζεται απευθείας σε στοές).

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε παιδιά και οργανισμούς μη-στόχους. Καλύψτε ή σφραγίστε τις εισόδους των δολωμένων στοών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να απομακρυνθεί το δόλωμα. Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Να αντικαθιστάτε τα φαγωμένα δολώματα μόνο μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια να αφήνετε 7 ημέρες μεσοδιάστημα μεταξύ των αντικαταστάσεων. Συλλέξτε πιθανόν δόλωμα που έχει χυθεί όπως και να απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.4)

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.5)

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Επαγγελματική χρήση – Σε υπονόμους κατά των αρουραίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα άτομα Επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: άλλο: αρουραίος των οροφών Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά και ενήλικα άτομα
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Άλλο Υπόνομοι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα. Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20-200 γραμ. ανά φρεάτιο Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 20-200 γραμ. ανά φρεάτιο
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεγέθη συσκευασιών: 3, 5 & 10 κιλά Υλικό συσκευασίας: Κύβοι των 20 γρ χύδην συσκευασμένοι σε εξωτερική συσκευασία σωληνάριο (κυλινδρική συσκευασία) ή κουβά PP/PE

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην εκπλένονται.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα πλαίσια εφαρμογής με τη διαδικασία της τακτικής δόλωσης.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.3)

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.4)

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε οδηγίες χρήσεως (5.5)

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγύμια, κ.λπ.).

Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).

Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής. Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται δόλωση σε στοές θα πρέπει να επισκέπτονται συχνότερα από τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείτε η δόλωση σε κουτία.

Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.

Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.

Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Σε περίπτωση στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητό άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401.]».

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.

Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.