

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

STORM Ultra

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije: KLASA:UP/-543-04/19-12/18

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0020748-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

| | |
|--------------------|---|
| Trgovački naziv(i) | Storm Ultra Storm Ultra Secure Veor Veor Secure Secuvia Secuvia Secure |
|--------------------|---|

1.2. Nositelj autorizacije

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Naziv i adresa nositelja autorizacije | Ime/naziv | BASF Croatia d.o.o. |
| | Adresa | Slavonska avenija 1b 10000 Zagreb Hrvatska |
| Broj autorizacije | KLASA:UP/-543-04/19-12/18 | |
| Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) | HR-0020748-0000 | |
| Datum autorizacije | 07/12/2018 | |
| Datum isteka autorizacije | 01/07/2025 | |

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

| | |
|-----------------------------|---|
| Naziv proizvođača | BASF Agro B.V. Arnhem (NL) – Freienbach Branch |
| Adresa proizvođača | Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Švicarska |
| Lokacija proizvodnih pogona | St. Michaels Industrial Estate WA8 8TJ Widnes Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Njemačka |

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

| | |
|-----------------------------|--|
| Aktivna tvar | Flokumafen |
| Naziv proizvođača | BASF Agro B.V. Arnhem (NL) – Freienbach Branch |
| Adresa proizvođača | Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Švicarska |
| Lokacija proizvodnih pogona | Lower Road WA8 8 NS Halebank Widnes Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske |

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|------------------|--|--------------|------------|-----------|-------------|
| Flokumafen | 4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4- tetrahydro-3- [4-(4- trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1- naphthyl]coumarin | aktivna tvar | 90035-08-8 | 421-960-0 | 0,0025 |

2.2. Vrsta(e) formulacija

XX Ostalo: mamac spreman za uporabu - blok

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

| | |
|-------------------|--|
| Oznake upozorenja | |
| Oznake obavijesti | |

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. suzbijanje kućnih miševa - opća javnost - u zatvorenom

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 1-2 metara. |
| Kategorija(e) korisnika | opća javnost (neprofesionalci) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 15 g – 100 g Mamci (5g/25g) pakirani u: - PP kutije otporne na neovlašteno rukovanje pakirane u PET/PE spremnik ili kartonsku kutiju koja se može ponovno zatvoriti - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeravati barem svaka 2 do 3 dana na početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga pogledati da li je li mamac konzumiran, da li su kutije/zaštita mamca netaknuti te ukloniti tijela glodavaca.

Dopuniti kutije s mamcima prema potrebi.

Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (na primjer klopke).

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.1.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama u opisu proizvoda”).

Ako proizvod do kraja predviđenog vremena postavljanja na infestiranom području ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

Korisnici moraju povremeno provjeriti, potražiti i ukloniti glodavce koji su uginuli tijekom tretmana.

Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima. Učestalost provjera ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.1.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.1.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. suzbijanje štakora – opća javnost – u zatvorenom

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: ostalo: crni štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu (u vrećicama za rasuti mamac) koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: 50 g - 75 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Mamci: 50 g - 75 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5-10 metara. |
| Kategorija(e) korisnika | opća javnost (neprofesionalci) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 50 g – 300 g Mamci (5g/25g) pakirani u: - PP kutije otporne na neovlašteno rukovanje pakirane u PET/PE spremnik ili kartonsku kutiju koja se može ponovno zatvoriti - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku primjene i barem jednom tjedno nakon toga te pogledati je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela glodavaca.

Dopuniti kutije s mamcima prema potrebi.

Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (na primjer klopke).

Kutije s mamcem postavite na područja koja nisu u blizini drenažnih sustava zbog mogućnosti kontakta s vodom. Po završetku uporabe zamijenite preostale mamce ili kutije s mamcem.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.2.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama u opisu proizvoda”).

Ako proizvod do kraja predviđenog vremena postavljanja na infestiranom području ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

Korisnici moraju povremeno provjeriti, potražiti i ukloniti glodavce koji su uginuli tijekom tretmana. Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima. Učestalost provjera ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.2.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.2.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. suzbijanje štakora – opća javnost – na otvorenom, oko zgrada

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno za rodenticides |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: ostalo: crni štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | upotreba na otvorenome Na otvorenom, oko zgrada |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu (u vrećicama za rasuti mamac) koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: 50 g - 75 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5-10 metara. |
| Kategorija(e) korisnika | opća javnost (neprofesionalci) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 50 g – 300 g |

Mamci (5g/25g) pakirani u:

- PP kutije otporne na neovlašteno rukovanje pakirane u PET/PE spremnik ili kartonsku kutiju koja se može ponovno zatvoriti
- PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem
- PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija)

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku primjene i barem jednom tjedno nakon toga te pogledati je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela glodavaca.

Dopuniti kutije s mamcima prema potrebi.

Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (na primjer klopke).

Kutije s mamcem postavite na područja koja nisu u blizini drenažnih sustava zbog mogućnosti kontakta s vodom.

Po završetku uporabe zamijenite preostale mamce ili kutije s mamcem.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.3.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama u opisu proizvoda”).

Ako proizvod do kraja predviđenog vremena postavljanja na infestiranom području ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

Korisnici moraju povremeno provjeriti, potražiti i ukloniti glodavce koji su uginuli tijekom tretmana.

Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima. Učestalost provjera ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.

Uporaba ovog proizvoda trebala bi dovesti do uklanjanja glodavaca u roku od 35 dana.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.3.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.3.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. suzbijanje kućnih miševa – profesionalni korisnici – u zatvorenom

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome u zatvorenom |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu (u vrećicama za rasuti mamac) koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: 15 g - 25 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 1-2 metra. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 3 kg – 10 kg Mamci (5g/25g) pakirani u: - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem |

| |
|---|
| - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |
|---|

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga i pogledati je li mamac konzumiran, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela glodavaca. Mamac ponovno napuniti prema potrebi.

Po završetku uporabe ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.4.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja kutije s mamcem blizu sustava odvodnje, izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.4.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.4.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. suzbijanje štakora – profesionalni korisnici – u zatvorenom

| | |
|-----------------|-------------------|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
|-----------------|-------------------|

| | |
|--|---|
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: ostalo: crni štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu (u vrećicama za rasuti mamac) koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: 50 g - 75 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Mamci: 50 g - 75 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5-10 metara. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 3 kg – 10 kg Mamci (5g/25g) pakirani u: - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga i pogledati je li mamac konzumiran, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela glodavaca.

Dopuniti kutije s mamcima prema potrebi.

Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (na primjer klopke).

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama u opisu proizvoda”).

Ako proizvod do kraja predviđenog vremena postavljanja na infestiranom području ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

Korisnici moraju povremeno provjeriti, potražiti i ukloniti glodavce koji su uginuli tijekom tretmana. Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima. Učestalost provjera ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.5.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja kutije s mamcem blizu sustava odvodnje, izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.5.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.5.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. suzbijanje kućnih miševa i štakora – profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

| | |
|--|---|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: ostalo: crni štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | upotreba na otvorenome Na otvorenom Na otvorenom oko zgrada |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu (u vrećicama za rasuti mamac) koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Miš: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Štakori: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Miš: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 1 – 2 metra. Štakori: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5-10 metara. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 3 kg – 10 kg Mamci (5 g/25 g) pakirani u: - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem |

| | |
|--|---|
| | - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |
|--|---|

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštititi mamac od atmosferskih uvjeta (na primjer kiše, snijega itd.). Kutije s mamcem postavite na područja koja nisu izložena poplavama.

Kutije s mamcem treba provjeriti [za miševe – barem svaka 2 do 3 dana] [za štakore – samo 5 do 7 dana] od početka primjene i barem jednom tjedno nakon toga i pogledati je li mamac konzumiran, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela glodavaca. Kutije s mamcem napuniti prema potrebi.

Zamijeniti mamce u kutijama s mamcem koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama u opisu proizvoda”).

Ako proizvod do kraja predviđenog vremena postavljanja na infestiranom području ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

Korisnici moraju povremeno provjeriti, potražiti i ukloniti glodavce koji su uginuli tijekom tretmana.

Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima. Učestalost provjera ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.

Uporaba ovog proizvoda trebala bi dovesti do uklanjanja glodavaca u roku od 35 dana.

Po završetku uporabe ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.6.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ovaj proizvod ne primjenjivati izravno u jazbinama.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja kutija s mamcem u blizini površinskih voda (na primjer rijeka, jezera, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje, potrebno je izbjegavati kontakt vode i mamca.

4.6.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.6.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. suzbijanje kućnih miševa i štakora – osposobljeni profesionalci – u zatvorenom

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: ostalo: crni štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome U zatvorenom |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu Povremeno postavljanje mamaca (pulsni tretman):Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Miš: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Štakori: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Miš: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Štakori: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Povremeno postavljanje mamaca (pulsni tretman) |
| Kategorija(e) korisnika | osposobljeni profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | |

| | |
|--|--|
| | <p>Osposobljeni profesionalci</p> <p>Veličina pakiranja: 3 kg – 10 kg</p> <p>Mamci (5 g/25 g) pakirani u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |
|--|--|

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Pojedene mamce potrebno je zamijeniti tek nakon 3 dana, a nakon toga u razdoblju ne duljem od 7 dana. O učestalosti posjeta tretiranom području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti usklađena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najbolje prakse. U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama ili poklopcima, odnosno sa zaštitom mamca. Zaštita mamca/kutija/poklopac mora biti pričvršćena da onemogući neželjeno pomicanje/rukovanje/premještanje mamca (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje onemogućuju kontakt/pomicanje/diranje/premještanje mamaca”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama u opisu proizvoda”).

Ako proizvod do kraja predviđenog vremena postavljanja na infestiranom području ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu (tj. deklaracija i/ili upute) jasno preporučuju korisniku da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

Korisnici moraju povremeno provjeriti, potražiti i ukloniti glodavce koji su uginuli tijekom tretmana. Uginule glodavce odložite u skladu s lokalnim propisima. Učestalost provjera ne smije biti manja od one za pregledavanje kutija s mamcem.

Uporaba ovog proizvoda trebala bi dovesti do uklanjanja glodavaca u roku od 35 dana.

Skupiti prosute mamce i uginule glodavce.

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.7.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije tretiranja obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njegovog okruženja [u skladu s primjenjivim kodeksom dobre prakse, ako postoje]).

U obzir je potrebno uzeti preventivne kontrolne mjere (začepiti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.

Kako bi se smanjio rizik sekundarnog otrovanja, potrebno je često potražiti i ukloniti uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama navedenim u mjerodavnom kodeksu dobre prakse.

Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja kutija s mamcem u blizini sustava odvodnje, potrebno je izbjegavati kontakt vode i mamca.

4.7.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.7.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.8. Opis uporabe

Tablica 8. suzbijanje kućnih miševa i štakora – osposobljeni profesionalci – na otvorenom oko zgrada

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | PT14: Rodenticidi |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> |

| | |
|--|---|
| | Uobičajeno ime: ostalo: crni štakor Stadij razvoja: ostalo: mlade i odrasle jedinke |
| Područje(a) uporabe | upotreba na otvorenome Na otvorenom Na otvorenom oko zgrada |
| Način(i) primjene | Metoda: ostalo: Mamac spreman za uporabu Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu Povremeno postavljanje mamaca (pulsni tretman): Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje. Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca Izravno postavljanje mamaca spremnih za uporabu u jazbine |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene: Miš: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Štakori: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Miš: 15 g – 25 g mamca po kutiji s mamcem. Štakori: 50 g – 75 g mamca po kutiji s mamcem. Povremeno postavljanje mamaca (pulsni tretman) Miš: 15 g - 25 g mamca po kutiji s mamcem Štakori: 50 g - 75 g mamca po kutiji s mamcem 50 g - 75 g mamca po jazbini |
| Kategorija(e) korisnika | osposobljeni profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Veličina pakiranja: 3 kg – 10 kg Mamci (5 g/25 g) pakirani u: - PP ili HDPE ili PET ili PE kante s poklopcem ili posude sa ponovnim zatvaranjem - PP ili HDPE ili PET ili PE spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti (vedro, boca, kartonska kutija) |

4.8.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Pojedene mamce potrebno je zamijeniti tek nakon 3 dana, a nakon toga u razdoblju ne duljem od 7 dana. Skupite prosute mamce i uginule glodavce.

O učestalosti posjeta tretiranom području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti usklađena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljanih vrsta.

Mamce treba postaviti tako da se smanji izloženost neciljanih vrsta i djece.

Pokriti ili na drugi način zatvoriti ulaze u legla s mamcima kako bi se smanjio rizik od odbacivanja ili prosipanja mamca.

Mamac je potrebno zaštititi od atmosferskih uvjeta. Kutije s mamcem potrebno je postaviti na područja koja nisu izložena poplavama.

Mamce u kutijama s mamcem koji su oštećeni vodom ili onečišćeni potrebno je zamijeniti.

Pri kraju razdoblja tretiranja potrebno je ukloniti preostali proizvod.

4.8.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.8.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije tretiranja obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njegovog okruženja) [u skladu s primjenjivim kodeksom dobre prakse, ako postoje].

U obzir je potrebno uzeti preventivne kontrolne mjere (začepiti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.

Kako bi se smanjio rizik sekundarnog otrovanja, potrebno je učestalo potražiti i ukloniti uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama navedenim u mjerodavnom kodeksu dobre prakse.

Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

4.8.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada se kutije s mamcem postavljaju u blizini površinskih voda (na primjer rijeka, jezera, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje, potrebno je izbjeći kontakt vode i mamca.

4.8.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

4.8.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti poglavlje o odobrenoj uporabi.

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.

Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.

Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).

Ako je moguće, kutije s mamcem treba pričvrstiti na tlo ili druge površine.

Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim. Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.

Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.

Profesionalni korisnici i osposobljeni profesionalci:

Prije postavljanja mamaca treba provesti istraživanje zaraženog područja i procjenu mjesta tretiranja kako bi se odredila vrsta glodavaca, njihova mjesta aktivnosti i vjerojatan uzrok i opseg infestacije.

Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.

Korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod”).

Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog trovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.

Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (zaštitne rukavice (HRN EN 374), (preporuka: zaštitni indeks: 6; vrijeme prodora: > 480 min.; materijal: nitrilna guma (0.4 mm), kloroprenska guma (0.5 mm), butilna guma (0.7 mm)).

Ako izgleda da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, razmislite o premještanju kutija s mamcem na dalja mjesta i mogućnost zamjene drugom formulacijom mamca.

Ako izgleda da je količina mamaca nedovoljna za nazočnu populaciju, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.

Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.

U obzir treba uzeti preventivne kontrolne mjere (začepiti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamca i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.

Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku 35 dana.

Profesionalni korisnici i osposobljeni profesionalci:

Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njegovog okruženja) o provođenju deratizacijskih mjera. Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.

Samo profesionalni korisnici:

Sakupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svake kontrole mjesta postavljanja mamaca (barem dva puta tjedno), kako bi se spriječilo sekundarno otrovanje.

U informacijama o proizvodu (tj. Uputi za uporabu i/ili deklaraciji) mora biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod ne smije biti dostupan općoj javnosti (npr. „samo za profesionalne korisnike“);
- proizvod se koristi u odgovarajućim kutijama s mamcem koje su otporne na rukovanje/premještanje (npr. „koristiti samo u kutijama s mamcem koje su otporne rukovanje/premještanje“);
- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod“).

Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.

Samo osposobljeni profesionalci:

Informacije o proizvodu (tj. Uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod namijenjen samo za osposobljene profesionalce koji imaju certifikat o završenoj odgovarajućoj edukaciji (npr. „samo za osposobljene profesionalce“).

Proizvod ne koristiti u području gdje postoji mogućnost otpornosti (rezistencije) na aktivnu tvar.

Za sprječavanje pojave otpornosti, ne izmjenjivati proizvod sa drugim antikoagulantnim rodenticidom slične ili slabije jačine. Za zamjenu proizvoda razmotriti primjenu ne-antikoagulantnih rodenticida ako je moguće ili jačeg antikoagulantnog rodenticida. Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posuđe koje se upotrebljavalo na pokrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i fecesu.

Antidot: Vitamin K1 - primjenjuje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

U slučaju:

Dodira s kožom – oprati kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.

Dodira s očima - isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, držati kapke otvorenima, ispirati najmanje 10 minuta.

Gutanja – oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju. Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinaru.

- Zaštitne kutije moraju biti označene sa sljedećim informacijama: „ne pomicati; ne otvarati“; „sadrži rodenticid“; „Storm Ultra“; „aktivna tvar: flokumafen“ i „u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342“.

- Opasno za divlje životinje.

-Proizvod držati van dosega djece

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce ukloniti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Uginule glodavce treba ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje takve vrste otpada.

Nakon uporabe ambalažu ne upotrebljavati ponovno ni u koje svrhe i ne baciti u okoliš, nego predati na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

Preporučuje se uporaba rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i daleko od izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvajte na mjestima kojima djeca, ptice, kućni ljubimci i domaće životinje nemaju pristup.

Rok trajanja: 2 godine

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

Glodavci mogu prenositi bolesti.

Uginule glodavce ne dirati golim rukamam, koristiti rukavice ili hvataljke kod sakupljanja i zbrinjavanja lešina.

Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.
Proizvod držati van dosega djece