

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Vertox 25 Whole Wheat Bait (purple)

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2018/0219/MRA/IE/BPA 70512

Numărul curent R4BP 3: RO-0020543-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	26
5.1. Instrucțiuni de utilizare	26
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	27
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	27
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	28
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	28
6. Alte informații	28

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Prokum G

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franța
Numărul curent	RO/2018/0219/MRA/IE/BPA 70512	
Numărul curent R4BP 3	RO-0020543-0000	
Data autorizației	27/02/2023	
Data de expirare a autorizației	01/07/2024	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
	Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures, România

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	11 - Brodifacum
Numele producătorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Prazska 54 280 02 Kolin Republica Cehă

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (ready for use): grain

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	<p>Conține 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Poate provoca o reacție alergică.</p> <p>Poate provoca leziuni ale organelor sânge în caz de expunere prelungită sau repetată..</p>
Fraze de precauție	<p>Nu inspirați praful.</p> <p>Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.</p> <p>Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale.</p>

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Șoareci de casă – public general – interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: Șoareci de casă etapă de dezvoltare: Adulți și minori
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare de momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șoarexi până la 20 g în stații de momeală. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Șoareci: 5 - 20 g de momeală pe stație de momeală. Infestații înalte – 1 plic în stații de momeală la fiecare 2 metri Infestații scăzute – 1 plic în stații de momeală la fiecare 5 metri
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Cantitatea maximă de momeală pe pachet 50g Plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în pachete (cuve, găleți sau pungi) PE/PP Ambalaj interior: plicuri dehârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE Ambalaj exterior:pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g Plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj întreior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g Plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50g hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g Momeală liberă până la 20 g ambalat în tăvi de momeală cu capac lipit cu căldură, ambalat în pachete multipli de carton. Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit cu căldură Ambalaj exterior: eterior de carton 10 g, 15 g, 20 g (ambalat în multipli de 1/2/4) Maximul permis 50 g Momeală liberă până la 20 g ambalate în tăvi de momeală cu un capac lipit cu căldură

într-o stație rezistentă la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabil, ambalat în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj de blister sau manșon de carton sau pungă lipită cu căldură sau exterior de poli lipit cu căldură cu un capac de carton.

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu un capac lipit cu căldură

Ambalaj exterior: Stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj de blister sau manșon de carton sau pungă lipită cu căldură sau exterior de poli lipit cu căldură cu un capac de carton.

Maximul permis 50 g

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări.

Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări separate la distanțe de 5 metri (2 metri distanță în zone de infestații înalte) în zone unde șoarecii sunt active. Șoarecele sunt foarte iscoditoare și poate ajuta programul de control de a mișca momeliile la fiecare 2-3 zile odată cu verificarea punctelor de momeală sau reîncărcarea punctelor de momeală. Verificați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și schimbați orice momeală care a fost consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2 - 3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceasta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată sau nu, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficienței suspectate până la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea rozătoarelor mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.

Nu utilizați acest produs pentru momelire permanentă sau în impulsuri.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Șobolani – public general – interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Șobolan maro etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare de momeală Descriere detaliata: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări,
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șobolani până la 60 g în stații de momeală. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală. Infestații înalte – 1 plic (50g) sau 1 - 2 plicuri (plicuri de 25g sau 30g) sau de la 1 până la 3 plicuri (plicuri de 15g sau 20g) în stații de momeală la fiecare 5 metri Infestații scăzute – 1 plic (50g) sau 1 - 2 plicuri (plicuri de 25g sau 30g) sau de la 1 până la 3 plicuri (plicuri de 15g sau 20g) în stații de momeală la fiecare 10 metri
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Cantitatea maximă de momeală pe pachet 150 g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE în PE/PP packs (tubs, pails or pouches) Ambalaje exterioare: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 15 g 20 g, 25 g 30 g 40 g 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g 150 g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g, hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE Ambalaj exterior: carton căptușit PE 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g, 20g, 25g, 30g,

40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g

Momeală liberă până la 60 g ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalat cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: exterior de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (împachetat în multipli de 2/4/8/12/15). Maximul permis 150 g

Momeală liberă până la 60 g împachetat în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau în ambalaj de blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior de poli lipit prin căldură cu capac de carton. Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: Stație de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalat în multipli de 1, 2 sau 4) Maximul permis este de 150 g

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șobolani utilizați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări, separate la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări separate la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înalte)

Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau stricăță până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mișcați sautulburăți punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii.

Dacă nu se observă activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile după începutul tratamentului, mișcați momeala într-o zonă cu activitate mai mare de șobolani. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, măriți cantitatea de momeală prin amplasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momelă consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala când este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei eficienței suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

Nu utilizați acest produs pentru momelire permanentă sau în impulsuri.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Șobolani – public general – în exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> denumirea comună: Șobolan maro etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	în aer liber În exterior în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare de momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șobolani utilizați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări plasate la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală. Infestații înalte – 1 plic (50 g) sau 1 - 2 plicuri (plicuri de 25g sau 30g) sau de la 1 până la 3 plicuri (plicuri de 15g sau 20g) în stații de momeală la fiecare 5 metri Infestații scăzute – 1 plic (50g) sau 1 - 2 plicuri (plicuri de 25g sau 30g) sau 1 - 3 plicuri (plicuri de 15g sau 20g) în stații de momeală la fiecare 10 metri
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Cantitatea maximă de momeală pe pachet 150 g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE în PE/PP packs (tubs, pails or pouches) Ambalaje exterioare: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 15 g 20 g, 25 g 30 g 40 g 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g 150 g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g, hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE Ambalaj exterior: carton căptușit PE 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g.

120g, 150g
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g

Momeală liberă până la 60 g ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalat cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: exterior de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (împachetat în multipli de 2/4/8/12/15). Maximul permis 150 g

Momeală liberă până la 60 g împachetat în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau în ambalaj de blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior de poli lipit prin căldură cu capac de carton. Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: Stație de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalat în multipli de 1, 2 sau 4)
Maximul permis este de 150 g

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șobolani utilizați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare, separate la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare separate la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înalte)
Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mișcați sautulburăți punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii.
Dacă nu se observă activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile după începutul tratamentului, mișcați momeala într-o zonă cu activitate mai mare de șobolani. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, măriți cantitatea de momeală prin amplasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momelă consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala când este necesar.
Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei eficienței suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt

4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

None

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Șoareci de casă – profesioniști – interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: Șoareci de casă etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare de momeală Descriere detaliata: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Șoareci: 5 - 20 g de momeală pe stație de momeală. Infestații înalte – 5 - 20 g momeală în stații de momeală la fiecare 2 metri. Infestații scăzute – 5 - 20 g momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Mărimea minimă de ambalaj este de 2,5 kg. Până la 25 kg saci multistrat de hârtie cu barieră de umiditate din PE sau saci multistrat de hârtie cu sac separat interior din PE sau saci țesute cu sac intern separat din PE sau saci țesute din PP fără căptușeală. Ambalaj interior: - Ambalaj exterior: Saci hârtie, PP, PE, 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 4,5kg, 5kg, 10kg, 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE

sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton cu căptușeală de PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: carton cu căptușeală din PE 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi)

Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă în carton cu căptușeală de PE

Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: carton cu căptușeală de PE 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în exteriori de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton

Multiplii: 10g –250

15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalat în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un exterior de carton sau ambalaj de blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: Stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Multiplii

10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați 5 - 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare.

Fixați 5 - 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde șoarecele sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarea momelei la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar.

Urmăriți orice instrucțiuni adiționale furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată a sistemului de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și, acolo unde este posibil, metodele fizice de control.

Trebuie luat în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de folosit. În acele zone unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandat alternarea momeliilor conținând anticoagulanți diferiți.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când utilizați produsul în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în perioada de tratament și o notificare explicând riscurile primare și secundare al otrăvirii de către anticoagulant și indicând măsurile primare care trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie pus la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectată la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu utilizați momeli conținând ca substanță activă un anticoagulant, ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Șobolani – profesioniști – interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Șobolan maro etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit, pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 10-60 g de momeală în stații de momeală plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală. Infestație înaltă – 10 - 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri. Infestație scăzută – 10 - 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Mărimea minimă de ambalaj este de 2,5 kg. Până la 25 kg saci multistrat de hârtie cu barieră de umiditate din PE sau saci multistrat de hârtie cu sac separat interior din PE sau saci țesute cu sac intern separat din PE sau saci țesute din PP fără căptușeală. Ambalaj interior: - Ambalaj exterior: Saci hârtie, PP, PE, 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg 4,5kg 5kg 10kg 20kg Plicuri de 15,20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, Al/PE sau hârtie/AL/PE Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg. Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: Carton căptușit cu PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE, în exterior de carton fibros/carton. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: - Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.</p> <p>Momeală în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: - Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg. Pachetul este restricționat la saci împachetate separat cu mărime maximă a sacului de 10 kg. Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci)v și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în carton</p>

exterior
tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj interior:

Ambalaj exterior: carton exterior Multiplii
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu un capac lipit prin căldură în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, împachetate în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior de poli cu capac de carton.

Ambalaj interior: Tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multiplii
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde șobolani sunt activi.

Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii.

Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu ceșteți mărimea punctului de momeală. Schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar. Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem integrat de gestionare al dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice de control.

Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandată alternarea momelilor cu anticoagulanți diferiți.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este folosit în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notificare explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant precum și indicând măsurile

prime care trebuie luate în cazul otrăvirii trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.
Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiențe suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu utilizați momeli care conțin ca substanță activă anticoagulant ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității de rozătoare.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Șoarece de casă și/sau șobolani – profesioniști – exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rozătoare.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Mus musculus and/or Rattus norvegicus
denumirea comună: Șoarece de casă și/sau șobolan maro
etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

În aer liber

În exterior în jurul clădirilor.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliată:

Momeală gata de folosit în stații de momeală rezistente la manipulare.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări. Pentru șobolani utilizați 10 -60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri.

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

Șoareci: 5 - 20 g de momeală pe stație de momeală.

Infestații înalte – 5 - 20 g de momeală în stații de momeală la fiecare 2 metri

Infestații scăzute – 5 - 20 g de momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri

Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală.

Infestații înalte – 10 - 60 g de momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri

Infestații scăzute – 10 - 60 g de momeală în stații de momeală la fiecare 10 metri

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat Cu barieră de umiditate din PE sau de hârtie multistrat cu sac intern de PE separat sau saci țesute PP cu sac intern din PE separat, sau saci țesute din PP fără căptușeală

Ambalaj intern: -

Ambalaj extern: Saci hârtie, PP, PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior:plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg,15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton cu căptușela din PE. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE.

Ambalaj exterior: Carton cu căptușeală PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg,15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton

Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE,

Al/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi)

Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior:Pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg,15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Momeală liberă în carton cu săptușeală de PE Ambalaj interior:-

Ambalaj exterior: carton cu căptușeală de PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg,15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg

Ambalajul este restricționat la saci împachetate separat cu o mărime maximă a sacului

de 10 kg.

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în exterior de carton

Ambalaj interior:

tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton

Multiplii

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau de mai multe utilizări, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipite prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton

sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multiplii:

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare.

Fixați 5-20 g de momeală în stații rezistente la manipulări distanțate la 5 metri (2 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control de a mișca momelile la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Verificați frecvent punctele de momeală în primele 10 - 14 zile și schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Pentru șobolani utilizați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări distanțate la 10 metri.

Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele de infestații înalte) acolo unde șobolanii sunt activi.

Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau stricăță până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații acolo unde este evidența unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mișcați sau nu deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea momelii.

Dacă nu este văzut niciun semn de activitate în jurul momelii după 7-10 zile, mișcați momeala într-o zonă cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasați stațiile de momeală în zone care nu sunt predispușe inundațiilor.

Înlocuiți orice momeală în stațiile de momeală care au fost deteriorate de apă sau contaminate de pământ.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică.

Executați un sondaj înaintea aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat, să alternați momelile care conțin substanțe active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).
Nu aplicați direct acest produs în vizuini.

Nu folosiți momeli care conțin ca substanțe active anticoagulanti ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, să vă asigurați că contactul momelii cu apa este evitată.

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt,

4.7 Modul de utilizare

Utilizarea 7 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: Mus musculus and/or Rattus norvegicus
denumirea comună: Șoarece de casă și/sau șobolan maro
etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliată:

Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în stații de momeală rezistente la manipulări.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări sau în puncte de momeală acoperite Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite la deistanțe de 10 metri.

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

Șoareci: 5 - 20 g de momeală pe stație de momeală.

Infestații înalte – 5 - 20 g momeală în stații de momeală la distanțe de 2 metri.

Infestații scăzute – 5 - 20 g momeală în stații de momeală la distanțe de 5 metri.

Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală.

Infestații înalte – 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală la fiecare 5 metri

Infestații scăzute – 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală la fiecare 10 metri

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat Cu barieră de umiditate din PE sau de hârtie multistrat cu sac intern de PE separat sau saci țesute PP cu sac intern din PE separat, sau saci țesute din PP fără căptușeală

Ambalaj intern: -

Ambalaj extern: Saci hârtie, PP, PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior:plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg,15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în carton cu căptușela din PE. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau

hârtie/Al/PE.

Ambalaj exterior: Carton cu căptușeală PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g de hârtie/PE sau Al/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton

Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE,

Al/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi)

Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: Pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Momeală liberă în carton cu săptușeală de PE Ambalaj interior:-

Ambalaj exterior: carton cu căptușeală de PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Ambalajul este restricționat la saci împachetate separat cu o mărime maximă a sacului de 10 kg.

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în exterior de carton

Ambalaj interior:

tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton

Multiplii

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulare din HDPE sau PP de unică folosință sau de mai multe utilizări, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipite prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multiplii:

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.
Atunci când este disponibil, urmăriți orice instrucțiuni adiționale furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.
Executați un sondaj înainte de aplicarea produsului asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.
Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.
Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.
Dacă este folosit pentru momelire în impulsuri:
- Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și după aceea la intervale de maxim 7 zile. Colectați orice momeală vărsată sau rozătoare moarte.

4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control.
Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.
Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activităților rodenticide.
Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, să vă asigurați că momeala nu intră în contact cu apa.

4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.7.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.8 Modul de utilizare

Utilizarea 8 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – în exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: Mus musculus and/or Rattus norvegicus
denumirea comună: Șoareci de casă și/sau șobolani
etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

în aer liber
În exterior în jurul clădirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliată:
Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în stații de momeală rezistente la manipulări.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări sau în puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite la distanțe de 10 metri.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

Șoareci: 5 - 20 g de momeală pe stație de momeală.

Infestații înalte – 5 - 20 g de momeală în stații de momeală la fiecare 2 metri
Infestații scăzute – 5 - 20 g de momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri

Șobolani: 10 - 60 g de momeală pe stație de momeală.

Infestații înalte – 10 - 60 g de momeală în stații de momeală la fiecare 5 metri

Infestații scăzute – 10 - 60 g de momeală în stații de momeală la fiecare 10 metri

Momeală în vizuini - 10 - 60 g de momeală pe vizuini

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.
Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat Cu barieră de umiditate din PE sau de hârtie multistrat cu sac intern de PE separat sau saci țesute PP cu sac intern din PE separat, sau saci țesute din PP fără căptușeală
Ambalaj intern: -
Ambalaj extern: Saci hârtie, PP, PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton cu căptușeală din PE. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE.
Ambalaj exterior: Carton cu căptușeală PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg
Plicuri de 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g sau 60 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton

Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, Al/PE sau hârtie/AL/PE
Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5 kg, 3 kg, 3, 5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi)
Ambalaj interior: -
Ambalaj exterior: Pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Momeală liberă în carton cu săptușeală de PE
Ambalaj interior: -
Ambalaj exterior: carton cu căptușeală de PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
Ambalajul este restricționat la saci împachetate separat cu o mărime maximă a sacului de 10 kg.

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în exterior de carton
Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: exterior de carton

Multiplii
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau de mai multe utilizări, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipite prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multiplii:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Protejați momeala de la condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zonele care nu sunt predispuse inundațiilor.
Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.
Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament (Nu se aplică acolo, unde este autorizată în mod explicit conform anexei 4).

Atunci când sunt disponibile, urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă. Dacă este utilizat pentru momelire în impulsuri: - Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maxim 7 zile. Colectați orice momeală vărsată și rozătoarele moarte. Atunci când este disponibil, urmăriți instrucțiunile specifice furnizate de codul de bună practică aplicabilă la nivel național.

Pentru utilizare în aer liber, punctele de momeală trebuie acoperite și plasate în locuri strategice pentru a minimaliza expunerea la speciile nețintă. Atunci, când este disponibil, urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă. Atunci când este folosit în vizuini: Momeala trebuie plasată așa încât să minimalizeze expunerea la speciile nețintă și copiii. Acoperiți sau blocați intrarea vizuinilor momelile pentru a reduce riscul ca momeala să fie respinsă sau vărsată.

Executați un sondaj înaintea aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

4.8.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control. Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă. Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activităților rodenticide. Când este utilizat în vizuini: Momeala trebuie plasată în așa fel, încât să minimalizeze expunerea la speciile nețintă și copiii. Acoperiți sau blocați intrările vizuinilor momelile pentru a reduce riscul ca momeala să fie respinsă sau vărsată.

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelii cu apa este evitată.

4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.9 Modul de utilizare

Utilizarea 9 - Șobolani – profesioniști instruiți – sistemul de canalizare

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: Rattus norvegicus
denumirea comună: Șobolan maro
etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

Other

Sistemul de canalizare.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliată:

Momeală gata de folosit pentru a fi ancorat sau aplicat direct în stații de momeală care previn momeala să intre în contact cu apa de canalizare.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: În sistemul de canalizare, plasați blocuri de 200 g - 300 g la fiecare 30 -50 metri (niciodată mai mult decât 300 g la fiecare gaură de canalizare)..
Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

În sistemul de canalizare, plasați 200 - 300 g de momeală la fiecare 30 - 50 metri (niciodată mai mult decât 300 g la fiecare gaură de canalizare).
Fixați stațiile de momeală sau plicurile la structurile disponibile pentru a asigura că momeala nu este luată de apă. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărimea minimă de ambalaj este de 2,5 kg.

Până la 25 kg saci multistrat de hârtie cu barieră de umiditate din PE sau saci multistrat de hârtie cu sac separat interior din PE sau saci țesute cu sac intern separat din PE sau saci țesute din PP fără căptușeală.

Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: Saci hârtie, PP, PE, 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg 4,5kg 5kg 10kg 20kg

Plicuri de 15,20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: pachete de

PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau

hârtie/AL/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: Carton

căptușit cu PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau

hârtie/AL/PE, în exterior de carton fibros/carton. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Momeală în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg. Pachetul este restricționat la saci împachetate separat cu mărime maximă a sacului de 10 kg.

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în carton exterior
Ambalaj interior: tăvi de

momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: carton exterior Multiplii

10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu un capac lipit prin căldură în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, împachetate în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior de poli cu capac de carton.

Ambalaj interior: Tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multiplii
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.9.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

În sistemul de canalizare plasați 200 - 300 g de momeală la fiecare 30 - 50 metri (niciodată mai mult decât 300 g în fiecare gaură de canalizare).

Fixați stația de momeală la structurile disponibile pentru a asigura că nu sunt luate de apă. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații acolo unde există dovada unei noi infestații.

Momeala trebuie aplicată în așa fel încât să nu intre în contact cu apași să nu fie luată de apa.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un sondaj înainte de aplicarea momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada

rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat alternarea momelilor cu substanțe active anticoagulante diferite.

4.9.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă politica națională sau legislația o cer, plasați momeala doar în sistemele de canalizare care nu sunt conectate la o stație de epurarea a apelor uzate.

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestației de rozătoare sau monitorizarea activităților de rozătoare. Nu utilizați acest produs în tratamente cu momeală în impulsuri.

4.9.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că momeala nu intră în contact cu apa.

4.9.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.9.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

None

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți și urmăriți informația de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau care este furnizat la punctul de vânzare, înainte de utilizare.

Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu dopați găurile, îndepărtați mâncarea și băutura potențială cât se poate) pentru a îmbunătăți consumul de produs și de a reduce probabilitatea reinveziei.

Înainte folosirii prodeuselor rodenticide, trebuie luate în considerare metodele de control nechimice (de exemplu capcane).

Îndepărtați mâncarea gata disponibil pentru rozătoare (de exemplu grâu vărsat sau deșeuri alimentare). În afara de acesta să nu curățați zona infestată doar înaintea tratamentului, pentru că acesta doar o să-l deranjeze populația de rozătoare și momeala va fi mai greu acceptată.

Nu deschideți plicurile care conțin momeala (Profioniști antrenati - Doar pentru plicuri negolibili).

Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată acolo unde activitatea de rozătoare a fost observată.

Acolo, unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la pământ sau de alte structuri.

Nu plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare unde pot intra în contact cu apa.

Plasați stațiile de momeală departe de mâncare, băutură și furaje animale, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.

Plasați stațiile de momeală la lacouri inaccesibile pentru copii, păsări, animale domestice și alte animale neîntâ.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării a produsului. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea acestui produs.

Profioniști și profesioniști instruiți: Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul de momeală nu se oprește, și nu se observă un declin în activitatea de rozătoare, atunci trebuie determinate cauzele probabile. Acolo unde alte elemente au fost excluse, este posibil ca există rozătoare rezistente, deci luați în considerare utilizarea unui rodenticid ne coagulant, acolo unde este disponibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură de control alternativă.

Profioniști și profesioniști instruiți: -Grâu liber: Plasați momeala în stația de momeală prin utilizarea unui dispozitiv de dozare.

Specificați metodele pentru a minimaliza praful (de exemplu ștergere umedă).

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Să nu folosiți produse care conțin brodifacoum ca momeală permanentă (de exemplu pentru prevenirea infestației de rozătoare sau pentru a detecta activitate de rozătoare).

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [Metoda de eliminare trebuie descrisă specificat în SPC-ul național și să fie reflectată pe eticheta produsului].

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin atât de frecvent, cât de frecvent stațiile de momeală sunt inspectate.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectate până la sfârșitul perioadei de tratament (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar, că produsul nu trebuie vândut publicului general (de exemplu "doar pentru profesioniști").

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști instruiți:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar că produsul trebuie vândut doar profesioniștilor instruiți care dețin certificat doveditor de conformitate cu cerințele de instruire aplicabile (de exemplu „doar pentru profesioniști instruiți”).

Profioniști: Să nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.

Profioniști instruiți:
Să nu spălați stațiile de momeală sau ustensilele utilizate în punctele de momeală acoperite și protejate cu apă între aplicații.

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor. În cazuri severe, pot apărea vânătăi sau sânge în excremente sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de expunere: Expunere dermală, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

Expunerea ochilor, clătiți ochii cu lichid de clătire a ochilor sau apă, păstrați pleoapele deschise pentru cel puțin 10 minute.

Expunere orală, clătiți gura cu grijă cu apă. Nu dați niciodată nimic prin gură unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. Dacă este înghițit, cereți ajutor medical și arătați-le containerul și eticheta produsului.

Dacă este înghițit de un animal de companie contactați un medic veterinar.

Stațiile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mișcați sau deschideți"; "conține un rodenticid"; "numele produsului sau numărul de autorizație"; "substanțe active" și "în caz de accident, sunați numărul Centrului Național de Informare Toxicologică (01) 809 2166".

Periculos animalelor sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Purtarea mănușilor este recomandat.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Valabilitate: 24 luni

Păstrați într-un loc uscat, răcoros și bine ventila. Țineți ambalajul închis și departe de lumina directă a soarelui.

Păstrați în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, și animale de fermă.

Păstrați doar în containerul original.

6. Alte informații

Din cauza modului de acțiune întârziat, rodenticidelor anticoagulant poate lua 4 - 10 zile de a deveni eficienți după consumarea momelei.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și unelte ca clește când îndepărtați pe ele.

Acest produs conține o substanță amară și un colorant. This product contains a bittering agent and a dye.