

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2019/0233/MRA/IE/BPA 70515**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 4.03.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piata în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesiva eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : SLOVENIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : IE/BPA 70515

II. Data emiterii autorizatiei: 03.04.2019, rescris in data de 23.05.2019**III. Data expirării autorizatiei : 09.04.2023****IV.**

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID : Ratimor Plus Brodifacoum Wax Blocks

Alte denumiri comerciale: Ratimor Brodifacoum blocuri de parafina; Glodacid plus blocuri de parafina; Brodifacoum blocuri de parafina

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI : Unichem d.o.o

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: **Unichem d.o.o**

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Unichem d.o.o

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

Loc de productie: Singa Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PelGar International Limited

Nr.13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2QR, UK

Loc de productie : Nr.13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2QR, UK

VI.

TIPUL DE PRODUS : TP 14-Rodenticide

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

COPIE**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI :** Publicul general/larg (non-profesionisti), profesioniști (specialiști), profesioniști calificați/instruiți (experti)**VIII.****TIPUL PREPARATULUI:** Momeala rodenticida sub forma de bloc cerat cu 0,0029% brodifacoum ca substantă activă, pentru combaterea soareciilor de casa (*Mus musculus*) și a sobolanilor (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu și *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis) – juvenili și adulți, cu utilizare de către neprofesionisti (publicul larg), profesioniști și profesioniști instruiți.**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanța activă**

Denumirea comună	Brodifacum
Denumirea IUPAC	[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substanță activă	0,0029%

2) Substanța inactivă/nonactivă - nu se specifică**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Simboluri	GHS08
Fraze de pericol (H)	H373- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudenta (P)	P260- Nu inspirați praful. P314- Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501- Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/ regionale/naționale.
Pictograma(e)	

XI. AMBALAREA

Publicul larg (interior) pentru soareci de casă, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă):

-în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22

- în pachete din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g
 - în containere din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g
 - în găleți din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g
 - în cutii de carton sau cutii fibrolemnnoase (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g
 - în cutii de carton sau cutii fibrolemnnoase cu sac sau căptușeală din PE (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100 g
 - Stații de toxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru şobolan, care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece). Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100 g
 - Stații de toxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece). Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100 g
 - Stație de toxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece). Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g
- Publicul larg (interior) pentru sobolanul brun și negru, animale tinere și adulte
- Formule de momeală:
- Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
- Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:
- Blocuri vrac de 5 g - 60 g (cu sau fără cărlig/sârmă):
- în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemn (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - în pachete din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - în containere din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - în găleți din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - în cutii de carton sau cutii fibrolemnnoase (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - în cutii de carton sau cutii fibrolemnnoase cu sac sau căptușeală din PE (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - Stații de toxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru şobolan, care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de toxicare şobolan). Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - Stații de toxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru şobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de toxicare şobolan). Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
- Stație de toxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru şobolan, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de toxicare



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(+40 21) 311 86 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

Publicul larg (exterior, în jurul cladirilor) pentru sobolanul brun și negru, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Bocuri vrac de 5 g - 60 g (cu sau fără cârlig/sârmă):

-în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-în pachete din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-în containere din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-în găleți din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-în cutii de carton sau cutii fibrolemninoase (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-în cutii de carton sau cutii fibrolemninoase cu sac sau căptușeală din PE (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan, care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

Profesioniști/specialiști (interior) pentru soareci de casa, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minima a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maxima a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

- Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg
- Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg
- Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece)
- Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg
- Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece)
- Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti/specialisti (interior) pentru sobolanul brun și negru, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în șase din HDPE sau PP până la 20 kg

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg

- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

- Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

- Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

- Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

- Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti/specialisti (exterior, în jurul cladirilor) pentru șoarece de casă, sobolanul brun și negru, animale tinere și adulte



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22

Formule de momeală:

-Momeala gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușelă din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti instruiți/experti (interior) pentru șoarece de casă, șobolanul brun și negru, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeala gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

sau căptușeală din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de toxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de toxicare șobolan)

-Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de toxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de toxicare șobolan)

-Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti instruiți/experti (exterior, în jurul clădirilor) pentru soarece de casa, sobolanul brun și negru, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării

-Aplicare directă în vizuină a momelii gata de utilizare

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de toxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de toxicare șobolan)

-Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de toxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de toxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de toxicare șobolan)

-Stații de toxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti instruiți/experti (în canalizare) pentru sobolanul brun, animale tinere și adulte



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 10 g-200 g (până la 200 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 10 g-200 g (până la 200 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

XII. POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE

Asupra sănătății umane: Inhalare: Inhalarea de praf poate provoca iritații ale tractului respirator, tuse, strănut, secreție nazală, respirație greoaie.

În contact cu pielea: Praful poate provoca iritații ale pielii, în pliurile pielii sau sub îmbrăcăminte strâmtă. Periculos pentru sănătate.

În contact cu ochii: Praful poate produce iritarea ochilor. În contactul cu ochii poate provoca iritații.

Ingerare: Produsul conține un anticoagulant care poate produce hemoragie. Simptomele pot apărea la câteva zile de la expunere. Afecțiunile de coagulare și tendința de sângerare sporită apar în caz de otrăvire. În caz de otrăvire gravă, sângerarea internă puternică poate produce colapsul circulator și astfel decesul.

Asupra sănătății animalelor nevizate: Identificarea pericolelor

Vertebrale care nu sunt specii sănătoase pot fi expuse la substanța activă, fie direct prin ingestie de momeală rodenticidă sau a resturilor de momeală (intoxicare primară), fie indirect, prin înghijirea carcaselor de rozătoare specie sănătoase care conțin reziduuri ale substanței active (intoxicare secundară). Produsul conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care pot fi întăriți, pot include hemoragii nazale și gingivale. În cazurile severe, pot să apară vânătăi și sânge în fecale sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată exclusiv de personal medical veterinar. În cazul ingestiei la



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

animale, contactați medicul veterinar.

Informatii obligatorii pentru etichetarea capcanelor: „nu mutați sau deschideți”; „conține rodenticid”, „denumirea produsului sau numărul autorizației”; „substanța(ele) activă(e)” și „în cazul vreunui incident, contactați autoritatea națională de sănătate publică.

Asupra mediului: Sol: Trebuie evitata cat mai mult expunerea solului la produsul formulat precum si evitarea patrunderii in sol, tinand cont de proprietatile PBT ale brodifacoumului. Pe baza informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor.

Apa : Substanta activa indeplineste criteriile de PBT ; este persistenta in apa, cu tendinte de bioaccumulare in organisme si foarte toxica .

Aer: Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulari de substanta activa in aer in timpul utilizarii.

Organismele acvatice : Produsul prezinta un risc acceptabil pentru organismele acvatice .

Alte organisme netintă : Produsul nu prezinta risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru. Fara efecte semnificative asupra proceselor de respiratie/nitrificare din sol.

XIII. ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia/Tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
(1) Evaluarea eficacitatii biocide	Test in teren (ferma) – durata de hranire: 15 zile	<i>Rattus rattus</i> (sobolanul negru de acoperis) – populatie estimata: 30-35 indivizi	Consum total pre-test = 2221 g; consum total post-test=0 g. Consum zilnic de momeala = 569 g. Consum total momeala = 3094 g.	Mortalitate 100% dupa 13 zile.
(2) Evaluarea eficacitatii biocide	Test in teren (ferma) – durata de hranire: 17 zile	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul cenusiu) – populatie estimata: 25- 30 indivizi	Consum total pre-test = 2525 g; consum total post-test=0 g. Consum zilnic de momeala = 578 g. Consum total momeala = 4040 g.	Mortalitate 100% dupa 14 zile.
(3) Evaluarea eficacitatii biocide	Test in teren (ferma) – durata de hranire: 14 zile	<i>Mus musculus</i> (soarecele de casa) – populatie estimata: 40-50 indivizi	Consum total pre-test = 774 g; Consum total post-test = 0 g. Consum zilnic de momeala = 175 g. Consum total momeala = 1040 g.	Mortalitate 100% dupa 11 zile.



MINISTERUL SANATATII - COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH - NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

COPITE

XIV. INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

Manipulare:

Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (EN 374, categoria III).

Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă. Evitați contactul cu pielea atunci când aruncați resturile de momeală.

Utilizatori non-profesionisti (publicul larg): - in interior

Soareci

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrele rozatoarelor. Realignați capcanele cu momeala, daca este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Nu miscati sau mutati capcanele cateva zile dupa ce ati amplasat momeala. Daca nu exista dovezi de activitate a sobolanilor dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai intensa.

Capcanele trebuie verificate doar la 5-7 zile de la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realignați capcanele cu momeala, daca este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa eliminate rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Utilizatori non-profesionisti (publicul larg) / exterior in jurul cladirilor

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.
Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Amplasati capcanele in zone neinundabile.

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Nu miscati sau mutati capcanele cateva zile dupa ce ati amplasat momeala. Daca nu exista dovezi de activitate a sobolanilor dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai intensa.

Inlocuiti momeala din capcane atunci cand aceasta a fost afectata de apa ori murdarie.

Capcanele trebuie verificate doar la 5 - 7 zile de la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa eliminate rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori profesionisti: - in interior

Soareci

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.
Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii. Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igienă ai, daca este posibil, metode fizice de control.

La selectarea rodenticidului de utilizat trebuie sa se tina seama de rezistenta populatiei vizate. In zonele susceptibile de dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. [Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului ai se aplica, langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicație.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Nu miscati sau mutati capcanele cateva zile dupa ce ati amplasat momeala. Daca nu exista dovezi de activitate a sobolanilor dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai intensa.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar. Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii. Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena si, daca este posibil, metode fizice de control.

La selectarea rodenticidului de utilizat trebuie sa se tina seama de rezistenta populatiei vizate. In zonele susceptibile de dovezi de rezistenta la ingrediente active specific, evitati utilizarea acestora. [Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului ai se aplica, langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxikatie.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori profesionisti: exterior, in jurul cladirilor

Soared de casa si/sau sobolani

Pentru soareci:

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Pentru sobolani:

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel.: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

m.

Protejati momeala impotriva intemperiilor (ploaie, ninsoare, etc.). Amplasati capcanele in zone neinundabile.

Inlocuiti toata momeala afectata de apa sau murdarie din capcane.

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei, pentru soareci, doar la 5-7 zile de la inceputul ei, pentru sobolani, si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii. Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

La selectarea rodenticidului de utilizat trebuie sa se tina seama de rezistenta populatiei vizate. In zonele susceptibile de dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. [Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului ai se aplica, langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxikatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxikatie.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa eliminate rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori profesionisti instruiti: - in interior

Soareci de casa si/sau sobolani

Maxim 20 g (soareci) sau 60 g (sobelani) de momeala in capcane nedemontabile sau capcane acoperite amplasate din 10 in 10 m (5 m in zonele cu infestare mare).

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii. Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

Nu utilizati prin rotatie anticoagulante diferite de putere similara sau mai slaba pentru gestionarea rezistentei la rodenticide. In cazul utilizarii de rodenticide prin rotatie, se recomanda utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, daca exista, sau a unui anticoagulant mai puternic.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Nu utilizati in zone in care exista suspiciuni de rezistenta la substanta activa.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului, si se aplica langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Eliminati resturile de produs la sfarsitul perioadei de aplicare.

Nu folositi produsul ca momeala permanenta.

Daca folositi produsul in doza de soc: - Inlocuiti momeala consumata doar dupa 3 zile de la aplicare si apoi la intervale de maximum 7 zile. Adunati toata momeala varsata si cadavrele de rozatoare.

[Daca exista] Urmati instructiunile specifice impuse de codul de bune practici national aplicabil.

Utilizatori profesionisti instruiți: - exterior in jurul cladirilor

Soareci de casa si/sau sobolani

Maxim 20 g (soareci) sau 60 g (sobelani) de momeala in capcane nedemontabile sau capcane acoperite amplasate din 10 in 10 m (5 m in zonele cu infestare mare) sau direct in vizuina.

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate doar la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si observare pe teren pentru a identifica specile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii. Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

Nu utilizati prin rotatie anticoagulante diferite de putere similara sau mai slaba pentru gestionarea rezistentei la rodenticide. In cazul utilizarii de rodenticide prin rotatie, se recomanda utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, daca exista, sau a unui anticoagulant mai puternic.

Nu utilizati in zone in care exista suspiciuni de rezistenta la substanta activa.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului, si se aplica langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Protejati momeala impotriva intemperii (ploaie, ninsoare, etc.). Amplasati capcanele in zone neinundabile.

Eliminati resturile de produs la sfarsitul perioadei de aplicare.

Inlocuiti toata momeala afectata de apa sau murdarie din capcane.

La utilizarea in vizuini: Amplasati momelile in asa fel incat sa minimizati expunerea speciilor nevizitate si a copiilor. Acoperiti sau blocati intrarile vizuinilor momite pentru a reduce riscul de respingere sau varsare a momelii.

Daca folositi produsul in doza de soc: - Inlocuiti momeala consumata doar dupa 3 zile de la aplicare si apoi la intervale de maximum 7 zile. Adunati toata momeala varsata si cadavrele de rozatoare.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

[Daca exista] Urmati instructiunile specifice impuse de codul de bune practici national aplicabil.
Utilizatori profesionisti instruiți: canalizare

Sobolani

Infestare mare: 60 g momeala / gura de canalizare

Infestare mica: maxim 60 g momeala / gura de canalizare,
in capcane nedemontabile sau capcane acoperite amplasate din 10 in 10 m (5 m in zonele cu
infestare mare).

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se
mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale
noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de
rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.
Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care
include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

Nu utilizati prin rotatie anticoagulante diferite de putere similara sau mai slaba pentru gestionarea
rezistentei la rodenticide. In cazul utilizarii de rodenticide prin rotatie, se recomanda utilizarea unui
rodenticid non-anticoagulant, daca exista, sau a unui anticoagulant mai puternic.

Nu utilizati in zone in care exista suspiciuni de rezistenta la substanta activa.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone
deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului, si se aplica
langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicationa primara sau secundara si primele
masuri de luat in caz de intoxicare.

Aplicati momelile in asa fel incat sa evitati contactul cu apa si eliminarea lor prin diluare.

Daca folositi produsul in doza de soc: - Inlocuiti momeala consumata doar dupa 3 zile de la aplicare
si apoi la intervale de maximum 7 zile.

XV. INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR

Informatii/masuri generale: Persoana in cauză trebuie scoasă din zona contaminată la aer curat sau
într-o zonă bine ventilată, asigurându-i funcțiile vitale și protejându-l de căldură sau frig. Nu dați
victimei inconștiente nimic să mănânce sau să bea. Întindeți victimă în poziție de repaus și
asigurați-vă că are căile respiratorii funcționale.

La înhalare (excesivă): Scoateți victimă la aer curat – părăsiți zona contaminată. În cazul pierderii
cunoștinței, asigurați victimei o poziție laterală stabilă și solicitați ajutorul medicului.

În contactul cu pielea: Indepărtați toate hainele contaminate. Spălați imediat cu multă apă și săpun
părțile corpului care au venit în contact cu produsul. În cazul în care simptomele nu dispar, adresați-
vă medicului.

În contact cu ochii: Clătiți imediat cu apă abundantă, ochii deschiși și interiorul pleoapelor (la
intervale de 15 minute). În cazul reapariției simptoamelor persistente, solicitați ajutorul medicului.

În cazul contaminării ochilor, clătiți imediat cu apă abundantă.

În caz de ingestie: Nu vă provocați vărsături! Clătiți bine gura cu apă. Clătiți gura și bei apă (1-2
pahare). Arătați-i medicului fișa de siguranță sau eticheta.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Mentionarea asistentei medicale imediate și a tratamentelor speciale

În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat medicul (arătați eticheta acolo unde este posibil). SFAT PENTRU DOCTORI: Brodifacoum este un anti-coagulant indirect. Fitomenadiona, vitamina K1, este un antidot. Determinați timpul de protrombină nu mai devreme de 18 ore după consum. Dacă este crescut, administrați vitamina K1 până când timpul de protrombină se normalizează. Continuați determinarea timpului de protrombină mai multe săptămâni după retragerea antidotului și reluați tratamentul dacă apare o creștere în acest timp.

XVI. MĂSURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Restrictii pentru utilizarea produsului biocid

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Măsuri în caz de dispersie accidentală.

În cazul deversarilor în apa, nu lasați să patrunda în apele de suprafață.

Metode de decontaminare

Statiile și punctele de momeala sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul soarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul sobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți manusi de protecție.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curătarea zonei.

În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curătate înainte de eliminare.

XVII. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Momeala trebuie asigurată în aşa fel încât să nu poată fi scoasă din capcană.

Nu amplasați momeli lângă sisteme de evacuare a apei unde pot intra în contact cu apa.

Amplasați capcanele departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de uștenile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.

Amplasați capcanele la adăpost de copii, păsări, animale de companie, animale domestice și alte animale nevizate.

Eliminați restul de momeală sau capcanele la sfârșitul perioadei de aplicare.

Evacuați cadavrele de rozătoare în conformitate cu reglementările locale

Căutați și evacuați cadavrele de rozătoare pe durata aplicării produselor, cel puțin cu regularitatea verificării capcanelor.

Contactați un medic veterinar dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

Periculos pentru animalele sălbaticice.

Pentru utilizarea la exterior, capcanele trebuie acoperite și amplasate în locuri strategice astfel încât să reducă la minimum expunerea speciilor nevizate. Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

XVIII. INSTRUCTIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Eliminarea deseurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durată maximă de 35 zile).

Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deseuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

XIX. CONDIITILE DE DEPOZITARE : Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis etans și ferit de lumină directă a soarelui.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 3 ani

XX. ALTE INFORMATII : Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomanda citirea cu maxima atenție a instrucțiunilor de pe eticheta și respectarea lor.

Respectarea restricțiilor pentru utilizarea produsului biocid și anume:

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Prezenta autorizare este însotită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizării a fiselor cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însotit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca