

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: 5-b

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 04 - Produse alimentare și hrană pentru animale

Numărul curent:

Numărul curent R4BP 3: EU-0024303-0005

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	6
2. Compoziția și formularea produsului	10
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	10
2.2. Tipul preparatului	11
3. Fraze de pericol și de precauție	11
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	11
5. Direcții generale de utilizare	33
5.1. Instrucțiuni de utilizare	33
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	33
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	34
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	34
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	34
6. Alte informații	34

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Incidin OxyFoam

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
Numărul curent	1-5	
Numărul curent R4BP 3	EU-0024303-0005	
Data autorizației	15/09/2022	
Data de expirare a autorizației	31/08/2032	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului

Ecolab Europe GmbH

Adresa producătorului

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Elveția

Adresa locurilor de producție

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Germania

ACIDEKA S.A. Edificio FERIA. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spania

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spania

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Regatul Unit

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Germania

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danemarca

Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenia

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscova Federația rusă

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Regatul Unit

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franța

Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italia

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franța

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austria

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germania

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Germania

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germania

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danemarca

Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danemarca

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franța

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonia

Numele producatorului	Ecolab Europe GmbH
Adresa producătorului	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Elveția
Adresa locurilor de producție	Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22, Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spania
	BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Elveția
	Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Germania
	Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Germania
	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Comitatul Cork Irlanda
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germania
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spania
	COMERCIAL GODO Franța, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spania
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franța
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael
	Dentack BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Țările de Jos
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (INSULELE BALEARE) Spania
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germania
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spania
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franța
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italia
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Regatul Unit
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Regatul Unit
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENA Grecia
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenia

Numele producatorului

Ecolab Europe GmbH

Adresa producătorului

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Elveția

Adresa locurilor de producție

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Țările de Jos

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Țările de Jos

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italia

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italia

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlanda

ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgia

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Regatul Unit

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Regatul Unit

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franța

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Germania

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franța

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Regatul Unit

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spania

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Țările de Jos

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Federația rusă

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Germania

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federația rusă

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugalia

Numele producatorului

Ecolab Europe GmbH

Adresa producătorului

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Elveția

Adresa locurilor de producție

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Germania

Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Țările de Jos

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spania

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franța

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franța

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Germania

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Germania

McBride SA Polígón Industrial L'illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spania

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Țările de Jos

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danemarca

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Regatul Unit

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Germania

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danemarca

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Ctra. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spania

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Regatul Unit

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spania

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugalia

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franța

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Regatul Unit

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Spania

Numele producatorului	Ecolab Europe GmbH
Adresa producătorului	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Elveția
Adresa locurilor de producție	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Germania
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germania
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Țările de Jos
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Regatul Unit
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italia
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Țările de Jos
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franța
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franța
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Germania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producatorului	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa producătorului	Tijsmanstunnel West 2040 Anvers Belgia
Adresa locurilor de producție	Tijsmanstunnel West 2040 Anvers Belgia

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Evonik Degussa GmbH
Adresa producătorului	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania
Adresa locurilor de producție	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Evonik Peroxid GmbH
Adresa producătorului	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Adresa locurilor de producție	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa producătorului	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Țările de Jos

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa producătorului	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia
Adresa locurilor de producție	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Solvay Chemie SA
Adresa producătorului	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa producătorului	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia
Adresa locurilor de producție	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Solvay Chemicals GmbH
Adresa producătorului	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania
Adresa locurilor de producție	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Solvay Interlox Limited
Adresa producătorului	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regatul Unit

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa producătorului	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlanda
Adresa locurilor de producție	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlanda

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
Adresa producătorului	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugalia
Adresa locurilor de producție	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugalia

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Kemira Rotterdam BV
Adresa producătorului	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Țările de Jos

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Kemira Chemical Oy
Adresa producătorului	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlanda
Adresa locurilor de producție	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlanda

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Kemira Kemi AB
Adresa producătorului	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suedia
Adresa locurilor de producție	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suedia

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa producătorului	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franța
Adresa locurilor de producție	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franța

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa producătorului	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania
Adresa locurilor de producție	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania

Substanța activă	1315 - Peroxid de hidrogen
Numele producătorului	Ecolab Europe GmbH
Adresa producătorului	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
Adresa locurilor de producție	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Peroxid de hidrogen		Substanța activă	7722-84-1	231-765-0	1,5
N-propanol	Propan-1-ol	Substanța inactivă	71-23-8	200-746-9	0
Acid citric monohidrat	2-hidroxiopropan -1,2,3-acid tricarboxilic	Substanța inactivă	5949-29-1	201-069-1	0
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Substanța inactivă	122-99-6	204-589-7	0
Lauril sulfat de sodiu	Dodecil sulfat de sodiu	Substanța inactivă	151-21-3	205-788-1	0
Acid L-glutamic, derivați N-cocoacilici, săruri monosodice	Sodiu;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoat	Substanța inactivă	68187-32-6	269-087-2	0
Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu (lauril sulfat de amoniu Texapon)	Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu	Substanța inactivă	90583-11-2	292-209-0	0
Acid fosforic	Acid ortofosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0
Acid azotic	Acid azotic	Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	0
Ester fosfat alcool EO	Poli(oxi-1,2-etandil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, mono-C8-10-alchil eteri, fosfați	Substanța inactivă	68130-47-2		0
Alchil poliglucozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxi-6-(hidroximetil)oxan-3,4,5-triol	Substanța inactivă	68515-73-1	500-220-1	0
Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați (Dehydol 980)	Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați	Substanța inactivă	69227-22-1		0
Capryleth-9 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli(oxi-1,2-etandil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)	Substanța inactivă	53563-70-5		0

Hexeth-4 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli(oxi-1,2-etandil), .alfa.-(carboximetil)- .omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substanța inactivă	105391-15-9	0
---	--	-----------------------	-------------	---

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Fraze de precauție

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Mycobacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Spori de bacterii
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Clostridium difficile
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea stiintifica: Virusuri
denumirea comună: Viruses
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate
Descriere detaliata:

Dezinfectarea suprafețelor, a aparatelor și a echipamentelor utilizate în camerele sterile de uz medical, de tip A – D, precum și a spațiilor adiacente (de ex., în industria farmaceutică). Dezinfectarea la transfer sau dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni.

Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie:

- 1 minut pentru bacterii și levuri;
- 5 minute pentru fungi și micobacterii;
- 60 de minute pentru spori de bacterii;
- 30 de minute pentru virusuri.

Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru spori de *Clostridium difficile*;
- 30 de minute pentru spori de bacterii.

Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi;
- 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m²
Diluare (%): Produs gata de utilizare
Numărul și calendarul de aplicare:
Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Flacon-pulverizator din polietilenă tereftalată (PET) opacă, 0,25-1 l
Flacon din HDPE opacă, 1-5 l

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 10-20 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele

utilizate într-un recipient închis.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical prin ștergere, folosind un mop plat și găleată

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Mycobacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi

	<p>etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Spori de bacterii denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Clostridium difficile denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Virusuri denumirea comună: Viruses etapă de dezvoltare: nu există date</p>
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliată:</p> <p>Dezinfectarea podelelor din camerele sterile de uz medical, precum și a spațiilor adiacente (de ex., în industria farmaceutică).</p> <p>Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi și micobacterii; - 60 de minute pentru spori de bacterii; - 30 de minute pentru virusuri. <p>Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minute pentru spori de <i>Clostridium difficile</i>; - 30 de minute pentru spori de bacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m² Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Aplicați pe suprafețe prin spălare cu mopul.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Micobacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi; - 15 minute pentru micobacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m ² Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).
Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produs pe suprafață, după care ștergeți-o cu un șervețel curat și uscat și lăsați-o să se usuce. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m²) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m³); de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m³, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m².

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Mycobacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Spori de bacterii
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Clostridium difficile
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Virusuri
denumirea comună: Viruses
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate</p> <p>Descriere detaliată:</p> <p>Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale.</p> <p>Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi și micobacterii; - 60 de minute pentru spori de bacterii; - 30 de minute pentru virusuri. <p>Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minute pentru spori de <i>Clostridium difficile</i>; - 30 de minute pentru spori de bacterii. <p>Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; - 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m²</p> <p>Diluare (%): Produs gata de utilizare</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Flacon din HDPE opacă, 1-5 l</p> <p>Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l</p> <p>Canistră din HDPE opacă, 1-5 l</p>

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produs pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni (blaturi de lucru, echipamente) sau pulverizați produs pe suprafață, după care ștergeți-o cu un șervețel curat și uscat și lăsați-o să se usuce. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m²) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m³), de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m³, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m².

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, și o găleată

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Micobacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată</p> <p>Descriere detaliată: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale.</p> <p>Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi; - 15 minute pentru micobacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m²</p> <p>Diluare (%): Produs gata de utilizare</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți pe suprafață folosind o lavetă/un șervețel, de unică folosință, după care lăsați să se usuce la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, și o găleată

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Mycobacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Spori de bacterii
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Clostridium difficile
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Virusuri
denumirea comună: Viruses
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată
Descriere detaliată:
Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale.
Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie:

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi și micobacterii; - 60 de minute pentru spori de bacterii; - 30 de minute pentru virusuri. <p>Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minute pentru spori de <i>Clostridium difficile</i>; - 30 de minute pentru spori de bacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m² Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l</p>

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor. Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică). Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți pe suprafață folosind o lavetă/un șervețel, de unică folosință, după care lăsați să se usuze la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.6.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.7 Modul de utilizare

Utilizarea 7 - Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop și o găleată

Tipul produsului	TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Micobacterii denumirea comună: Mycobacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Fungi denumirea comună: Fungi etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Spori de bacterii denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Clostridium difficile denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Virusuri denumirea comună: Viruses etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare, folosind un mop și o găleată Descriere detaliată: Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din saloanele de spital.

	<p>Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi și micobacterii; - 60 de minute pentru spori de bacterii; - 30 de minute pentru virusuri. <p>Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minute pentru spori de <i>Clostridium difficile</i>; - 30 de minute pentru spori de bacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m² Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l</p>

4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).
Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop, după care lăsați să se usuce la aer.

4.7.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.7.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.8 Modul de utilizare

Utilizarea 8 - Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop și o găleată

Tipul produsului	TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Micobacterii denumirea comună: Mycobacteria etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Fungi denumirea comună: Fungi etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Spori de bacterii denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Clostridium difficile denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Virusuri denumirea comună: Viruses etapă de dezvoltare: nu există date</p>
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Spălare, folosind un mop și o găleată Descriere detaliată:</p> <p>Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din cabinetele medicale. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 minut pentru bacterii și levuri;- 5 minute pentru fungi și micobacterii;- 60 de minute pentru spori de bacterii;- 30 de minute pentru virusuri.

	<p>Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minute pentru spori de <i>Clostridium difficile</i>; - 30 de minute pentru spori de bacterii.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m² Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l</p>

4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).
Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop, ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer.

4.8.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

4.9 Modul de utilizare

Utilizarea 9 - Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare pe suprafață și apoi prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat sau prin pulverizare de lichid pe un șervețel și apoi prin ștergerea suprafeței, sau prin turnarea de dezinfectant într-o găleată și ștergerea suprafeței folosind o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, precum și dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de dimensiuni mai mari, prin ștergere, folosind un mop și o găleată

Tipul produsului	TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Micobacterii denumirea comună: Mycobacteria etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Fungi denumirea comună: Fungi etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Spori de bacterii denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Clostridium difficile denumirea comună: Spori de bacterii etapă de dezvoltare: nu există date</p> <p>denumirea științifică: Virusuri denumirea comună: Viruses etapă de dezvoltare: nu există date</p>
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Pulverizare, folosind un pulverizator cu trăgaci, și prin ștergere și spălare cu mopul, folosind un mop plat și găleată</p> <p>Descriere detaliată:</p> <p>Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni, din saloanele de spital și din cabinetele medicale.</p> <p>Durată de contact pentru pulverizare, ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minut pentru bacterii și levuri; - 5 minute pentru fungi și micobacterii; - 60 de minute pentru spori de bacterii; - 30 de minute pentru virusuri.

Durată de contact pentru pulverizare, ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru spori de *Clostridium difficile*;
- 30 de minute pentru spori de bacterii.

Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi;
- 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.

Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și o găleată; spălare cu mopul, folosind un mop și o găleată

Descriere detaliată:

Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni, din saloanele de spital și din cabinetele medicale.

Durată de contact pentru ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie:

- 1 minut pentru bacterii și levuri;
- 5 minute pentru fungi și micobacterii;
- 60 de minute pentru spori de bacterii;
- 30 de minute pentru virusuri.

Durată de contact pentru ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru spori de *Clostridium difficile*;
- 30 de minute pentru spori de bacterii.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m²; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m²

Diluare (%): Produs gata de utilizare

Numărul și calendarul de aplicare:

Frecvența de aplicare în cazul în care se combină pulverizarea cu un pulverizator cu trăgaci cu spălarea cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere

Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată pentru ștergere: 10 ml/m²; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m²

Diluare (%): Produs gata de utilizare

Numărul și calendarul de aplicare:

Frecvența de aplicare în cazul în care se combină ștergerea cu laveta și spălarea cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Flacon din HDPE opacă, 1-5 l
Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l
Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.9.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci, urmată de ștergere cu un șervețel uscat: Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

Spălare, folosind un mop și o găleată: Umpleți găleata cu produs gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop, ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer.

Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată: Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți-l pe suprafață cu ajutorul unei lavete/a unui șervețel, de unică folosință, ștergeți suprafața cu o lavetă curată/un șervețel curat și apoi lăsați să se usuce la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.9.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Pentru pulverizare: Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m²) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m³); de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m³, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m².

4.9.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.9.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.9.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.10 Modul de utilizare

Utilizarea 10 - Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tipul produsului

TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii

denumirea comună: Mycobacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Spori de bacterii
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Clostridium difficile
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Virusuri
denumirea comună: Viruses
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate
Descriere detaliată:

Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete).

Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie:

- 1 minut pentru bacterii și levuri;
- 5 minute pentru fungi și micobacterii;
- 60 de minute pentru spori de bacterii;
- 30 de minute pentru virusuri.

Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru spori de *Clostridium difficile*;
- 30 de minute pentru spori de bacterii.

Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi;
- 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m²
Diluare (%): Produs gata de utilizare
Numărul și calendarul de aplicare:
Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Flacon din HDPE opacă, 1-5 l
Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l

4.10.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.10.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.10.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.10.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.10.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.11 Modul de utilizare

Utilizarea 11 - Dezinfecția suprafețelor de mici dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tipul produsului

TP 04 - Produse alimentare și hrană pentru animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Micobacterii
denumirea comună: Mycobacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri

denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Fungi
denumirea comună: Fungi
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Spori de bacterii
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Clostridium difficile
denumirea comună: Spori de bacterii
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Virusuri
denumirea comună: Viruses
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate

Descriere detaliată:

Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care intră în contact cu alimentele (de ex., bucătării).

Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie:

- 1 minut pentru bacterii și levuri;
- 5 minute pentru fungi și micobacterii;
- 60 de minute pentru spori de bacterii;
- 30 de minute pentru virusuri.

Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru spori de *Clostridium difficile*;
- 30 de minute pentru spori de bacterii.

Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie:

- 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi;
- 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m²

Diluare (%): Produs gata de utilizare

Numărul și calendarul de aplicare:

Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere.

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Flacon din HDPE opacă, 1-5 l

Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l

4.11.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.11.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.11.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.11.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.11.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă).

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

-

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți cu multă apă.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-35 °C. Feriți de îngheț.

Perioada de valabilitate: 18 luni

6. Alte informații

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1,25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.