

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: Deosan Activate Pre RTU AG108

Produkttyp(er): PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

PT 03 - Veterinärhygien

Godkännandenummer: EU-0019228-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0019228-0003

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	3
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	3
2.2. Typ av formulering	3
3. Faro- och skyddsangivelser	3
4. Godkänd användning	4
5. Allmänna villkor för användning	29
5.1. Bruksanvisning	29
5.2. Riskbegränsande åtgärder	30
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	30
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	30
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	30
6. Övrig information	31

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Deosan Activate Pre RTU AG108
Deosan Activate Pre RTU

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Diversey Europe Operations B.V.
	Adress	Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Nederländerna
Godkännandenummer	EU-0019228-0000 1-2	
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	EU-0019228-0003	
Datum för godkännande	03/04/2019	
Utgångsdatum för godkännande	31/03/2029	

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	1319 - Jod
Tillverkarens namn	ACF Minera S.A.
Tillverkarens adress	San Martin No 499 1100000 Iquique Chile
Tillverkningsställe(n)	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne	1319 - Jod
Tillverkarens namn	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Tillverkarens adress	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Verksamt ämne	1319 - Jod
Tillverkarens namn	Cosayach Nitratos S.A.
Tillverkarens adress	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne	1319 - Jod
Tillverkarens namn	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Tillverkarens adress	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japan
Tillverkningsställe(n)	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japan

Verksamt ämne	1319 - Jod
Tillverkarens namn	ISE Chemicals Corporation
Tillverkarens adress	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Japan
Tillverkningsställe(n)	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Japan

Verksamt ämne	1319 - Jod
Tillverkarens namn	Atacama Minerals SCM
Tillverkarens adress	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Chile

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3

2.2. Typ av formulering

AL - Övriga vätskor

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till enligt nationella föreskrifter.

behållaren lämnas till enligt nationella föreskrifter.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Desinfektion före mjölkning, manuell doppning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning - Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell doppning.
Appliceringshastighet och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt). - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. - 3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering

Användarkategori(er)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Yrkesmässig användare

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell doppning.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt/vikt jod. Späd inte före användning.
3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

--

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2 Bruksanvisning

Användning 2 - Desinfektion före mjölkning, manuell skumning (RTU vätska)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: -
Svenskt namn: Bakterie
Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: -
Svenskt namn: Jäst
Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Inomhus

Appliceringsmetod

Manuell skumning -

Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning.

Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell skumningsmetod.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. -

3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag.
Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HDPE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. –

3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag.
Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering

4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3 Bruksanvisning

Användning 3 - Desinfektion före mjölkning, manuell sprejning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning - Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell sprejmetod.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. - 3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell sprejmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning.
3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag.
Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering

4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4 Bruksanvisning

Användning 4 - Desinfektion efter mjölkning, manuell dopping (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Inomhus

Appliceringsmetod

Manuell doppning -

Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning.

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. -

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.4.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.
3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.
Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.4.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5 Bruksanvisning

Användning 5 - Desinfektion efter mjölkning, manuell skumning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning - Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. - 3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.5.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt/vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.

4.5.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6 Bruksanvisning

Användning 6 - Desinfektion efter mjölkning, manuell sprejning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning - Spendedesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell sprejmetod.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. -

3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag.
Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.6.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell sprejmetod.
Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt/vikt jod. Späd inte före användning.
3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.
Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.

4.6.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen)

4.6.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7 Bruksanvisning

Användning 7 - Desinfektion efter mjölkning, automatisk sprejning (får inte kombineras med desinfektion före mjölkning) (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Automatisk sprejning - Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via automatisk sprutmetod. .
Appliceringshastighet och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning - 5 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Ej i kombination med jodbaserad desinfektion före mjölkning. Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.7.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via automatisk sprejmetod.
Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning.
5 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Ej kombinerad med jodbaserad desinfektion före mjölkning.
Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.

4.7.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8 Bruksanvisning

Användning 8 - Desinfektion efter mjölkning, halvautomatisk doppning (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Halvautomatisk doppning - Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. -

3 appliceringar efter mjölkning per djur, per dag.
Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.8.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.
Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning.
3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.
Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.8.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9 Bruksanvisning

Användning 9 - Desinfektion före och efter mjölkning, manuell dopping (RTU-vätska)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: -
Svenskt namn: Bakterie
Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: -
Svenskt namn: Jäst
Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Appliceringsmetod

Inomhus
Inomhus
Manuell doppning - Spendesinfektionsmedel för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppning.

Appliceringshastighet och frekvens

Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. - 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upptill 5 appliceringar totalt). Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
--

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.9.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell dopning.
Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt/vikt jod. Späd inte före användning.
3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).
Applicera högst 10 ml produkt/djur/applicering.

4.9.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar under produkt hanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.9.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10 Bruksanvisning

Användning 10 - Desinfektion före och efter mjölkning, manuell skumning (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterie Utvecklingsstadium: -</p> <p>Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -</p>
Användningsområde	<p>Inomhus</p> <p>Inomhus</p>
Appliceringsmetod	<p>Manuell skumning -</p> <p>Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning</p> <p>Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell skumningsmetod.</p>
Appliceringshastighet och frekvens	<p>Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. -</p> <p>3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).</p> <p>Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.</p>
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare
200 liter HDPE eller f-HDPE fat
950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.10.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.
Applicera direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell skumningsmetod.
3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).
Applicera högst 5 ml produkt/djur/applicering.

4.10.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.10.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11 Bruksanvisning

Användning 11 - Desinfektion före och efter mjölkning, manuell sprejning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Veterenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning - Spendesinfektionsmedel, för direktapplivering på lakterande djur före och efter

	<p>mjölkning.</p> <p>Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell sprejmetod.</p>
<p>Appliceringshastighet och frekvens</p>	<p>Brukslösningens jodkoncentration 3000 mg / kg (0,3% vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3% vikt / vikt jod. Späd inte före användning. -</p> <p>3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).</p> <p>Applicera högst 15 ml produkt/djur/applicering.</p>
<p>Användarkategori(er)</p>	<p>Yrkesmässig användare</p>
<p>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</p>	<p>1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare</p>

4.11.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

<p>Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell sprutmetod.</p> <p>Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte ut före användning. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).</p>
--

Applicera högst 15 ml produkt /djur/applicering.

4.11.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen.)
Använd lämpliga skyddsskor (EN 13832) vid applicering av produkten.
En skyddsoverall (minst typ 6, EN 13034) ska bäras.

4.11.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Produkten måste uppnå en temperatur > 20 ° C före användning
Före mjölkning:
Applicera produkten så att varje spene täcks.
För effektiv användning mot bakterier och jäst, måste produkten lämnas i kontakt med huden i minst 30 sekunder.
Efter lämplig kontakttid, ta bort produkten noggrant, med en juverduk för engångs bruk / trasa för att säkerställa att spenarna är rena och torra.
Brukslösningens jod-koncentration 3000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).
Efter mjölkning:
Behandla varje spene i sin helhet med produkten, omedelbart efter mjölkning.
För att säkerställa tillräcklig kontakttid bör ombesörjas att produkten inte avlägsnas efter applicering (t ex håll korna stående minst 5 minuter).
Brukslösningens jod-koncentration 3000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination (upp till 5 behandlingar per djur och dag). Den ska dock inte användas i kombination med en annan jobbaserad produkt.
Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen rekommenderas.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Inandning: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.
Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.
Ögonkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.
Förtäring: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.
Efter hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.
Efter ögonkontakt: Skölj öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).
Efter förtäring: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart till läkare.
Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktförpackning eller etikett till hands

Stabilitet och reaktivitet:

Reaktivitet: Inga reaktionsrisker kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.
Kemisk stabilitet: Stabil under normala förvarings- och användningsförhållanden.
Risk för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända under normala lagrings- och användningsförhållanden.
Förhållanden som ska undvikas: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.
Farliga sönderdelningsprodukter: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Valla in för att samla större vätskespill.
Samla upp och/eller absorbera spill med inert material och placera sedan i lämplig behållare.
Förhindra utsläpp från att komma in i avlopp, kloak eller vattendrag.
Samlas i slutna och lämpliga behållare för bortskaffande. Placera inte spillt material tillbaka i originalbehållaren.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Tomma behållare måste sköljas tre gånger före bortskaffande.
Juverdukar i engångsmaterial / papper som används för att torka djurspenar och avlägsna produkten från dem bör kasseras som vanligt/hushållsavfall.
Förhindra utsläpp av utspädd produkt till avlopp.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara endast i sluten originalbehållare
Skydda mot frost
Förvaras inte vid temperaturer över 30 ° C
Hållbarhet 24 månader

6. Övrig information

Ingen