

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Ratimor žitni mamac

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/19-12/41

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0013245-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Ratimor žitni mamac Bromadiolone žitni mamac
--------------------	---

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv Unichem d.o.o. Adresa Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnik Slovenija
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/19-12/41
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0013245-0000
Datum autorizacije	03/12/2012
Datum isteka autorizacije	31/12/2025

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Unichem d.o.o.
Adresa proizvođača	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnik Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2 1360 Vrhnik Slovenija

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Bromadiolon
Naziv proizvođača	Activa Srl
Adresa proizvođača	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1',1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

RB Mamac (spreman za uporabu)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H360D: Može naškoditi nerođenom djetetu. H372: Uzrokuje oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti {1:navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost:}. EUH208: Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P201: Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202: Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja si gurnosnih mjera predostrožnosti. P260: Ne udisati prašinu. P264: Nakon uporaberuke. temeljito oprati {0:...} P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušti. P280: Nositi zaštitne rukavice. P308 + P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:: zatražiti savjet. P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrs te otpada.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Profesionalni korisnici - kućni miševi – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spremam za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za suzbijanje infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamac po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Redovito provjeravati potrošnju mamac i zamijeniti potrošeni ili oštećeni mamac sve dok konzumacija ne prestane. Tretman treba ponoviti u situacijama kada postoje dokazi o novoj infestaciji (npr. svježe staze ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte preglede mamac.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Maksimalna veličina pakiranja 25 kg. 1. Minci u rasutom stanju isporučuju se u sljedećim vanjskim pakiranjima: Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) u vanjskom pakiranju od lijepjenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg. Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) s natronskom vrećom ili PP/HDPE kantama s poklopциma ili kutijama od lijepjenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg. PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 10 kg. Natronska vreća. Između 5 kg i 10 kg. PP ili PE kanta s poklopcem. Između 5 kg i 10 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona s polietilenskom vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 10 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.

PP tkana vreća. Između 5 kg i 10 kg.

PE ili PP vreća. Između 5 kg i 10 kg.

HDPE spremnik mamaca za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g) dalje se pakira u vanjsku kutiju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.

2. Mamac u čajnim vrećicama od jestivog papira (10 g - 40 g) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju ili natronsku vreću ili PP/HDPE kante s poklopcom do 25 kg

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PE ili PP kanta s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za miševe i štakore sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Kutije s mamcem pakirane u spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe sadrži mamac za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g). Kutija za mamac pakirana u vanjski spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

3. Mamac u vrećicama/pakiranjima za postavljanje:

Mamac u vrećicama od polipropilenskog/papirnatog filma, vrećicama od PET/polietilenskog filma, vrećicama od polietilenskog/papirnatog filma ili polietilenskog/aluminiziranog filma (10 g - 40 g za miševe i 10 g - 200 g za štakore) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju. Između 5 kg i 20 kg.

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

HDPE spremnik. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PP tkana vreća ili vreća od višeslojnog papira. Između 5 kg i 25 kg.

Posuda (PP) ili kanta (PP ili PE) s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.

Baćva od polipropilena ili polietilena. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe, kutije s mamcem pakirane u vanjsko pakiranje od

<p>lijepjenog kartona ili spremnik od toplinski zabravljeni plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Vrećica od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/ polietilena. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Jerry limenka, s vijčanim poklopcom sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Kutija od lijepjenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Pakiranje od lijepjenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.</p>
--

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Slijedite dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Profesionalni korisnici - štakori – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
-----------------	-------------------

Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamac po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Redovito provjeravati potrošnju mamac i zamjeniti potrošeni ili oštećeni mamac sve dok konzumacija ne prestane. Tretman treba ponoviti u situacijama kada postoje dokazi o novoj infestaciji (npr. svježe staze ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte preglede mamac.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Maksimalna veličina pakiranja 25 kg. 1. Mamci u rasutom stanju isporučuju se u sljedećim vanjskim pakiranjima: Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) u vanjskom pakiranju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg. Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) s natronskom vrećom ili PP/HDPE kantama s poklopциma ili kutijama od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg. PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 10 kg. Natronska vreća. Između 5 kg i 10 kg. PP ili PE kanta s poklopcem. Između 5 kg i 10 kg. Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona s polietilenskom vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 10 kg. Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg. PP tkana vreća. Između 5 kg i 10 kg. PE ili PP vreća. Između 5 kg i 10 kg.

HDPE spremnik mamaca za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g) dalje se pakira u vanjsku kutiju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.

2. Mamac u čajnim vrećicama od jestivog papira (10 g - 40 g) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju ili natronsku vreću ili PP/HDPE kante s poklopcom do 25 kg PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PE ili PP kanta s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za miševe ili štakore sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Kutije s mamcem pakirane u spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe sadrži mamac za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g). Kutija za mamac pakirana u vanjski spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

3. Mamac u vrećicama/pakiranjima za postavljanje:

Mamac u vrećicama od polipropilenskog/papirnatog filma, vrećicama od PET/polietilenskog filma, vrećicama od polietilenskog/papirnatog filma ili polietilenskog/aluminiziranog filma (10 g - 40 g za miševe i 10 g - 200 g za štakore) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju. Između 5 kg i 20 kg.

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

HDPE spremnik. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PP tkana vreća ili vreća od višeslojnog papira. Između 5 kg i 25 kg.

Posuda (PP) ili kanta (PP ili PE) s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.

Baćva od polipropilena ili polietilena. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe, kutije s mamcem pakirane u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona ili spremnik od toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

Vrećica od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena. Između 5 kg i 10 kg.

Jerry limenka, s vijčanim poklopcom sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Između 5 kg i 10 kg.

Kutija od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.

Pakiranje od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

--	--

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početka tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.
- Slijediti dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Profesionalni korisnici - kućni miševi i/ili štakori – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor

	Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom, oko zgrada
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za suzbijanje infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamca po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Redovito provjeravati potrošnju mamaca i zamijeniti potrošeni ili oštećeni mamac sve dok konzumacija ne prestane. Tretman treba ponoviti u situacijama kada postoje dokazi o novoj infestaciji (npr. svježe staze ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte preglede mamaca.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Maksimalna veličina pakiranja 25 kg. 1. Mamci u rasutom stanju isporučuju se u sljedećim vanjskim pakiranjima: Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) u vanjskom pakiranju od ljepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg. Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) s natronskom vrećom ili PP/HDPE kantama s poklopциma ili kutijama od ljepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg. PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 10 kg.

	Natronska vreća. Između 5 kg i 10 kg.
	PP ili PE kanta s poklopcem. Između 5 kg i 10 kg.
	Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona s polietilenskom vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 10 kg.
	Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.
	PP tkana vreća. Između 5 kg i 10 kg.
	PE ili PP vreća. Između 5 kg i 10 kg.
	HDPE spremnik mamaca za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g) dalje se pakira u vanjsku kutiju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.
2.	Mamac u čajnim vrećicama od jestivog papira (10 g - 40 g) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:
	Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju ili natronsku vreću ili PP/HDPE kante s poklopcom do 25 kg
	PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.
	Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.
	PE ili PP kanta s poklopcem. Između 5 kg i 20 kg.
	Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.
	Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.
	Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za miševe i štakore sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Kutije s mamcem pakirane u spremnik od lijepljenog kartona

ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom.
Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s
mamacem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe
sadrži mamac za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40
g). Kutija za mamac pakirana u vanjski spremnik od lijepljenog
kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom
brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

3. Mamac u vrećicama/pakiranjima za postavljanje:

Mamac u vrećicama od polipropilenskog/papirnatog filma,
vrećicama od PET/polietilenskog filma, vrećicama od
polietilenskog/papirnatog filma ili polietilenskog/aluminiziranog
filma (10 g - 40 g za miševe i 10 g - 200 g za štakore) isporučuje
se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko
pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju. Između 5 kg i
20 kg.

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

HDPE spremnik. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PP tkana vreća ili vreća od višeslojnog papira. Između 5 kg i 25
kg.

Posuda (PP) ili kanta (PP ili PE) s poklopcem. Između 5 kg i 20
kg.

Baćva od polipropilena ili polietilena. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija
s macem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene
uporabe, kutije s macem pakirane u vanjsko pakiranje od
lijepljenog kartona ili spremnik od toplinski zabrtvljene plastike
ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

Vrećica od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/
polietilena. Između 5 kg i 10 kg.

	Jerry limenka, s vijčanim poklopcom sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Između 5 kg i 10 kg.
	Kutija od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.
	Pakiranje od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljivanja.
 - Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana (za štakore 5-7 dana) i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Slijediti dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ne postavljati ovaj proizvod izravno u jazbine.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Ospozobljeni profesionalni korisnici - Kućni miš i/ili štakor - u zatvorenom

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: • Mamac spremam za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja. • Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za suzbijanje infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamac po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamac po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Redovito provjeravati potrošnju mamac i zamijeniti potrošeni ili oštećeni mamac sve dok konzumacija ne prestane. Tretman treba ponoviti u situacijama kada postoje dokazi o novoj infestaciji (npr. svježe staze ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte preglede mamac.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Maksimalna veličina pakiranja 25 kg. 1. Mamci u rasutom stanju isporučuju se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

	<p>Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) u vanjskom pakiranju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) s natronskom vrećom ili PP/HDPE kantama s poklopcom ili kutijama od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Natronska vreća. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PP ili PE kanta s poklopcom. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona s polietilenskom vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PP tkana vreća. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PE ili PP vreća. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>HDPE spremnik mamaca za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g) dalje se pakira u vanjsku kutiju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.</p>
2.	<p>Mamac u čajnim vrećicama od jestivog papira (10 g - 40 g) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:</p> <p>Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju ili natronsku vreću ili PP/HDPE kante s poklopcom do 25 kg</p> <p>PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.</p> <p>Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.</p> <p>PE ili PP kanta s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za miševe i štakore sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Kutije s mamcem pakirane u spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe sadrži mamac za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g). Kutija za mamac pakirana u vanjski spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.</p>
3.	<p>Mamac u vrećicama/pakiranjima za postavljanje:</p> <p>Mamac u vrećicama od polipropilenskog/papirnatog filma, vrećicama od PET/polietilenskog filma, vrećicama od polietilenskog/papirnatog filma ili polietilenskog/aluminiziranog filma (10 g - 40 g za miševe i 10 g - 200 g za štakore) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:</p> <p>Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.</p> <p>HDPE spremnik. Između 5 kg i 25 kg.</p>

	<p>Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.</p> <p>PP tkana vreća ili vreća od višeslojnog papira. Između 5 kg i 25 kg.</p> <p>Posuda (PP) ili kanta (PP ili PE) s poklopcem. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Baćva od polipropilena ili polietilena. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe, kutije s mamcem pakirane u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona ili spremnik od toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Vrećica od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Jerry limenka, s vijčanim poklopcom sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Kutija od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.</p> <p>Pakiranje od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.</p>
--	--

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.
- Proizvod ne koristiti kao nadzor aktivnosti glodavaca.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Osposobljeni profesionalni korisnici - Miševi i/ili štakori – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom oko zgrada
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: • Mamac spremanj za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja. • Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamac
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za suzbijanje infestacije miševima treba upotrijebiti do 40 g mamac po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti do 200 g mamac po mjestu postavljanja (hranilištu). Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene:

	<p>Redovito provjeravati potrošnju mamaca i zamijeniti potrošeni ili oštećeni mamac sve dok konzumacija ne prestane. Tretman treba ponoviti u situacijama kada postoje dokazi o novoj infestaciji (npr. svježe staze ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte preglede mamaca.</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Minimalna veličina pakiranja 5 kg.</p> <p>Maksimalna veličina pakiranja 25 kg.</p> <p>1. Mamci u rasutom stanju isporučuju se u sljedećim vanjskim pakiranjima:</p> <p>Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) u vanjskom pakiranju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) s natronskom vrećom ili PP/HDPE kantama s poklopциma ili kutijama od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Natronska vreća. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PP ili PE kanta s poklopcem. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona s polietilenskom vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PP tkana vreća. Između 5 kg i 10 kg.</p> <p>PE ili PP vreća. Između 5 kg i 10 kg.</p>

HDPE spremnik mamaca za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g) dalje se pakira u vanjsku kutiju od lijepljenog kartona ili vlknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.

2. Mamac u čajnim vrećicama od jestivog papira (10 g - 40 g) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju ili natronsku vreću ili PP/HDPE kante s poklopcom do 25 kg

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PE ili PP kanta s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za miševe i štakore sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Kutije s mamcem pakirane u spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe sadrži mamac za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g). Kutija za mamac pakirana u vanjski spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

3. Mamac u vrećicama/pakiranjima za postavljanje:

Mamac u vrećicama od polipropilenskog/papirnatog filma, vrećicama od PET/polietilenskog filma, vrećicama od polietilenskog/papirnatog filma ili polietilenskog/aluminiziranog filma (10 g - 40 g za miševe i 10 g - 200 g za štakore) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

	Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju. Između 5 kg i 20 kg.
	PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.
	HDPE spremnik. Između 5 kg i 25 kg.
	Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.
	PP tkana vreća ili vreća od višeslojnog papira. Između 5 kg i 25 kg.
	Posuda (PP) ili kanta (PP ili PE) s poklopcem. Između 5 kg i 20 kg.
	Baćva od polipropilena ili polietilena. Između 5 kg i 20 kg.
	Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe, kutije s mamcem pakirane u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona ili spremnik od toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.
	Vrećica od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena. Između 5 kg i 10 kg.
	Jerry limenka, s vijčanim poklopcem sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Između 5 kg i 10 kg.
	Kutija od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.
	Pakiranje od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.

-
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].
 - Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.
 - Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.
- Proizvod ne koristiti kao nadzor aktivnosti glodavaca.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja mamca u blizini vodotokova (npr. rijeke, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Ospozobljeni profesionalni korisnici – suzbijanje štakora – kanalizacija

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade životinje
Područje(a) uporabe	ostalo: Otro Kanalizacija
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: • Mamac spremam za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Kod infestacije štakorima u kanalizaciji treba upotrijebiti do 200 g mamca po šahtu. U slučaju jake infestacije postaviti 200 g mamca po šahtu. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Redovito provjeravati potrošnju mamaca i zamijeniti potrošeni ili oštećeni mamac sve dok konzumacija ne prestane. Tretman treba ponoviti u situacijama kada postoje dokazi o novoj infestaciji (npr. svježe staze ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte preglede mamaca.
Kategorija(e) korisnika	ospozobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Maksimalna veličina pakiranja 25 kg. 1. Mamci u rasutom stanju isporučuju se u sljedećim vanjskim pakiranjima: Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) u vanjskom pakiranju od ljepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.

Plastične vreće (polietilen (PE) ili polipropilen (PP) ili PE/PP ili papir/PE) s natronskom vrećom ili PP/HDPE kantama s poklopциma ili kutijama od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 10 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 10 kg.

PP ili PE kanta s poklopcom. Između 5 kg i 10 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona s polietilenskom vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 10 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča ili kartona. Između 5 kg i 10 kg.

PP tkana vreća. Između 5 kg i 10 kg.

PE ili PP vreća. Između 5 kg i 10 kg.

HDPE spremnik mamaca za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g) dalje se pakira u vanjsku kutiju od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 10 kg.

2. Mamac u čajnim vrećicama od jestivog papira (10 g - 40 g) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju ili natronsku vreću ili PP/HDPE kante s poklopcom do 25 kg

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PE ili PP kanta s poklopcom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

Kutije od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za miševe i štakore sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Kutije s mamcem pakirane u spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe sadrži mamac za štakore (10 g do 200 g) ili miševe (10 g do 40 g). Kutija za mamac pakirana u vanjski spremnik od lijepljenog kartona ili toplinski zabrtvljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.

3. Mamac u vrećicama/pakiranjima za postavljanje:

Mamac u vrećicama od polipropilenskog/papirnatog filma, vrećicama od PET/polietilenskog filma, vrećicama od polietilenskog/papirnatog filma ili polietilenskog/aluminiziranog filma (10 g - 40 g za miševe i 10 g - 200 g za štakore) isporučuje se u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vrećica (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirana u vanjsko pakiranje od lijepljenog kartona/kartonsku kutiju. Između 5 kg i 20 kg.

PE ili PP pakiranja. Između 5 kg i 25 kg.

HDPE spremnik. Između 5 kg i 25 kg.

Natronska vreća. Između 5 kg i 25 kg.

PP tkana vreća ili vreća od višeslojnog papira. Između 5 kg i 25 kg.

Posuda (PP) ili kanta (PP ili PE) s poklopcem. Između 5 kg i 20 kg.

Baćva od polipropilena ili polietilena. Između 5 kg i 20 kg.

Unaprijed napunjena ili ponovno punjiva HDPE ili PP kutija s mamcem za štakore ili miševe sa zaštitom od neovlaštene uporabe, kutije s mamcem pakirane u vanjsko pakiranje od

	lijepljenog kartona ili spremnik od toplinski zabrtyljene plastike ili foliju s toplinskom brtvom. Između 5 kg i 20 kg.
	Vrećica od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena. Između 5 kg i 10 kg.
	Jerry limenka, s vijčanim poklopcom sa zaštitom od neovlaštene uporabe. Između 5 kg i 10 kg.
	Kutija od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča. Između 5 kg i 20 kg.
	Pakiranje od lijepljenog kartona ili vlaknastih ploča s PE ili PP vrećom ili unutarnjim spremnikom. Između 5 kg i 20 kg.

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac mora biti postavljen na način da ne može doći u kontakt s vodom i da se ne može isprati vodom.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Mamac se postavlja samo u kanalizacijske sustave koji su povezani sa pogonima za pročišćavanje otpadnih voda.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.
- Ne koristiti proizvod kao trajne mamce za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor njihove aktivnosti.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrstile vrste glodavaca, mesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjer (zatvoriti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Proizvod postaviti na mesta u neposrednoj blizini mesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjerne koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, pitи ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- Ako izgleda da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjerne za suzbijanje glodavaca.
- Na kraju tretmana ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.
- Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamce.

Ospozobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrstile vrste glodavaca, mesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Proizvod postaviti na mesta u neposrednoj blizini mesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije trebaju biti pričvršćene na tlo ili druge strukturne predmete.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.

¹Upute o uporabi, mjerne za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

-
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
 - Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije za mamce.
 - Proizvod treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
 - Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
 - Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).
 - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda oprati ruke i izravno izloženu kožu.
 - O učestalosti pregleda tretiranog području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti uskladena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najboljeg iskustva.
 - Ako izgleda da je količina mamaca nedovoljna za nazočnu populaciju, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promjeniti formulaciju mamca.
 - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Profesionalni korisnici:

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti sve moguće prolaznike (na primjer korisnike) o kampanji za suzbijanje glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dva puta tjedno).
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da proizvod nije namijenjen za opću uporabu (npr. "samo za profesionalne korisnike").
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana. Ako proizvod do kraja deratizacijskog postupka nije učinkovit (aktivnost glodavaca je i dalje primjetna), informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno uputiti korisnika da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mјera.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod namijenjen samo za ospozobljene profesionalne korisnike koji imaju certifikat o završenoj odgovarajućoj edukaciji (npr. "samo za ospozobljene profesionalne korisnike").
- Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti, ne izmjenjivati proizvod sa drugim antikoagulantnim rodenticidom slične ili slabije jačine. Za zamjenu proizvoda razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ako je moguće ili jačeg antikoagulantnog rodenticida.
- Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posuđe koje se upotrebljavalo na prekrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i fecesu.
- Antidot: Vitamin K1 - primjenjuje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.
- Bromadiolon je neizravni antikoagulans. Filohinon, vitamin K1, je antidot. U slučaju sumnje na otrovanje, protrombinsko vrijeme odredite ne manje od 18 sati nakon konzumiranja. Ako je povišeno, dajte vitamin K1 i nastavite dok se protrombinsko vrijeme ne normalizira. Nastavite s određivanjem vremena protrombina tri dana nakon povlačenja antidota i nastavite s liječenjem ako se povišenje ponovi za to vrijeme.
- U slučaju:
 - Dodira s kožom - oprati kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.
 - Dodira s očima - isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, držati kapke otvorenima, ispirati najmanje 10 minuta.
 - Gutanja - oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju.
- Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinara.
- Zaštitne kutije moraju biti označene sa sljedećim informacijama: "ne pomicati; ne otvarati"; "sadrži rodenticid"; "Ratimor žitni mamac ili broj odobrenja"; "aktivna tvar: bromadiolon" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342"
- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce ukloniti u skladu s Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.
- Preporučuje se uporaba rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Spremnik čuvati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

Rok valjanosti: 24 mjeseca

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

- Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.
- Glodavci mogu prenositi bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti rukavice ili hvataljke kod sakupljanja i zbrinjavanja lešina.
- Proizvod sadrži gorku tvar i boju.

Ispravne H/P oznake su:

P308 + P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.