

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

BROMUS PASTE

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0177

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0024168-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	BROMUS PASTE COPBROD PASTE BRODCOP PASTE
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Copyr S.p.A.
	Διεύθυνση	Via G. Stephenson 73 20157 Milano Ιταλία
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0177
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0024168-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		27/08/2020
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Copyr S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via G. Stephenson, 73 20157 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	INDUPHARMA S.R.L. - Via Sorgaglia, 40 35020 Arre (PD) Ιταλία Colkim S.r.l. - Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia (BO) Ιταλία Vebi Istituto Biochimico S.r.l. -Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	ACTIVA SRL
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Milan Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tezza S.r.l.-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (β/β)
Άρωμα μίγματος φρούτων		Μη δραστική ουσία			0,3 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα το BLOOD ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης; }.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε in accordance with national and international regulations.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Οικιακά ποντίκια και αρουραίοι - εκπαιδευμένοι επαγγελματίες - εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν ισχύει για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Νορβηγικός αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά έως ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: άλλο: νεαρά έως ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ποντίκι κατοικιών Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: άλλο: νεαρά έως ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματικά προϊόντα: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα μη στοχευόμενα είδη και τους ανθρώπους με τους ανθεκτικούς στην παραβίαση δολωματικούς σταθμούς.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση: Αρουραίοι:- Υψηλή προσβολή: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια: 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δολώματα των 20 γρ.

	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 κιλά. έως και 25 κιλά.</p> <p>Κατά περίπτωση, η συσκευασία μπορεί να περιέχει ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο μέγεθος σάκου στα 10 κιλά</p> <p>Φιάλη (HDPE) με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα από 1,5 κιλά έως 5 κιλά</p> <p>Σάκος/σακούλα από σύνθετο πλαστικό με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα από 1,5 κιλά έως 25 κιλά</p> <p>Σάκος/σακούλα από σύνθετο πλαστικό με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 κιλά έως 10 κιλά - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 κιλά</p> <p>Πλαστικός (HDPE) κουβάς με ετικέτα από 1,5 κιλά έως 25 κιλά</p> <p>Πλαστικός (HDPE) κουβάς με ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 κιλά έως 10 κιλά - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 κιλά</p> <p>Συσκευασία από χαρτόνι με πλαστική εσωτερική επένδυση με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα από 1,5 έως 10 κιλά που περιέχει μονούς σάκους με εσωτερικό πλαστικό έως και 10 κιλά ο κάθε ένας</p> <p>Συσκευασία από χαρτόνι με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα με εσωτερική πλαστική επένδυση που περιέχει μονούς σάκους με εσωτερικό πλαστικό έως και 10 κιλά ο κάθε ένας.</p>
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου αντιμετώπισης.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώνετε τυχόν παριστάμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή και της γύρω περιοχής) σχετικά με την επιχείρηση για την καταπολέμηση τρωκτικών

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις τρύπες, απομακρύνετε κατά το δυνατό τις πιθανές τροφές και νερό) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα νέας προσβολής.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθών πρακτικών.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting)

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολών τρωκτικών ή για λόγους επισκόπησης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού, να διασφαλίζετε ότι αποτρέπεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

Δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών συνθηκών αποθήκευσης του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης εφόσον εφαρμόζονται οι οδηγίες αποθήκευσης όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο τμήμα «Γενικές οδηγίες χρήσης (εκπαιδευμένοι επαγγελματίες)» .

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Ποντίκια και αρουραίοι - εκπαιδευμένοι επαγγελματίες - εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν ισχύει για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Νορβηγικός αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: νεαρά έως ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής

	<p>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: άλλο: νεαρά έως ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i></p> <p>Κοινή ονομασία: άλλο: Ποντίκι κατοικιών</p> <p>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: άλλο: νεαρά έως ενήλικα</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματικά προϊόντα: - Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα μη στοχευόμενα είδη και τους ανθρώπους με τους ανθεκτικούς στην παραβίαση δολωματικούς σταθμούς.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Δόση: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια: 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Δολώματα των 20 γρ.</p> <p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 κιλά. έως και 25 κιλά.</p> <p>Κατά περίπτωση, η συσκευασία μπορεί να περιέχει ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο μέγεθος σάκου στα 10 κιλά</p> <p>Φιάλη (HDPE) με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα από 1,5 κιλά έως 5 κιλά</p> <p>Σάκος/σακούλα από σύνθετο πλαστικό με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα από 1,5 κιλά έως 25 κιλά</p>

	<p>Σάκος/σακούλα από σύνθετο πλαστικό με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 κιλά έως 10 κιλά - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 κιλά</p> <p>Πλαστικός (HDPE) κουβάς με ετικέτα από 1,5 κιλά έως 25 κιλά</p> <p>Πλαστικός (HDPE) κουβάς με ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 κιλά έως 10 κιλά - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 κιλά</p> <p>Συσκευασία από χαρτόνι με πλαστική εσωτερική επένδυση με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα από 1,5 έως 10 κιλά που περιέχει μονούς σάκους με εσωτερικό πλαστικό έως και 10 κιλά ο κάθε ένας</p> <p>Συσκευασία από χαρτόνι με επικολλημένη ή εκτυπωμένη ετικέτα με εσωτερική πλαστική επένδυση που περιέχει μονούς σάκους με εσωτερικό πλαστικό έως και 10 κιλά ο κάθε ένας.</p>
--	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου αντιμετώπισης.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώνετε τυχόν παριστάμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή και της γύρω περιοχής) σχετικά με την επιχείρηση για την καταπολέμηση τρωκτικών

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις τρύπες, απομακρύνετε κατά το δυνατό τις πιθανές τροφές και νερό) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα νέας προσβολής.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθών πρακτικών.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting)

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας στις φωλιές

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, να διασφαλίσετε ότι αποτρέπεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

Δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών συνθηκών αποθήκευσης του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης εφόσον εφαρμόζονται οι οδηγίες αποθήκευσης όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο τμήμα «Γενικές οδηγίες χρήσης (εκπαιδευμένοι επαγγελματίες)» .

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν τη χρήση διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τυχόν πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης.
- Πραγματοποιήστε μια επιθεώρηση της προσβεβλημένης περιοχής πριν τη δόλωση και μια επιτόπια αξιολόγηση για να αναγνωριστεί το είδος των τρωκτικών, τα σημεία δραστηριότητας και για να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και τον βαθμό της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από τα παραπάνω, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή πριν την εφαρμογή, καθώς έτσι θα επηρεαστεί ο πληθυσμός των τρωκτικών και θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί η αποδοχή του δολώματος.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο ενός συστήματος ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικών μεθόδων αντιμετώπισης.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις τρύπες, απομακρύνετε κατά το δυνατό τις πιθανές τροφές και νερό) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα νέας προσβολής.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, φωλιές κ.λπ.).
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, φωλιές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (δείτε την ενότητα 5.3 για τις πληροφορίες που θα πρέπει να αναγράφονται στη σήμανση).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται η εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και θα πρέπει κοντά στα δολώματα να υπάρχει μια ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό και να αναφέρει τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια και παραγωγικά ζώα καθώς και άλλα μη στοχευόμενα ζώα.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά (ελαστικά) κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθών πρακτικών.
- Αν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το φαινομενικό μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τα σημεία δόλωσης και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση των δολωμάτων και δεν παρατηρείται μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Εάν έχουν αποκλειστεί τα άλλα αίτια, είναι πιθανόν να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Εξετάστε επίσης το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

- Αφαιρέστε τα υπολειπόμενα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς μετά το τέλος της περιόδου εφαρμογής. - Οδηγίες χρήσης "ειδικές για το δόλωμα": -Δολώματα σε φακελάκια: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν τα δολώματα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώνετε τυχόν παριστάμενους σχετικά με την επιχείρηση για την καταπολέμηση τρωκτικών

Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) θα επισημαίνουν σαφώς ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει την τήρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων εκπαίδευσης (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").

- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές που υπάρχει η υποψία ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, εκτός αν υπάρχει έγκριση για εφαρμογές μόνιμης δόλωσης.

- Μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά με αντίστοιχα ή λιγότερο ισχυρά, για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή χρήσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν είναι διαθέσιμο, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό.

- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, που ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορούν να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις παρακάτω πληροφορίες: "μην μετακινείτε και μην ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, επικοινωνήστε με ένα κέντρο δηλητηριάσεων"

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν και τις συσκευασίες σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Αποθηκεύστε σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορούν να χρειαστούν από 4 έως και 10 λεπτά μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα.
- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απόρριψή τους.
- Το προϊόν περιέχει πικραντική ουσία και χρωστική.