

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

RATOREX Wax Blocks Compressed

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0218

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0030174-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	RATOREX Wax Blocks Compressed
-------------------	-------------------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	TAFARM JOHN CON. TATSIRAMOS L.T.D.
	Διεύθυνση	CHRISTIANOUPOLEOS 108 11146 GALATSI Ελλάδα
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0218	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>	GR-0030174-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	02/03/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/12/2026	

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Laboratorios Agrochem, S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	C/Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera - Βαρκελώνη Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	C/Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera - Βαρκελώνη Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa S.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	via Feltre, 32 20132 Μιλάνο Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή μπλοκ

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε ή/και το δοχείο του, καθώς και τα νεκρά τρωκτικά, ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. (Ευρύ κοινό).</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε ή/και το δοχείο του, καθώς και τα νεκρά τρωκτικά, μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. (Επαγγελματίες χρήστες).</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας: Έως 100 g Αριθμός δολωματικών σταθμών ή/και ανταλλακτικών ανά δοχείο: Έως 100 g Γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό ή/και αναπλήρωση: τεμάχια των 10-20 g. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες κατά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα είναι αποδεκτό, για άθικτους δολωματικούς σταθμούς και για απομάκρυνση νεκρών τρωκτικών. Επαναγεμίστε τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται. Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών. Βλέπε ενότητα 5.1.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος δοχείου: Έως 300 g Αριθμός δολωματικών σταθμών ή/και ανταλλακτικών ανά δοχείο: Έως 300 g. Γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό ή/και αναπλήρωση: τεμάχια με 10-20 g δολώματος. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα είναι αποδεκτό, για άθικτους δολωματικούς σταθμούς και για απομάκρυνση νεκρών τρωκτικών. Επαναγεμίστε τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.
Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Αρouraίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Εξωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 5 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας: Έως 300 g Αριθμός δολωματικών σταθμών ή/και ανταλλακτικών ανά δοχείο: Έως 300 g. Γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό ή/και αναπλήρωση: τεμάχια των 10-20 g . Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τοποθετήστε το δολωματικό σταθμό σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες. Αντικαταστήστε τα δολώματα που έχουν υποστεί ζημιά από το νερό ή έχουν μολυνθεί από βρωμιά. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα είναι αποδεκτό, για άθικτους δολωματικούς σταθμούς και για απομάκρυνση νεκρών τρωκτικών. Επαναγεμίστε τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες χρήσης

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Οικιακοί ποντικοί – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός μεμονωμένων σακουλών ανά δοχείο: Έως 25 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά σακούλα: τεμάχια των 10-20 g. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της θεραπείας.
Ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.
Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία ή του περιβάλλοντός της) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών πριν από τη θεραπεία.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείσιμο τρυπών, αφαιρέστε τρόφιμα και ποτά όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση #5 – Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο

	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός μεμονωμένων σακουλών ανά δοχείο: Έως 25 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά σακούλα: τεμάχια των 10-20 g. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της θεραπείας.
Ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.
Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία ή του περιβάλλοντός της) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών πριν από τη θεραπεία.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείσιμο τρυπών, αφαιρέστε τρόφιμα και ποτά όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.
Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Οικιακοί ποντικοί και/ή Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό με τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ακμαία και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Εξωτερικοί χώροι

	Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποντίκια: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ποντίκια: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Αριθμός μεμονωμένων σακουλών ανά δοχείο: Έως 25 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά σακούλα: τεμάχια των 10-20 g. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε τα δολώματα από ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ.: βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τον δολωματικό σταθμό σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε τα δολώματα που έχουν υποστεί ζημιά από το νερό ή έχουν μολυνθεί από βρωμιά.

Αφαιρέστε το υπολοιπόμενο προϊόν στο τέλος της θεραπείας.

Ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία ή του περιβάλλοντός της) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών πριν από τη θεραπεία.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείσιμο τρυπών, αφαιρέστε τρόφιμα και ποτά όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την ανίχνευση δραστηριότητας τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε λαγούμια.

Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικό κανάλι/τάφρος) ή συστήματα αποστράγγισης νερού διασφαλίζουν ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Δείτε επίσης Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό

Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων, συνιστάται η χρήση μη χημικών μεθόδων (π.χ. παγίδες). Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι άμεσα διαθέσιμα στα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την περιοχή που θα περιπτοιηθείτε λίγο πριν από τη θεραπεία, αυτό θα ενοχλήσει μόνο τα τρωκτικά και η αποδοχή του δολώματος θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε μέρη όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (περιοχές πεζοπορίας, θέσεις φωλεοποίησης, τροφοδότες, τρύπες, λαγούμια...) Όπου είναι δυνατόν, ο δολωματικός σταθμός πρέπει να στερεώνεται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου τρόφιμα/ζωοτροφές, ποτά, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων μπορεί να έρθουν σε επαφή ή να μολυνθούν από το προϊόν.

Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου το δόλωμα μπορεί να έρθει σε επαφή με το νερό.

Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος μετά τη χρήση του προϊόντος.

Αφαιρέστε το υπολείπόμενο δόλωμα και το δολωματικό σταθμό στο τέλος της θεραπείας.

Επαγγελματίες χρήστες

Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

Διεξάγετε μια έρευνα πριν από τη θεραπεία της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση για τον εντοπισμό των ειδών τρωκτικών, των περιοχών δραστηριότητάς τους και τον προσδιορισμό της αιτίας και της έκτασης της προσβολής.

Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι άμεσα διαθέσιμα στα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την περιοχή που θα περιπτοιηθείτε λίγο πριν από τη θεραπεία, αυτό θα ενοχλήσει μόνο τα τρωκτικά και η αποδοχή του δολώματος θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε μέρη όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (περιοχές πεζοπορίας, σημεία φωλεοποίησης, τροφοδότες, τρύπες, λαγούμια...).

Όπου είναι δυνατόν, ο δολωματικός σταθμός πρέπει να στερεώνεται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να υποδεικνύει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (Βλ. ενότητα 5.3. για να δείτε τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα).

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση πρέπει να ενημερώνει για τον κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικά καθώς και μέτρα πρώτων βοηθειών.

Τα δολώματα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για να μην σύρονται έξω από τον δολωματικό σταθμό.

Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου τρόφιμα/ζωοτροφές, ποτά, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων μπορεί να έρθουν σε επαφή ή να μολυνθούν από το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες κατά τη φάση χειρισμού (το υλικό γαντιών πρέπει να παρέχεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος μετά τη χρήση του προϊόντος.

Η συχνότητα των επισκέψεων στις υπό θεραπεία περιοχές θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του εφαρμογέα, δυνάμει των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της θεραπείας. Αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι συνεπής με τις συστάσεις που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Εάν η ποσότητα του δολώματος που καταναλώνεται είναι χαμηλή σε σχέση με το προφανές μέγεθος της προσβολής, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι δολωματικοί σταθμοί και η πιθανότητα μετάβασης σε άλλη σύνθεση δολώματος.

Εάν μετά από περίοδο θεραπείας 35 ημερών παρατηρηθεί ότι τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και η δραστηριότητα των τρωκτικών δεν μειώνεται, πρέπει να προσδιοριστεί η αιτία. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα στοιχεία, η χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί για ανθεκτικά τρωκτικά. Η χρήση παγίδων θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. στεγανοποιήστε τρύπες, αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Αφαιρέστε το υπολοιπόμενο δόλωμα και τον δολωματικό σταθμό στο τέλος της θεραπείας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ευρύ κοινό

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. στεγανοποιήστε τρύπες, αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την ανίχνευση δραστηριότητας τρωκτικών.

Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο) πρέπει να αναφέρουν σαφώς:

- Το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση (π.χ.: "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση").

- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν επαρκώς τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα 5.3. του SPC (π.χ.: «επισημάνετε τους δολωματικούς σταθμούς σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) θα πρέπει να συνιστούν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος της θεραπείας (π.χ. η δραστηριότητα τρωκτικών εξακολουθεί να παρατηρείται) ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει σε μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.

Βρείτε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις δημοτικές διατάξεις.

Επαγγελματίες χρήστες

Όπου είναι δυνατόν, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών πριν από τη θεραπεία (σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει).

Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο) θα υποδεικνύουν σαφώς ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες. (π.χ.: «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»).

Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης προσβολής και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας (εκτός εάν επιτρέπεται μόνιμη δόλωση).

Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών δραστικών ουσιών με συγκρίσιμες ή χαμηλότερες ιδιότητες για τον σκοπό της διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Εάν εναλλάσσονται, σκεφτείτε τη χρήση μη αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, εάν υπάρχουν, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

Μην πλένετε τον δολωματικό σταθμό ή άλλα σκεύη που χρησιμοποιούνται στα καλυμμένα ή προστατευμένα σημεία δολώματος με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η αποτέφρωση συνιστάται ως μέθοδος θεραπείας.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν εμφανή μέσα σε 72 ώρες. Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη και τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Αντίδοτο: Η βιταμίνη Κ1 χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση :

- Δερματικής έκθεσης : πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.
- Οφθαλμικής έκθεσης: ελέγχετε πάντα αν υπάρχουν φακοί επαφής και αφαιρέστε τους, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό για τα μάτια ή νερό, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Στοματικής έκθεσης: ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή, κρατήστε την ετικέτα ή το δοχείο κοντά σας και συμβουλευτείτε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (τηλέφωνο 210 77 93 777). Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε και μην ανοίγετε". «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης»· «δραστική ουσία(ές)»· «σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (τηλέφωνο 210 77 93 777)».

Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.

Ευρύ κοινό

- Στο τέλος της επεξεργασίας, απορρίψτε το μη καταναλωμένο δόλωμα και τη συσκευασία του προϊόντος ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοτικών διατάξεων.

Στην ετικέτα των κατόχων δολωμάτων αναγράφονται τα ακόλουθα:

- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοτικών διατάξεων.

Επαγγελματίες χρήστες

- Στο τέλος της επεξεργασίας, απορρίψτε το μη καταναλωμένο δόλωμα και τη συσκευασία του προϊόντος μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Η αποτέφρωση συνιστάται ως θεραπευτική μέθοδος.

Στην ετικέτα των κατόχων δολωμάτων αναγράφονται τα ακόλουθα:

- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν 4-10 ημέρες για να γίνουν αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση δολώματος.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιήστε γάντια ή σκεύη όπως τσιμπιδάκια για απόρριψη.

Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.

Δεδομένα που απαιτούνται μετά την εξουσιοδότηση:

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει τις Αρμόδιες Αρχές πριν από την επόμενη ανανέωση του προϊόντος για οποιοδήποτε περιστατικό που υποπτεύεται ότι έχει συμβεί σε άγρια ζώα, κατοικίδια ζώα ή ζώα που μπορεί να έχει προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται από κτηνιατρικές κλινικές, ΜΚΟ προστασίας των ζώων ή καταγγελίες πολιτών.