

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

BROS – momeala raticida sub forma de pasta

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2019/0088/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-00109

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0008461-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	BROS PASTĂ RATICIDĂ BROS -MOMEALA RATICIDA SUB FORMA DE P ASTA
--------------------------------	--

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea #i adresa de#inătorului autoriza#iei	Denumire	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresă	Karpia 24 61-619 Poznan Polonia
Numărul autoriza#iei		RO/2019/0088/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-0 0109
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0008461-0000
Data autoriza#iei		30/10/2013
Data de expirare a autoriza#iei		31/12/2026

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C.Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Sp ania
Adresa locurilor de produc#ie	C.Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Denumirea producătorului	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresa producătorului	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia
Adresa locurilor de produc#ie	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Polonia

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substan#ă activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C.Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Sp ania
Adresa locurilor de produc#ie	C.Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Substan#ă activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	Dr Tezza S.r.L.
Adresa producătorului	Via Tre Ponți, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia
Adresa locurilor de produc#ie	Via Tre Ponți, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,0029 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

XX Altele: gata de utilizare: pastă

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) în caz de expunere prelungită sau repetată {1:indica#i calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol:}.
Fraze de precau#ie	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citi#i cu aten#ie #i urma#i toate instruc#iunile. P280: Purta#i mănuși de protecție. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Arunca#i conținutul la un centru autorizat pentru colectarea de#eurilor.. P501: Arunca#i recipientul la un centru autorizat pentru colectarea de#eurilor..

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Utilizare #1 - Șoareci de casă și șobolani bruni- Publicul larg - în interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: altele: #oareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #oareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică #i 10 m în caz de infestare slabă). #obolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică #i 10 m în caz de infestare slabă). Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioni#ti)
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea maximă a ambalajului: 150 g Numar de cutii de momeală #i / sau rezerve pe pachet: până la 150 g. Grame de momeală/ kg de momeală: plicule#e individuale de la 10 până la 20 g. Tip de ambalaj: pungi, găle#i sau cutii de carton Material de ambalaj: cutii din PE sau PP sau HDPE sau hârtie tip kraft.

--	--

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Monitorizați cutiile pentru momeală și consumul de momeală; realimentați cutiile și îndepărtați rozătoarele moarte cel puțin o dată la 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv o dată la 5-7 zile (în cazul șobolanilor), iar după aceea cel puțin o dată pe săptămână.

- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea secțiunea 5.2

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

a se vedea secțiunea 5.3

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Utilizare #2 - Șobolani bruni - Publicul larg - În exterior, în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Dimensiunea maximă a ambalajului: 150 g Număr de cutii de momeală și / sau rezerve pe pachet: până la 150 g. Grame de momeală/ kg de momeală: pliculele individuale de la 10 până la 20 g.

	Tip de ambalaj: pungi, găle#i sau cutii de carton Material de ambalaj: cutii din PE sau PP sau HDPE sau hârtie tip kraft.
--	--

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Când utiliza#i produsul în jurul clădirilor, proteja#i momeala de condi#iile meteo, pozi#iona#i-l în zone care nu sunt susceptibile de a fi inundate, monitoriza#i cutiile pentru momeală #i înlocui#i momeala contaminată #i deteriorată de apă.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte #i pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumple#i cu momeală, dacă este necesar.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea sec#iunea 5.2

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

a se vedea sec#iunea 5.3

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Utilizare #3 - Șoareci de casă - Uz profesional - în interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de cutii de momeală #i / sau rezerve pe pachet: până la 10 kg. Grame de momeală/ kg de momeală: plicule#e individuale de la 10 până la 20 g. Tavi din plastic pre-umplute de 60 g Tuburi de 60 pana la 600g pentru aplicarea cu pistolul de stemuire</p> <p>Tip de ambalaj: pungi, găle#i sau cutii de carton Material de ambalaj: cutii din PE sau PP sau HDPE sau hârtie tip kraft.</p>

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate la cel pu#in 2-3 zile la începutul tratamentului și cel pu#in săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Re-umple#i cu momeală dacă este necesar.
- Respecta#i orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea sec#iunea 5.2

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasa#i cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Utilizare #4 - Șobolani bruni - Uz profesional - în interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă).

	Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de cutii de momeală #i / sau rezerve pe pachet: până la 10 kg. Grame de momeală/ kg de momeală: plicule#e individuale de la 10 până la 20 g. Tavi din plastic pre-umplute de 100 g Tuburi de 50 pana la 600g pentru aplicarea cu pistolul de stemuire Tip de ambalaj: pungi, găle#i sau cutii de carton Material de ambalaj: cutii din PE sau PP sau HDPE sau hârtie tip kraft.

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte #i pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumple#i cu momeală, dacă este necesar.
- Respecta#i orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea sec#iunea 5.2

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasa#i cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea sec#iunea 5.4

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea sec#iunea 5.5

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5. Utilizare #5 - Șobolani bruni - Uz profesional - În exterior, în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: #bolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă).</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare: -</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Marimea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de pungi ambalate per ambalaj: până la 10 kg. Grame de momeală/ kg de momeală: pliculele individuale de la 10 până la 20 g. Tavi din plastic pre-umplute de 100 g Tuburi de 50 pana la 600g pentru aplicarea cu pistolul de stemuire</p> <p>Tip de ambalaj: pungi, găle și sau cutii de carton</p> <p>Materiale de ambalare: saci, găle și sau cutii de carton din polietilenă (PE), polipropilenă (PP), polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și hârtie kraft.</p>

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici (de ex.. Ploaie, zăpadă, etc). Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Înlocuiți orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

4.5.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanuri, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.6. Descrierea utilizării

Tabel 6. Utilizare #6 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - în interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte

	Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: alte: #oareci de casă Etapă de dezvoltare: alte: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: alte: Aplicare momeală Descriere detaliata: - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.- Puncte pentru momeală acoperite #i protejate
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală; #oareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală Diluire (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de pungi ambalate per ambalaj: până la 10 kg.

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărta#i produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respecta#i orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

4.6.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informa#i persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . #i ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Lua#i în considerare măsuri preventive (de ex. astupa#i găurile, îndepărta#i poten#ialele surse de mâncare #i apă pe cât posibil) pentru a îmbunătă#i aportul de momeală #i reducerea posibilită#ii de repara#ie a invaziei.

- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Folosiți acest produs doar în interior și în spații inaccesibile pentru copii sau animale non-#intă.

4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.7. Descrierea utilizării

Tabel 7. Utilizare #7 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - În exterior, în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte</p> <p>Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: altele: #oareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte</p>
Domeniul (domeniile) de utilizare	<p>utilizare în exterior</p> <p>În exterior, în jurul clădirilor</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: altele: Aplicare momeală</p> <p>Descriere detaliata: - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.- Puncte pentru momeală acoperite #i protejate</p>
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	<p>Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală; #oareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare: -</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#ti
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de pungi ambalate per ambalaj: până la 10 kg.</p>

4.7.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Proteja#ti momeala de ac#iunea factorilor atmosferici. Plasa#ti punctele pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocui#ti orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de ac#iunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Îndepărta#ti produsul rămas la finalul tratamentului.
- Punctele pentru momeală trebuie ancorate #i plasate în pozi#ii strategice pentru a minimiza expunerea la specii nevizate.
- Respecta#ti orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#ti mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

4.7.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.7.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, anuri, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.7.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.7.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.8. Descrierea utilizării

Tabel 8. Utilizare #8 - Șobolani bruni - Uz profesional instruit - Zone exterioare deschise și gropi de gunoi

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: altele: #obolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior Zone exterioare deschise #i gropi de gunoi
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.- Puncte pentru momeală acoperite #i protejate
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală. Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de pungă ambalate per ambalaj: până la 10 kg.

4.8.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Proteja#i momeala de ac#iunea factorilor atmosferici. Plasa#i cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocui#i orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de ac#iunea apei sau contaminată de reziduuri.

-
- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
 - Punctele pentru momeală trebuie ancorate și plasate în poziții strategice pentru a minimiza expunerea la specii nevizate.
 - Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
 - Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

4.8.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.8.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.8.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.8.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.9. Descrierea utilizării

Tabel 9. Utilizare #9 - Șobolani bruni - Uz profesional instruit - Canalizări

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior Canalizări
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: - Momeală gata de utilizare, ancorată #i aplicată în cutii cu momeală, împiedică momeala să intre în contact cu apa reziduală. - Puncte pentru momeală acoperite #i protejate
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g pe deschidere Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg. Numar de pungi ambalate per ambalaj: până la 10 kg.

4.9.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Momeala trebuie plasată în a#a fel încât să nu ia contact cu apa #i să nu fie îndepărtată de aceasta

-
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
 - Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

4.9.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Plasați momeala doar în sisteme de scurgere care sunt conectate la rețeaua de canalizare și tratare a apei
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.

4.9.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

a se vedea secțiunea 5.3

4.9.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.9.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Utilizare generală

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Înainte de utilizarea rodenticidelor, mai întâi aplicați metode non- chimice (de ex. capcane) .
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Nu deschideți pliculețele cu momeală.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă șinta momelii.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Nu plasați cutiile cu momeală lângă scurgeri unde acestea pot intra în contact cu apa.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.
- Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în pânza freatică.
- Se schimbă poziția punctelor de momeală neconsumate. Perioada de tratament poate fi considerată completă când momelile rămân neconsumate.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

Uz profesionist

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca și componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și avertiza că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă șinta momelii.
- Plasați produsul în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în pânza freatică.
- Se schimbă poziția punctelor de momeală neconsumate. Perioada de tratament poate fi considerată completă când momelile rămân neconsumate.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.
- Atunci când utiliza#i produsul nu mânca#i, nu be#i #i nici nu fuma#i. Spăla#i mâinile #i alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Dacă cantitatea de aport de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare amplasarea mai multor cutii pentru momeală #i posibilitatea de a trece la o altă formulă de momeală.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată #i nu este aparentă o scădere a activită#ii rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare #i folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Îndepărta#i momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.
- Nu deschide#i plicule#ele care con#in momeală

Uz profesionist instruit

- Citi#i #i urma#i instruc#iunile de utilizare #i prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfă#ura#i o inspec#ie pre-momeală a zonei infestate #i o evaluare a loca#iei pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de activitate #i pentru a determina cauza #i amplitudinea infestării.
- Îndepărta#i mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăun#e vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu cură#a#i aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează popula#ia de rozătoare #i face acceptarea momelii mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca #i componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre altele măsuri de igienă #i unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea con#in rodenticide #i a avertiza că nu trebuie mutate sau deschise (vezi sec#iunea 5.3 pentru informa#iile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu momeală #i măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasa#i produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă #inta momelii.
- Plasa#i produsul pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar #i departe de ustensilele sau suprafe#ele care pot intra în contact cu hrana sus-men#ionată.
- Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafa#ă, în sistemele de canalizare sau în pânza freatică.
- Se schimbă pozi#ia punctelor de momeală neconsumate. Perioada de tratament poate fi considerată completă când momelile rămân neconsumate.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.
- Atunci când utiliza#i produsul nu mânca#i, nu be#i #i nici nu fuma#i. Spăla#i mâinile #i alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Frecven#a vizitelor în zona tratată este stabilită de operator, luând în considerare inspec#ia desfă#urată la începutul tratamentului. Frecven#a trebuie să fie consecventă cu recomandările oferite de codul de bune practici.
- Dacă cantitatea de aport de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare amplasarea mai multor cutii pentru momeală #i posibilitatea de a trece la o altă formulă de momeală.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată #i nu este aparentă o scădere a activită#ii rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare #i folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Nu deschide#i plicule#ele care con#in momeală

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Utilizare generală

- Utilizarea lor trebuie evitată în zonele în care există semne de rezistență la ingredientul activ.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
 - produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex. "utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
 - utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului (de ex.. încă se observă activitate a rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.
- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului acestea vor fi colectate și îndepărtați cel puțin de fiecare dată când se verifica suporturile de momeală;
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

Uz profesionist

- Utilizarea lor trebuie evitată în zonele în care există semne de rezistență la ingredientul activ.
- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, (cel puțin de două ori pe săptămână)
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați anticoagulantul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
 - produsul nu va fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru uz profesionist").
 - produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex. "utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
 - utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului (de ex.. încă se observă activitate a rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.
- Nu spălați cu apă cutiile pentru momeală între aplicații.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

Uz profesionist instruit

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar că produsul va fi furnizat doar pentru utilizare profesionistă - profesioniști care dețin o certificare care este în conformitate cu cerințele aplicabile de instruire (respectiv, „doar pentru profesioniști instruiți”).
- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistența la substanța activă.
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați alternativ diferiți anticoagulanți cu putere comparabilă sau mai slabă, din motive de rezistență. Pentru tratament alternativ, luați în considerare un rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.

-
- Nu spăla#i cu apă între utilizări cutiile pentru momeală sau ustensilele care se utilizează pentru cutiile acoperite sau protejate între aplica#ii.
 - îndepărta#i cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. La ingerare, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot include sângerări nazale și gingivale. În cazurile severe, pot apărea echimoze și prezența sângelui în urină sau fecale.
- Antidot: Vitamina K1 administrată doar de personal medical sau veterinar.
- În caz de:
 - Contact cu pielea, spăla#i cu apă și apoi cu apă și săpun.
 - Contact cu ochii, verifica#i întotdeauna dacă există lentile de contact și îndepărta#i-le, clăti#ii ochii cu lichid de clătire sau cu apă, păstra#i pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
 - Contact bucal, clăti#i gura cu apă, cu aten#ie. Nu administra#i produse pe cale orală unei persoane care și-a pierdut cunoștin#ă. Nu provoca#i vomă. În caz de înghi#ire, consulta#i imediat medicul, și prezenta#i ambalajul sau eticheta produsului. Telefon de urgență: +40 - 021 318 36 06. Consulta#i un chirurg veterinar la ingerarea de către animale de companie.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate cu următoarele informa#ii: "nu muta#i și nu deschide#i"; "conține rodenticid"; "denumire comercială sau număr autoriza#ie "; "substanță/ e activă/ e" și "în caz de accident, contacta#i un centru toxicologic +40 - 021 318 36 06"
- Periculos pentru fauna

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid. Ambalajele, resturile de produs, cutiile pentru momeală folosite și rozătoarele moarte trebuie eliminate ca de#euri periculoase în conformitate cu legisla#ia locală. Datorită riscului de boli transmise de rozătoare, evita#i contactul cu pielea, utiliza#i mănu#i sau unelte.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

- Produsul se va păstra în ambalajul original, închis etan#, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat, sigur și inaccesibil copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și animalelor care nu sunt specii #intă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare. Proteja#i de lumina directă. Nu depozita#i împreună cualimente, băuturi sau furaje.
- Durata de via#ă la raft: doi ani

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Datorită acțiunii întârziate, rodenticidele cu anticoagulant sunt eficiente la 4 până la 10 zile de la consumarea momelii.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente cum ar fi cleștii pentru preluarea acestora.
- Acest produs conține un agent amar și un colorant.

Cerințe post-autorizare:

- Test de stabilitate pe termen lung în termen de 2 ani.

Etichetarea produsului completă mai jos:

GHS08

Atenție

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) în caz de expunere prelungită sau repetată.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P280 Purtați mănuși de protecție.

P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor.

.