

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Notrac Blox

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0028260-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0028260-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Contrac Blox Tomcat Super Size Blox Tomcat Blox Hawk Blox Notrac Blox Hawk Super Size Blox Notrac Super Size Blox Notrac Super Size Wax Block Bait Notrac Wax Block Bait Contrac Super Size Blox
--------------	---

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Bell Laboratories Netherlands B.V.
	Naslov	De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam drugo: Netherlands
Številka dovoljenja	SI-0028260-0000	
Številka proizvoda v R4BP	SI-0028260-0000	
Datum dovoljenja	11/04/2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	01/07/2025	

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Bell Laboratories Inc
Naslov proizvajalca	6501 N Towne Rd WI 53598 Windsor Združene države
Kraj proizvodnih obratov	6501 N Towne Rd WI 53598 Windsor Združene države

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Bromadiolon
Ime proizvajalca	Bell Laboratories Inc
Naslov proizvajalca	6501 N Towne Rd WI 53598 Windsor Združene države
Kraj proizvodnih obratov	6501 N Towne Rd WI 53598 Windsor Združene države

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	aktivna snov	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku. H372: Škoduje organom krvi pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.
Previdnostni stavki	P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško oskrbo. P405: Hraniti zaklenjeno.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Uporaba št. 1 - Hišne miši in/ali podgane - poklicni uporabniki - notranjost objektov

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni potrebno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Glejte spodaj Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Uporaba proti podganam: Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 5 do 10 metrov Uporaba proti mišim: 5–28 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 2 do 4 metre
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Najmanjša velikost paketa 3 kg: Posamezni 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 50 g, 28 g, 100 g, 150 g in 225 g zaviti v vedru iz polietilena visoke gostote (High Density Poly Ethylene – HDPE), kartonski škatli, škatla iz lepenke ali plastična vrečka iz polietilena s tesnilom – 3 do 25 kg.

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Miši: Postaje za vabe morate preverjati vsaj na 2 do 3 dni ob začetku uporabe in nato vsaj enkrat na

teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

- Podgane: Postaje za vabe morate preverjati na samo 5 do 7 dni po začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte odsek 5.2

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte 2.5.4

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte 2.5.5

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Uporaba št. 2 - Hišne miši in/ali podgane - usposobljeni strokovnjaki - notranjost objektov

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni potrebno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje - Pokrita in zaščitena mesta za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Glejte spodaj Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Uporaba proti podganam: Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 5 do 10 metrov Uporaba proti mišim: 5–28 g na posamezno vabo na mestu za vabo po intervalih 2 do 4 metre
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Najmanjša velikost paketa 3 kg: Posamezni 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 50 g, 28 g, 100 g, 150 g in 225 g zavitki v vedru iz polietilena visoke gostote (High Density Poly Ethylene – HDPE), kartonski škatli, škatla iz lepenke ali plastična vrečka iz polietilena s tesnilom – 3 do 25 kg.

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
- Ta izdelek ni namenjen za večkratno enkratno uporabo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte 2.5.4

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte 2.5.4

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Uporaba št. 3 - Miši in/ali podgane - poklicni uporabniki - zunanost okoli objektov

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni potrebno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunanost okoli objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Glejte spodaj Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Uporaba proti podganam: Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 5 do 10 metrov Uporaba proti mišim: 5–28 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 2 do 4 metre
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Najmanjša velikost paketa 3 kg: Posamezni 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 50 g, 28 g, 100 g, 150 g in 225 g zavitki v vedru iz polietilena visoke gostote (High Density Poly Ethylene – HDPE), kartonski škatli, škatla iz lepenke ali plastična vrečka iz polietilena s tesnilom – 3 do 25 kg.

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabo zaščitite pred vremenskimi pogoji (npr. dežjem, snegom itd.). Postaje za vabe namestite na področja, kjer ni nevarnosti za poplave.

-

Miši: Postaje za vabe morate preverjati vsaj na 2 do 3 dni ob začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.

-
-
- Podgane: Postaje za vabe morate preverjati na samo 5 do 7 dni po začetku uporabe in nato vsaj enkrat na teden, da preverite, če je bila vaba sprejeta, ali so postaje za vabe nedotaknjene in za odstranitev trupel glodavcev. Po potrebi znova napolnite vabo.
- V postajah za vabe zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
 - *[Kadar so na voljo]* Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju mest za vabe v bližini sistemov za odvajanje vode zagotovite, da ne pride do stika vab z vodo.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte 2.5.4

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte 2.5.5

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Uporaba št. 4 - Miši in/ali podgane - usposobljeni strokovnjaki - zunanost okoli objektov

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni potrebno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunanost okoli objektov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje - Pokrita in zaščitena mesta za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Glejte spodaj Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Uporaba proti podganam: Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 5 do 10 metrov Uporaba proti mišim: 5–28 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 2 do 4 metre Trajne vabe (podgane): Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Najmanjša velikost paketa 3 kg: Posamezni 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 50 g, 28 g, 100 g, 150 g in 225 g zavitki v vedru iz polietilena visoke gostote (High Density Poly Ethylene – HDPE), kartonski škatli, škatla iz lepenke ali plastična vrečka iz polietilena s tesnilom – 3 do 25 kg.

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe zaščitite pred vremenskimi pogoji. Za nameščanje vab izberite področja, kjer ni nevarnosti za poplave.
- Zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
- Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka
- Pri zunanji uporabi morate postaje za vabe pokriti in namestiti na strateška mesta za čim manjšo izpostavljenost neciljnim vrstam
- Kjer je mogoče, je priporočeno, da področje znova preverite na vsaj 4 tedne, da preprečite selekcijo odpornih populacij
- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte prisotnost in odstranjajte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
- Ta izdelek ni namenjen za večkratno enkratno uporabo.
- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.
- Uporaba trajnih vab je strogo omejena na mesta z visoko možnostjo povratka škodljivcev, ko se drugi načini nadzora izkažejo za nezadostne
- Pri strategiji trajnih vab morate izvajati redne preglede v smislu integriranega upravljanja škodljivcev in ocene tveganja za povratek škodljivcev

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju vab v bližini površinskih voda (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, nasipov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode preprečite stik z vodo.

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte 2.5.4

4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte 2.5.5

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Uporaba št. 5 – Podgane – usposobljeni strokovnjaki – odprta zunanja območja in odlagališča odpadkov

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni potrebno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Odprta zunanja območja in odlagališča odpadkov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: - Vaba, pripravljena na uporabo v postajah za vabe, ki so odporne na odpiranje - Pokrita in zaščitena mesta za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Glejte spodaj Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Uporaba proti podganam: Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo v intervalih 5 do 10 metrov Trajne vabe (podgane): Do 225 g na posamezno vabo na mestu za vabo

Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Najmanjša velikost paketa 3 kg: Posamezni 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 50 g, 28 g, 100 g, 150 g in 225 g zavitki v vedru iz polietilena visoke gostote (High Density Poly Ethylene – HDPE), kartonski škatli, škatla iz lepenke ali plastična vrečka iz polietilena s tesnilom – 3 do 25 kg.

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe zaščitite pred vremenskimi pogoji. Za nameščanje vab izberite področja, kjer ni nevarnosti za poplave.
- Zamenjajte vse vabe, ki so bile poškodovane z vodo ali onesnažene z umazanijo.
- Ob koncu obdobja uporabe odstranite ostanke izdelka
- Pri zunanji uporabi morate postaje za vabe pokriti in namestiti na strateška mesta za čim manjšo izpostavljenost neciljnim vrstam
- Kjer je mogoče, je priporočeno, da področje znova preverite na vsaj 4 tedne, da preprečite selekcijo odpornih populacij
- [Kadar so na voljo] Upoštevajte vsa dodatna navodila v veljavnih kodeksih za najboljše prakse

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite (npr. uporabnike na področju uporabe in bližnji okolici) o izvajanju nadzora glodavcev [v skladu z morebitnimi veljavnimi kodeksi za najboljše prakse].
- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev med uporabo vab v rednih intervalih preverjajte in odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili v zadevnem kodeksu za najboljše prakse.
- Ta izdelek ni namenjen za večkratno enkratno uporabo.
- Tega izdelka ne nastavljajte naravnost v brloge.
- Uporaba trajnih vab je strogo omejena na mesta z visoko možnostjo povratka škodljivcev, ko se drugi načini nadzora izkažejo za nezadostne
- Pri strategiji trajnih vab morate izvajati redne preglede v smislu integriranega upravljanja škodljivcev in ocene tveganja za povratek škodljivcev

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju vab v bližini površinskih voda (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, nasipov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode preprečite stik z vodo.

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte 2.5.4

4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte 2.5.5

4.6. Opis uporabe

Tabela 6. Uporaba št. 6 – Podgane – usposobljeni strokovnjaki – kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni potrebno za rodenticide
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	drugo: Other Kanalizacija
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: - Vaba, pripravljena na pritrditev ali uporabo v stacionarnih postajah za vabe, s čimer preprečite stik vabe z odpadnimi vodami. - Pokrita in zaščitena mesta za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Glejte spodaj

	<p>Redčenje (%): 0</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p>Do 225 g na vstopno odprtino v kanal</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>Najmanjša velikost paketa 3 kg: Posamezni 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 50 g, 28 g, 100 g, 150 g in 225 g zavitki v vedru iz polietilena visoke gostote (High Density Poly Ethylene – HDPE), kartonski škatli, škatla iz lepenke ali plastična vrečka iz polietilena s tesnilom – 3 do 25 kg.</p>

4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe morate namestiti tako, da ne pridejo v stik z vodo in jih voda ne more odplaviti.

4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.6.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ta izdelek ni namenjen za večkratno enkratno uporabo.

4.6.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte odsek 2.5.3

4.6.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte 2.5.4

4.6.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte 2.5.5

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Usposobljeni strokovni uporabniki

- Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije o izdelku in vse spremne informacije, ki jih prejmete z izdelkom ali na mestu nakupa.
- Pred nameščanjem vab izvedite ogled infestiranega območja in oceno na terenu, da identificirate vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določite verjetni razlog in obseg infestacije.
- Odstranite hrano, ki je dosegljiva glodavcem (npr. raztroseno zrnje ali odpadki hrane). Razen tega ne izvajajte čiščenja infestiranega območja tik pred nameščanjem vab, ker s tem samo zmotite populacijo glodavcev in otežite sprejem vab.
- Izdelek lahko uporabljate samo kot del integriranega sistema upravljanja škodljivcev, vključno s higienskimi ukrepi in, kjer je mogoče, s fizičnimi načini nadzora.
- Izdelek morate namestiti v neposredno bližino območij, kjer ste opazili aktivnost glodavcev (npr. poti gibanja, legla, mesta hranjenja, luknje, brlogi itd.).
- Kjer je mogoče, morate postaje za vabe pritrditi na tla ali druge strukture.
- Postaje za vabe morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in premikanje ali odpiranje postaj ni dovoljeno (glejte odsek 5.3 za seznam informacij, ki morajo biti navedene na oznaki).
- Vaba mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odvreči iz postaje za vabo.
- Izdelek namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih ljubljencev in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Izdelka ne nameščajte v bližini hrane, pijače in krme za živali ter tudi pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Med rokovanjem z izdelkom nosite zaščitne kemično odporne rokavice (material rokavic določi imetnik pooblastila, ki je naveden v informacijah o izdelku).
- Med uporabo izdelka ne smete jesti, piti ali kaditi. Po uporabi izdelka si umijte roke in neposredno izpostavljeno kožo.
- Pogostost obiskov na območju uporabe določi izvajalec v skladu s pregledom, ki je bil izveden ob začetku uporabe. Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili zadevnega kodeksa najboljših praks.
- Če je uživanje vab nizko v primerjavi z velikostjo infestacije, premislite o spremembi mest uporabe vab in o možnosti spremembe formulacije vab.
- Če po pretečenem obdobju uporabe 35 dni škodljivci vabe še vedno zauživajo in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če izločite vse ostale elemente, je najbolj verjetno, da so prisotni odporni glodavci, zato premislite o uporabi rodenticidov brez antikoagulacijskega učinka, kjer je to mogoče, ali o uporabi rodenticida z močnejšim antikoagulacijskim učinkom. Premislite tudi o uporabi pasti, kot alternativnemu ukrepu za nadzor.

Strokovni uporabniki

- Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije o izdelku in vse spremne informacije, ki jih prejmete z izdelkom ali na mestu nakupa.
- Pred nameščanjem vab izvedite ogled infestiranega območja in oceno na terenu, da identificirate vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določite verjetni razlog in obseg infestacije.
- Odstranite hrano, ki je dosegljiva glodavcem (npr. raztroseno zrnje ali odpadki hrane). Razen tega ne izvajajte čiščenja infestiranega območja tik pred nameščanjem vab, ker s tem samo zmotite populacijo glodavcev in otežite sprejem vab.
- Izdelek lahko uporabljate samo kot del integriranega sistema upravljanja škodljivcev, vključno s higienskimi ukrepi in, kjer je mogoče, s fizičnimi načini nadzora.
- Razmislite o preventivnih nadzornih ukrepih (npr. zamašite luknje, prepovejte uživanje hrane in pijače, kolikor je mogoče), da izboljšate zaužitje izdelka in zmanjšate možnost povratka glodavcev.
- Postaje za vabe morate namestiti v neposredno bližino območij, kjer ste opazili aktivnost glodavcev (npr. poti gibanja, legla, mesta hranjenja, luknje, brlogi itd.).
- Kjer je mogoče, morate postaje za vabe pritrditi na tla ali druge strukture.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

- Postaje za vabe morajo biti jasno **označene**, da vsebujejo rodenticide in premikanje ali odpiranje postaj ni dovoljeno (za seznam informacij, ki morajo biti navedene na oznaki, glejte odsek 2.3 v oceni pred odobritvijo).

- [Če tako zahtevajo državni predpisi ali zakonodaja] Ko je izdelek v uporabi na javnih področjih, morajo biti mesta uporabe **označena** med obdobjem uporabe in ob vabah mora biti prikazano obvestilo z razlago nevarnosti za primarno ali sekundarno zastrupitev z antikoagulantni ter prvimi potrebnimi ukrepi v primeru zastrupitve.

- Vaba mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odvreči iz postaje za vabo.

- Izdelek namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih ljubljencev in domačih živali ter drugih neciljnih živali.

- Izdelka ne nameščajte v bližini hrane, pijače in krme za živali ter tudi pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.

- Med rokovanjem z izdelkom nosite **zaščitne kemično odporne rokavice** (material rokavic določi imetnik pooblastila, ki je naveden v informacijah o izdelku).

- Med uporabo izdelka ne smete jesti, piti ali kaditi. Po uporabi izdelka si umijte roke in neposredno izpostavljeno kožo.

- Če je uživanje vab nizko v primerjavi z velikostjo infestacije, premislite o spremembi mest uporabe vab in o možnosti spremembe formulacije vab.

- Če po pretečenem obdobju uporabe 35 dni škodljivci vabe še vedno zauživajo in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če izločite vse ostale elemente, je najbolj verjetno, da so prisotni odporni glodavci, zato premislite o uporabi rodenticidov brez antikoagulacijskega učinka, kjer je to mogoče, ali o uporabi rodenticida z močnejšim antikoagulacijskim učinkom. Premislite tudi o uporabi pasti, kot alternativnemu ukrepu za nadzor.

- Po koncu obdobja uporabe odstranite preostale vabe ali postaje za vabe.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Usposobljeni strokovni uporabniki

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite o izvajanju nadzora glodavcev- Ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja sum o odpornosti na aktivno učinkovino.- Izdelkov ni dovoljeno uporabljati več kot 35 dni brez ocene stanja infestacije in učinkovitosti uporabe vab.- Uporabe različnih antikoagulantov s primerjavo ali šibkejšo močjo ne smete rotirati za namene upravljanja odpornosti. Za rotacijo različnih sredstev razmislite o uporabi rodenticidov brez antikoagulacijskega učinka, kjer je to mogoče, ali o uporabi rodenticida z močnejšim antikoagulacijskim učinkom.- Postaj za vabe in pripomočkov v uporabi v pokritih in zaščitnih mestih za vabe ne pomivajte z vodo med različnimi obdobji uporabe.- Mrtve glodavce zavržite v skladu z lokalnimi predpisi - Zastrupljene glodavce lahko zavrže upravljavec odlagališča v sežigalniki ali na odlagališču, kjer je dovoljeno sprejemati to vrsto odpadkov, ali pa jih prevzame registrirani prevoznik odpadkov in dostavi na ustrezno dovoljeno mesto.

Trajne vabe: Uporaba trajnih vab je strogo omejena na mesta z visoko možnostjo povratka škodljivcev, ko se drugi načini nadzora izkažejo za nezadostne. Pri strategiji trajnih vab morate izvajati redne preglede v smislu integriranega upravljanja škodljivcev in ocene tveganja za povratek škodljivcev. Na mestih z uporabo trajnih vab je treba izvajati redne preglede v skladu z navodili na oznaki na izdelku. Dolžino obdobja med pregledi določi vodilni tehnik, ne smejo pa biti daljša kot 5 do 7 dni, če trajne vabe uporabljate zunaj. Pri uporabi trajnih vab upoštevajte vsa morebitna dodatna navodila v Smernicah CRRU (Campaign for Responsible Rodenticide Use – Akcija za odgovorno uporabo rodenticidov) za uporabo trajnih vab.

- Med posameznimi obdobji uporabe postaj za vabe ne pomivajte z vodo.- Mrtve glodavce zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Strokovni uporabniki

- Kjer je mogoče, morebitne prisotne osebe pred uporabo obvestite o izvajanju nadzora glodavcev.- Za zmanjšanje nevarnosti za sekundarno zastrupitev preverite in odstranjujte mrtve glodavce med uporabo vab v rednih intervalih (npr. vsaj dvakrat na teden). - Izdelkov ni dovoljeno uporabljati več kot 35 dni brez ocene stanja infestacije in učinkovitosti uporabe vab. - Vab, ki vsebujejo antikoagulacijske aktivne učinkovine, ne uporabljajte kot trajne vabe za preprečevanje infestacije glodavcev ali nadzor njihove aktivnosti. - V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ali letak) je jasno navedeno, da izdelek ni namenjen splošni javnosti (npr. »samo za strokovno uporabo«).- Pri uporabi tega izdelka bi se morali glodavcev rešiti v 35 dneh. V informacijah o izdelku (npr. oznaka in/ali letak) je jasno priporočeno, da mora uporabnik v primeru suma na nizko učinkovitost ob koncu obdobja uporabe (npr. še vedno je mogoče opaziti aktivnost glodavcev) pridobiti nasvet dobavitelja izdelka ali poklicati službo za nadzor škodljivcev.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta izdelek vsebuje antikoagulacijsko učinkovino. Pri zaužitju lahko simptomi, ki so lahko tudi zakasneni, vključujejo krvavenje iz nosu in krvaveče dlesni. V resnih primerih lahko pride do pojava modric in prisotnosti krvi v blatu ali urinu.

- Protistrup: Vitamin K1, ki ga lahko odmeri samo medicinsko/veterinarsko osebje.

- V primeru:

- Izpostavljenosti kože, kožo umijte z vodo ter nato še z vodo in milom.

- Izpostavljenosti oči, oči izperite s tekočino za izpiranje oči ali z vodo, veke imejte odprte vsaj 10 minut.

- Izpostavljenost ust, usta pazljivo izperite z vodo. Nezavestnim osebam nikoli ne dajajte ničesar v usta. Ne izzovite bruhanja. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite vsebnik izdelka ali oznako na izdelku.

Zdravstveno osebje se mora za dodatno pomoč obrniti na državni informacijski center za strupe.

Če izdelek zaužije hišni ljubljencek, se za pomoč obrnite na veterinarskega kirurga.

- Postaje za vabe morajo biti označene z naslednjimi informacijami: »ne premikajte ali odpirajte«; »vsebuje rodenticid«; »ime izdelka ali številka pooblastila«; »aktivna učinkovina« in »v primeru nesreče pokličite center za zastrupitve«.

- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Usposobljeni strokovni uporabniki

- Ob koncu obdobja uporabe nezaužite vabe in embalažo odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

- Priporočamo uporabo rokavic.

Strokovni uporabniki

- Ob koncu obdobja uporabe nezaužite vabe in embalažo odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Vsebnik hranite zaprt in zaščiten pred neposredno sončno svetlobo.

- Hranite na mestih, kjer je dostop preprečen otrokom, pticam, hišnim ljubljencem in domačim živalim.

- Rok trajanja: 3 leta

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

- Zaradi načina delovanja z zakasnitvijo, rodenticidi z antikoagulacijskim učinkom začnejo delovati 4 do 10 dni po zaužitju vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Mrtvih glodavcev se ne dotikajte z golimi rokami, pri njihovem odstranjevanju vedno nosite rokavice ali uporabljajte orodja, kot so klešče prijemale.
- Ta izdelek vsebuje sredstvo za grenitev in barvilo.
- Biocide uporabljajte varno in trajnostno
- Uporaba tega izdelka za namene ali na načine, ki niso navedeni na tej oznaki, je nezakonita.