

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Maxforce Platin

Produkto tipas (-ai)

PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5E)BPR- 571(A-18PAP453669-20-298)

R4BP objekto numeris: LT-0024957-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	MAXFORCE PLATIN
----------------------	-----------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Bayer A/S
	Adresas	Arne Jacobsen Alle 13 2300 Copenhagen S Danija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5E)BPR- 571(A-18PAP453669-20-298)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0024957-0000
Autorizacijos liudijimo data		23/07/2019
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		15/10/2024

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Bayer S.A.S.- Division Crop Science
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lionas, Cedex 09 Prancūzija
Gamybos vieta	Bayer S.A.S.- Division Crop Science site 1 Bayer SAS - Division Crop Science - Site Marle, Z.I. Antoine Laurent de Lavoisier F-02250 Marle-sur-Serre Prancūzija Bayer S.A.S.- Division Crop Science site 2 Norbert/Jacobson Co.—3060 Southpark Blvd 30294 Ellenwood, Džordžija Jungtinės Amerikos Valstijos

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas)
Gamintojo pavadinimas	Bayer AG
Gamintojo adresas	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheimas prie Reino Vokietija
Gamybos vieta	Bayer AG site 1 Bayer AG - Chempark 41538 Dormagenas Vokietija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlorianidinas)		veiklioji medžiaga	210880-92-5	433-460-1	1,026 % (masės dalis)

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikeius pakitimus. EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-onas, 5-chlor-2-metil-izotiazol-3-onas / 2-metil-izotiazol-3-onas . Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P501: turinį šalinti laikantis vietinių reikalavimų. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas, skirtas tarakonams bei pilkiesiems cukriniams žvyninukams kontroliuoti.

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Insekticidas
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: kita: Periplaneta americana Bendras pavadinimas: kita: Amerikinis tarakonas Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir nimfos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: Blatta orientalis Bendras pavadinimas: kita: Rytietiškas tarakonas Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir nimfos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: Blattella germanica Bendras pavadinimas: kita: Naminis prūsokas Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir nimfos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: Ctenolepisma longicaudatum Bendras pavadinimas: kita: Pilkieji cukriniai žvyninukai Vystymosi stadija: kita: Mišraus amžiaus populiacija</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas patalpoje</p> <p>Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas tarakonų nimfų ir suaugėlių kontrolei. Skirta naudoti: • gyvenamosiose / buitinėse patalpose; • maisto tvarkymo / laikymo patalpose; • visuomeniniuose pastatuose; • gyvūnų laikymo vietose, t. y. zoologijos soduose, naminių gyvūnų parduotuvėse, veislynuose, veterinarijos įstaigose, laboratorijose ir kt. (tik pastatuose, pašarų tvarkymo ir laikymo patalpose, išskyrus arklides, gyvūnų aptvarus ir narvus, kur laikomi gyvūnai).</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Produktas išskiriamas naudojant tinkamą švirkštą.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: 1–3 lašai x 0,1 g/m²</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Taikykite „Maxforce Platin“ lašais arba plonomis juostelėmis ant paviršių nustatytose tikslinėse zonose. Dedamas kampuose, įtrūkimuose, plyšiuose ir tuštumose. Pritaikykite dozę pagal zooparazitų paplitimo laipsnį ir rūšies tipą: Vienas lašas = 0,1 g (maždaug 7 mm skersmens); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm). Arba padėkite vieną ploną juostelę, prilygstančią vienam lašui.</p>

	<p>Prieš tarakonus: Taikomoji dozė atsižvelgiant į zooparazitų paplitimo tankį* viename m²</p> <table border="0"> <tr> <td>Mažas</td> <td>Didelis</td> </tr> </table> <p>Mažas, pvz., Naminiai prūsokai</p> <table border="0"> <tr> <td>Vienas lašas x 0,1 g</td> <td>Du lašai x 0,1 g</td> </tr> </table> <p>Didelis, pvz., Juodieji tarakonai arba amerikiniai tarakonai</p> <table border="0"> <tr> <td>Du lašai x 0,1 g</td> <td>Trys lašai x 0,1 g</td> </tr> </table> <p>Gelio masalus palikti: bent 14 dienų mažiems tarakonams, bent 4 savaites juodiesiems tarakonams, bent 12 savaičių amerikiniams tarakonams. Toks taikymas padės pasiekti geriausius rezultatus. Jei tarakonai vis dar matomi po mėnesio, pakartokite priemonės taikymą.</p> <p>Prieš pilkuosius cukrinius žvyninukus: 20 lašelių (maždaug 3 skersmens) arba 65 lašelius (maždaug 2 mm skersmens), tai atitinka 0,1 g – 0,2 g viename m² Norint gauti geriausius rezultatus, gelio masalą reikia palikti bent 8 savaites. Jei pilkieji cukriniai žvyninukai vis dar matomi po rekomenduojamo laiko intervalo, pakartokite priemonės taikymą.</p> <p>Priemonę taikykite ne dažniau kaip kartą per mėnesį.</p>	Mažas	Didelis	Vienas lašas x 0,1 g	Du lašai x 0,1 g	Du lašai x 0,1 g	Trys lašai x 0,1 g
Mažas	Didelis						
Vienas lašas x 0,1 g	Du lašai x 0,1 g						
Du lašai x 0,1 g	Trys lašai x 0,1 g						
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas						
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Kasetė ir švirškėtas, plastikiniai: PE, 10–30 g Švirškėtą galima pakartotinai uždaryti suteikiamu galiniu dangteliu (PP).						

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. 5.1 ir 6 skyrius

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

žr. 5.2 skyrių

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

žr. 5.3 skyrių

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. 5.4 skyrių

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

žr. 5.5 skyrių

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Produktas išskiriamas naudojant tinkamą gelio aplikatorių. Baigę jį naudoti, išimkite tuščią kasetę ir saugiai ją išmeskite. Jei panaudota tik dalis kasetės, išimkite ją iš aplikatoriaus, užsandarinkite galiniu dangteliu ir laikykite pagal nurodymus.

Prieš pradėdami taikyti priemonę, tinkamai išstirkite ketinamą apdoroti zoną, kad nustatytumėte zooparazitų paplitimo vietas, pvz., naudodami spąstus ir (arba) aerozolių, ieškodami išmatų, išnarų, kiaušinėlių kevalų ir t. t.

Siekiant maksimalaus efektyvumo, produktą reikia dėti zooparazitų buvimo vietose ir pakeliui prie jų maisto šaltinių. Be to, iš zooparazitų paplitimo vietos reikia pašalinti visus kitus maisto šaltinius (atliekas, maisto likučius ir t.t.), kad jie būtų skatinami vartoti gelį.

Produktą ypač rekomenduojama naudoti vietose, kur negali būti naudojami įprasti insekticidai, pavyzdžiui, šalia elektros arba elektroninių prietaisų.

Tose vietose, kur buvo nustatytas tarakonų paplitimas, rekomenduojama praplėsti produkto taikymo sritį ir padėti masalą šalia esančiose vietose, siekiant sustiprinti kontrolę bei išvengti tolesnio paplitimo.

Produktą dėkite tiksliai (lašais arba plonomis juostelėmis) uždaroje, sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, šalia kampų, įtrūkimų ir plyšių. Venkite naudoti priemonę labai dulketose, drėgnose ar riebaluotose vietose.

Padėkite masalo vietose, kurios nėra prieinamos vaikams ar naminiams gyvūnams.

Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas.

Negalima naudoti tose vietose, kurios neseniai buvo apdorotos kitais insekticidais, arba maišyti masalo su kitais insekticidais.

Galima tikėtis labai greito poveikio tarakonų populiacijai. Negyvi tarakonai turėtų būti pastebimi per 24 valandas po priemonės taikymo pradžios. Maksimalus kontrolės lygis pasiekiamas praėjus nuo šešių dienų iki 2 mėnesių po priemonės taikymo pradžios priklausomai nuo zooparazitų paplitimo lygio ir kol ant paviršių yra gelio.

Jei zooparazitai yra labai paplitę, reguliariai (kartą per mėnesį) apžiūrėkite produkto taikymo vietas ir, esant būtinybei, padėkite priemonės papildomai.

Naudojimas prieš pilkuosius cukrinius žvyninukus: padėkite daug mažų lašelių į tas vietas, kur pilkieji cukriniai žvyninukai slepiasi ir gyvena. Šios vietos gali būti po grindimis / grindjuostėmis ar už jų, po medine apdaila ir pan.

Produktas neskirtas naudoti nuolat.

Negalima naudoti gyvūnų aptvaruose ir narvuose.

Senus masalus ir (arba) gelio likučius turi pašalinti profesionalus kenkėjų kontrolės operatorius.

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE VISĄ INFORMACIJĄ.
INFORMUOKITE REGISTRACIJOS LIUDIJIMO TURĖTOJĄ, JEI TAIKYMAS NEVEIKSMINGAS.
NEGALIMA NAUDOTI ANT SUGERIANČIŲ PAVIRŠIŲ
NEDĖKITE PRODUKTO, KUR JĮ GALI PASIEKTI SAULĖS SPINDULIAI AR ŠILUMOS ŠALTINIAI
(PVZ., NEDĖKITE PO RADIOTORIAIS).
SAUGOKITE NUO VANDENS.**

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

- Venkite naudoti priemonę labai dulketose, drėgnose ar riebaluotose vietose. Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į įtrūkimus ir plyšius bei kitas vietas, kuriose paprastai slepiasi vabzdžiai, taip pat į vietas, esančias už mašinų, buitinės įrangos ar vamzdžių arba po jais. Produktą galima įdėti į tuštumas, ventiliacijos angas, liftų šachtas, elektros ir elektroninius prietaisus ir kt. Neskirta naudoti arklidėse, gyvūnų aptvaruose ar narvuose.

Nerekomenduojama naudoti vabzdžiais mintančių paukščių ir roplių laikymo patalpose.

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Dirbdami su produktu, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

- Venkite kontakto su oda.

- Prieš valgį ir panaudoję produktą plaukite rankas ir paveiktą odą.

- Nedėkite tiesiai ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar valgomas maistas arba gyvūnų pašaras.

- Naudokite tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Nemėginkite atidaryti ar pripildyti kasečių.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Bendras patarimas:

Jei išsiliejo didelis kiekis, taikomi šie patarimai. Nebūkite pavojingoje zonoje. Paguldykite ir transportuokite nukentėjusį asmenį stabilioje padėtyje (paguldę jį ant šono). Nedelsdami nurenkite užterštus drabužius ir saugiai juos išmeskite. Jei reikia, nuvežkite paveiktą asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, kartu pristatykite pakuotę ar etiketę.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!

Patekus ant odos: Gerai nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens, po to nuskalaukite vandeniu. Jei susidaro ir išlieka odos sudirginimas, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: Nedelsdami praplaukite akis ir už vokų dideliu drungno vandens kiekiu. Toliau praplaukite mažiausiai 5 minutes. Nepamirškite išimti kontaktinių lęšių, jei juos nešiojate. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Nurijus: Skalaukite burną vandeniu. Skambinkite į apsinuodijimų centrą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jei atsirado simptomų ir (arba) jei prarijote didelį kiekį. Jei asmuo nebuvo praradęs sąmonės, duokite jam nedidelį kiekį vandens atsigerti. Netekus sąmonės, paguldykite nukentėjusįjį stabiliai ant šono ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros personalui: Gydymą ir priežiūrą užtikrinti atsižvelgiant į simptomus.

KREIPDAMIESI Į VIETOS APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ ARBA GYDYTOJĄ, TURĖKITE SU SAVIMI PAKUOTĘ AR ETIKETĘ.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Neišmeskite nepanaudoto produkto į vandens telkinius, vamzdžius (kriauklę, tualetą ir pan.) ar kanalizaciją ir neišpilkite jo ant žemės.

Turinį / talpyklą išmesti laikantis taikomų atliekų tvarkymo reikalavimų.

Gelio likučius galima pašalinti, nuvalant juos kempinėle arba drėgna šluoste, suvilgyta 5 % natrio chlorido tirpalu. Panaudotas medžiagas (kempines, šluostes ir pan.) reikia pašalinti kaip kietas atliekas. Sukietėjusį gelį galima nuimti mentele ir pašalinti kaip kietas atliekas.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Neleiskite užšalti.

Saugokite nuo saulės spindulių.

Tinka naudoti: iki 24 mėnesių.

Skirius 6. KITA INFORMACIJA

Informacija. Produktas gali nudažyti kai kurias jautrias medžiagas, pvz., tekstilę. Jei kyla abejonų, pirmiausia taikykite mažame, nepastebimame plote.

Naudojant produktą, reikia atsižvelgti į tai, kad vabzdžiai gali tapti atsparūs klotianidinui. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, galima naudoti šias priemones:

- Naudoti integruotas kontrolės priemones, pavyzdžiui, kombinuoti chemines ir fizines kontrolės priemones bei laikytis higienos taisyklių, atsižvelgiant į vietos sąlygas (klimato sąlygas, tikslinius organizmus, naudojimo sąlygas ir pan.).
- Visada laikytis ant produkto etiketės pateiktos naudojimo instrukcijos dėl taikymo ir dozavimo.
- Produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, naudojimą keisti kitais veikiančiais kontrolės būdais.

- „Maxforce Platin“ produktą rekomenduojama naudoti pagal integruotą kontrolės programą.
- Būtina reguliariai tikrinti efektyvumą, siekiant užtikrinti, kad neišsivystytų zooparazitų atsparumas, bei išvengti jų pakartotinio paplitimo rizikos.
- Tais atvejais, kai buvo pateikta naudojimo instrukcija, tačiau, nepaisant to, išsivystė atsparumas, reikia vengti keisti šį produktą į jį panašiais produktais, ypač neonikotinoidais.
- Esant atsparumo įrodymams, būtina taikyti visas priemones, siekiant išnaikinti paplitusią populiaciją. Pavyzdžiui, rekomenduojama naudoti iš karto tiek cheminius, tiek mechaninius kontrolės metodus.