



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/19-12/14
URBROJ: 534-07-2-3/1-19-3
Zagreb, 28. studenoga 2019.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska**, u predmetu obnove odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **MAXIMON 5 BLOK**.

II. Obnova odobrenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **27.4.2023.**

VI. Ovim rješenjem stavlja se van snage rješenje Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-543-04/16-12/08, URBROJ: 543-07-1-1-4/4-16-3 od 1. srpnja 2016.

Obrazloženje

Trgovačko društvo **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za obnovu odobrenja izdanog od strane nadležnog tijela referentne države Irske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda pod imenom za tržište Republike Hrvatske **MAXIMON 5 BLOK**, a u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2017/1380 o produljenju odobrenja za bromadiolon kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 14.

Obnova odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 27.4.2023. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države.

Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

MAXIMON 5 BLOK

Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/19-12/14

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0014345-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	MAXIMON 5 BLOK
-----------------	----------------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/19-12/14	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0014345-0000	
Datum odobrenja	28.11.2019.	
Datum isteka odobrenja	27.4.2023.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Lodi SAS
Adresa proizvođača	Parc d'activités des quatre routes, 35390 Grand Fougeray Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Lodi SAS, Parc d'activités des quatre routes, 35390 Grand Fougeray Francuska Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers, 35390 GRAND FOUGERAY Francuska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Bromadiolon
Naziv proizvođača	PelGar International Ltd.
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska, 280 02 Kolin Češka

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu) – parafinski blok

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	H372 Uzrokuje oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H360D Može naškoditi nerođenom djetetu.
Oznake obavijesti	P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P280 Nositi zaštitne rukavice. P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:Zatražiti pomoć liječnika. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti spremnik u/na mjesto predviđeno za sakupljanje opasnog otpada, u skladu s nacionalnim propisima

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> kućni miševi odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	20-30 g mamca po kutiji s mamcem. Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji). Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 2 ili 5 metara, ovisno o jačini infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamca te zamijeniti pojeđen ili oštećen mamac sve dok se konzumacija ne zaustavi. Postupak treba ponoviti ako se uoče znakovi ponovne infestacije.
Kategorije korisnika	Profesionalni korisnik
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u PE ili PP vrećici od 20 - 30 g (zamotani ili nezamotani): - PE/PP kanta:

	<p>20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g).</p> <p>30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).</p> <p>- Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem ako su mamci neumotani):</p> <p>20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g).</p> <p>30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).</p> <p>- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC) u kartonskoj kutiji koja svaka sadrži 1 blok od 20 ili 30 g):</p> <p>- 5 kg (250x20 g) ili (167x30 g).</p>
--	---

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – štakori – profesionalni korisnici – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru

Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	60-100 g mamca po zaštitnoj kutiji za mamce. 60-100 g mamca po kutiji s mamcem. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5 metara u slučaju jake infestacije ili 10 metara u slučaju blage infestacije.metara.
Kategorije korisnika	Profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u PE ili PP vrećici od 20 - 30 g (zamotani ili nezamotani): - PE/PP kanta: 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g). - Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem ako su mamci neumotani): 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g). - Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC) u kartonskoj kutiji koja svaka sadrži 1 blok od 20 ili 30 g): - 5 kg (250x20 g) ili (167x30 g).

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana nakon početka tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – kućni miševi i/ili štakori – profesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke <i>Mus musculus</i> kućni miševi odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	štakori: 60-100 g mamca po zaštitnoj kutiji za mamce; kućni miševi: 20-30 g mamca po zaštitnoj kutiji za mamce. Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji), odnosno za suzbijanje infestacije štakorima 60-100 g mamca. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 2 ili 5 metara, ovisno o jačini infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamca te zamijeniti pojeden ili oštećen mamac sve dok se konzumacija ne zaustavi. Postupak treba ponoviti ako se uoče znakovi ponovne infestacije.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u PE ili PP vrećici od 20 - 30 g (zamotani ili nezamotani): - PE/PP kanta: 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g). - Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem ako su mamci neumotani): 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).

	- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC) u kartonskoj kutiji koja svaka sadrži 1 blok od 20 ili 30 g): - 5 kg (250x20 g) ili (167x30 g).
--	---

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljanja.
- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana (za miševe); 5 do 7 dana nakon početka tretmana (za štakore) i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ne postavljati ovaj proizvod izravno u jazbine.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba br. 4 – kućni miš i/ili štakor - osposobljeni profesionalni korisnici - u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> kućni miš odrasle i mlade jedinke <i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.

Količine kod primjene i učestalost	<p>Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.</p> <p>Suzbijanje miševa: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije; suzbijanje štakora: 60 - 100 g mamca po mjestu postavljanja na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije ili svakih 10 metara u slučaju blage infestacije.</p> <p>Redovito treba provjeravati konzumaciju mamaca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce, sve dok potrošnja ne prestane.</p>
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Minimalna veličina pakiranja 5 kg.</p> <p>Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u PE ili PP vrećici od 20 - 30 g (zamotani ili nezamotani):</p> <p>- PE/PP kanta:</p> <p>20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g).</p> <p>30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).</p> <p>- Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem ako su mamci neumotani):</p> <p>20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g).</p> <p>30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).</p> <p>- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC) u kartonskoj kutiji koja svaka sadrži 1 blok od 20 ili 30 g):</p> <p>- 5 kg (250x20 g) ili (167x30 g).</p>

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se umanjio rizik od sekundarnog otrovanja, često treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama relevantnog Kodeksa najbolje prakse.
- Ne koristiti pripravak kao trajni mamac za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

-

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

-

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Uporaba br. 5 – miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke <i>Mus musculus</i> kućni miš odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.
Količine kod primjene i učestalost	20-30 g mamca po mjestu postavljanja (miševi); 60-100 g mamca po mjestu postavljanja (štakori) Za suzbijanje infestacije kućnim miševima treba upotrijebiti 20-30 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji), odnosno za suzbijanje infestacije štakorima 60-100 g mamca. Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 2 ili 5 metara, ovisno o jačini infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamca te zamijeniti pojeden ili oštećen mamac sve dok se konzumacija ne zaustavi. Postupak treba ponoviti ako se uoče znakovi ponovne infestacije.
Kategorije korisnika	Profesionalni korisnik
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u PE ili PP vrećici od 20 - 30 g (zamotani ili nezamotani): - PE/PP kanta: 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g)

	<p>g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).</p> <p>- Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem ako su mamci neumotani): 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g).</p> <p>- Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC) u kartonskoj kutiji koja svaka sadrži 1 blok od 20 ili 30 g): - 5 kg (250x20 g) ili (167x30 g).</p>
--	--

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Kod postavljanja mamca na otvorenom, mjesto postavljanja mamca treba biti prekriveno i postavljeno na strateško mjesto na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta svede na najmanju moguću mjeru.
- Za izravno postavljanje u jazbine:
 - Mamac treba biti postavljen na način da se izloženost djece i ne-ciljnih vrsta svede na najmanju mjeru.
 - Ulaz u jazbinu s mamcem treba biti prekriven ili blokiran da se umanju odbacivanje ili rasipanje mamaca.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se umanjio rizik od sekundarnog otrovanja, često treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama relevantnog Kodeksa najbolje prakse.
- Ne koristiti pripravak kao trajni mamac za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Uporaba br. 6 – štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – vanjska otvorena područja i odlagališta otpada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Vanjska otvorena područja Vanjska odlagališta otpada
Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca.
Količine kod primjene i učestalost	60-100 g mamca po mjestu postavljanja Za suzbijanje infestacije štakorima treba upotrijebiti 60-100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji). Ako je potrebno više kutija s mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba biti 5 ili 10 metra, ovisno o jačini infestacije. Redovito treba provjeravati konzumaciju mamca te zamijeniti pojeđen ili oštećen mamac sve dok se konzumacija ne zaustavi. Postupak treba ponoviti ako se uoče znakovi ponovne infestacije.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca u PE ili PP vrećici od 20 - 30 g (zamotani ili nezamotani): - PE/PP kanta: 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g). - Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem ako su mamci neumotani): 20 g: 5 kg (250x20 g), 5,5 kg (275x20 g), 6 kg (300x20 g), 6,5 kg (325x20 g), 7 kg (350x20 g), 7,5 kg (375x20 g), 8 kg (400x20 g), 8,5 kg (425x20 g), 9 kg (450x20 g), 9,5 kg (475x20 g), 10 kg (500x20 g). 30 g: 5 kg (167x30 g), 5,5 kg (184x30 g), 6 kg (200x30 g), 6,5 kg (217x30 g), 7 kg (234x30 g), 7,5 kg (250x30 g), 8 kg (267x30 g), 8,5 kg (284x30 g), 9 kg (300x30 g), 9,5 kg (347x30 g), 10 kg (334x30 g). - Prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce (PP, PS, PVC) u kartonskoj kutiji koja svaka sadrži 1 blok od 20 ili 30 g): - 5 kg (250x20 g) ili (167x30 g).

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Kod postavljanja mamca na otvorenom, mjesto postavljanja mamca treba biti prekriveno i postavljeno na strateško mjesto na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta svede na najmanju moguću mjeru.
- Za izravno postavljanje u jazbine:
 - Mamac treba biti postavljen na način da se izloženost djece i ne-ciljnih vrsta svede na najmanju mjeru.
 - Ulaz u jazbinu s mamcem treba biti prekriven ili blokiran da se umanju odbacivanje ili rasipanje mamaca.
 - Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se umanjio rizik od sekundarnog otrovanja, često treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana u skladu s preporukama relevantnog Kodeksa najbolje prakse.
- Ne koristiti pripravak kao trajni mamac za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. Uporaba br. 7 – štakori - osposobljeni profesionalni korisnici - kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	primjena u kanalizaciju
Načini primjene	primjena mamaca Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce koje sprečavaju kontakt mamca s vodom.

Količine kod primjene i učestalost	200-300 g mamca po mjestu postavljanja 200-300 g svakih 30-50 metara Za suzbijanje jakih infestacija štakorima treba upotrijebiti 300 g mamca po mjestu postavljanja (šahtu). Za suzbijanje blagih infestacija štakorima treba upotrijebiti 200 g mamca po mjestu postavljanja (šahtu).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja 5 kg. Pojedinačno unutarnje pakiranje mamca 100 g (s kukom): - PE/PP kanta: 5 kg , 5,5 kg, 6 kg, 6,5 kg, 7 kg, 7,5 kg, 8 kg, 8,5 kg, 9 kg, 9,5 kg, 10 kg. - Kartonska kutija (s unutarnjim plastičnim slojem): 5 kg , 5,5 kg, 6 kg, 6,5 kg, 7 kg, 7,5 kg, 8 kg, 8,5 kg, 9 kg, 9,5 kg, 10 kg.

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac mora biti postavljen na način da ne može doći u kontakt s vodom i da se ne može isprati vodom.
- Slijediti svaku dodatnu uputu predloženu u relevantnom Kodeksu najbolje prakse.

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Mamac se postavlja samo u kanalizacijske sustave koji su povezani sa pogonima za pročišćavanje otpadnih voda.
- Ne koristiti pripravak u pulsnom režimu.

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja s pripravkom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac ili kutije za mamce.
- Upute za uporabu koje su "specifične za mamce": • Mamci u vrećicama: Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamac.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja s pripravkom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- O učestalosti pregleda tretiranog području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti usklađena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najboljeg iskustva.
- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Upute za uporabu koje su "specifične za mamce": • Mamci u vrećicama: Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamac].

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Profesionalni korisnici:

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti sve moguće prolaznike (na primjer korisnike) o kampanji za suzbijanje glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dva puta tjedno).
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da proizvod nije namijenjen za opću uporabu (npr. "samo za profesionalne korisnike") i za postavljanje u odgovarajuće zaštitne kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja (npr. "koristiti u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja").
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana. Ako proizvod do kraja deratizacijskog postupka nije učinkovit (aktivnost glodavaca je i dalje primjetna), informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno uputiti korisnika da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod namijenjen samo za osposobljene profesionalne korisnike koji imaju certifikat o završenoj odgovarajućoj edukaciji (npr. "samo za osposobljene profesionalne korisnike").