



Luxembourg, le 11/10/2019

## LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Vu le règlement (UE) No 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ;

Conformément à l'article 34 (MRp) du règlement précité ;

Vu la procédure d'autorisation BC-KV020758-09 du 03/11/2015 dans l'Etat-membre de référence France, portant autorisation de mise sur le marché de la famille de produits biocides dénommée «CINQ SUR CINQ LOTION» ;

Conformément au rapport d'évaluation et au résumé des caractéristiques de la famille de produits biocides y relatifs ;

Vu la demande de reconnaissance mutuelle présentée le 03/11/2015 par Laboratoire Chauvin, 416, rue Samuel Morse, CS 99535, F- 34961 Montpellier Cedex 2, France tendant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour la famille de produits biocides dénommé «CINQ SUR CINQ LOTION»;

Vu la procédure de reconnaissance mutuelle BC-PE020769-35;

### Arrête :

**Art. 1<sup>er</sup>** – En application de l'article 19, paragraphes (1) à (5), du Règlement (EU) No 528/2012, l'autorisation de la famille de produits biocides «**CINQ SUR CINQ LOTION**» est accordée conformément au dossier produit à l'appui de la demande de reconnaissance mutuelle. Le dossier de demande fait partie intégrante de la présente autorisation.

L'autorisation porte le N° **166/19/L-M00-000** (R4BP asset LU-0013967-0000) et couvre la mise sur le marché de la famille de produits biocides :

### **CINQ SUR CINQ LOTION**

**Art.2** – Conformément à l'article 17 du règlement 528/2012, la période de validité de l'autorisation N° **166/19/L-M00-0** prend fin le **22/07/2029**.

**Art.3** – La mise sur le marché et l'utilisation des produits sont soumises aux conditions et restrictions énoncées par le résumé des caractéristiques du produit annexé.

La classification, l'étiquetage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent répondre aux exigences de l'article 69 du règlement 528/2012<sup>1</sup>. Les langues officielles éligibles sont

<sup>1</sup> Règlement (UE) No 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

les langues allemande ou française. L'étiquetage, l'emballage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent en particulier porter les mentions figurant à l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente autorisation.

**Art.4** – Le dossier de demande doit être complété par la soumission d'études complémentaires, postérieures à l'autorisation, conformément aux conditions énoncées, le cas échéant, par l'Etat membre de référence.

Le détenteur de l'autorisation doit fournir la preuve que les susdites données, requises par l'Etat membre de référence, ont été introduites dans les délais prédéfinis et doit informer l'autorité compétente luxembourgeoise du résultat de l'évaluation de ces données.

**Art.5** – Les produits dont les conditions de mise sur le marché sont modifiées par la présente autorisation ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché six mois après la date de la présente autorisation.

Leur utilisation est interdite douze mois après la date de la présente autorisation.

**Art.6** – Une demande de renouvellement d'une autorisation doit être présentée auprès de l'autorité compétente au moins 550 jours avant l'expiration de l'autorisation.

**Art.7** – Le titulaire de l'autorisation effectue préalablement à la mise à disposition du produit sur le marché la déclaration des données pertinentes au Centre Antipoisons<sup>2</sup>, conformément aux instructions jointes en annexe.

Les appelants à partir du Luxembourg peuvent joindre le Centre Antipoisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le numéro de téléphone (+352) 8002 5500. Ce numéro doit normalement aussi apparaître sous la section 1.4 «Numéro de téléphone d'appel d'urgence» de la fiche de données de sécurité du produit.

**Art.8** – L'autorisation pourra être retirée en cas du non-respect des dispositions de la présente autorisation. Les conditions afférentes à la présente autorisation pourraient être changées suivant les conclusions relatives aux études requises.

#### **Informations :**

- Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2015, aucun produit biocide ne peut être mis à disposition sur le marché européen si le fabricant ou l'importateur de chaque substance active contenue dans le produit ou, le cas échéant, l'importateur du produit biocide, n'est inscrit sur la liste visée à l'article 95 du Règlement UE n° 528/2012.
- En vertu de la loi du 4 septembre 2015, une obligation d'enregistrement s'applique **aux vendeurs de produits biocides dont l'usage est réservé à l'utilisateur professionnel**. Cette obligation s'applique aussi bien aux vendeurs de produits biocides sis au Luxembourg, qu'aux vendeurs étrangers

<sup>2</sup> Selon l'article 73 du règlement (UE) N° 528/2012, l'article 45 du règlement (CE) N° 1272/2008 s'applique aux produits qui tombent sous l'égide du règlement (UE) N° 528/2012. Au Luxembourg, la mise en œuvre du susdit article 45 est une compétence du Ministère de la Santé. Ce dernier a confié l'exécution des tâches découlant de l'article 45 au *Centre Antipoisons de Bruxelles* par le biais d'une convention.

qui vendent de tels produits biocides directement à l'utilisateur final luxembourgeois à partir de l'étranger.

La déclaration peut être introduite moyennant un formulaire disponible sur simple demande à l'adresse : [biocides@aev.etat.lu](mailto:biocides@aev.etat.lu). Toutes questions peuvent également être adressées à cette adresse e-mail. Le titulaire d'autorisation est prié de diffuser la présente information en aval de sa chaîne de distribution.

**Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat et du  
Développement durable**



**Madame Joëlle Welfring**

directrice-adjointe de l'Administration de l'environnement

**Annexe(s) :**

- 1) résumé des caractéristiques d'une famille de produits biocides
- 2) instructions pour la déclaration auprès du centre Antipoisons

Un recours contre la présente décision peut être introduit par ministère d'avocat auprès du Tribunal administratif dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la présente.





**Annexe à l'autorisation N° 166/19/L-M00-000**  
**- VERSION DU 11/10/2019 -**

**RESUME DES CARACTERISTIQUES D'UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES**

**Nom de la famille : CINQ SUR CINQ LOTION**

Type de produit(s) : 19

N° d'autorisation : 166/19/L-M00-000

R4BP Asset number : LU-0013967-0000

<b>1. Informations administratives</b> .....	<b>4</b>
1.1. Nom de la famille de produits.....	4
1.2. Type(s) de produit.....	4
1.3. Détenteur de l'autorisation .....	4
1.4. Fabricant(s) du produit.....	4
1.5. Fabricant(s) de la substance active.....	4
<b>2. Composition et formulation de la famille de produits</b> .....	<b>5</b>
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille de produits.....	5
2.2. Type(s) de formulation.....	5
<b>PARTIE 2 – NIVEAU D'INFORMATIONS 2 – META-RCP</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Informations administratives Meta-RCP 01</b> .....	<b>6</b>
1.1. Identifiant du Meta-RCP.....	6
1.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification .....	6
1.3. Type(s) de produit.....	6
<b>2. Composition du Meta-RCP</b> .....	<b>6</b>
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP...	6
2.2. Type de formulation.....	6
<b>3. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 01</b> .....	<b>7</b>
4.1. Descriptions de l'utilisation N° 1.....	7
4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	8
4.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	8
4.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	8
4.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage.....	8
4.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	8
4.2. Descriptions de l'utilisation N° 2.....	8

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	9
4.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	9
4.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	9
4.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	9
4.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	9
<b>5. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 01 .....</b>	<b>9</b>
5.1. Consignes d'utilisation .....	9
5.2. Mesures de gestion des risques .....	10
5.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	10
5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	10
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	11
<b>6. Autres informations .....</b>	<b>11</b>
<b>7. Informations administratives Meta-RCP 02 .....</b>	<b>11</b>
7.1. Identifiant du Meta-RCP .....	11
7.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification .....	11
7.3. Type(s) de produit .....	11
<b>8. Composition du Meta-RCP .....</b>	<b>11</b>
8.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP .....	11
8.2. Type de formulation .....	11
<b>9. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP .....</b>	<b>11</b>
<b>10. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 02 .....</b>	<b>12</b>
10.1. Descriptions de l'utilisation N° 1 .....	12
10.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	13
10.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	13
10.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	13
10.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	13
10.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	13
10.2. Descriptions de l'utilisation N° 2 .....	13
10.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	14
10.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	14
10.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	14
10.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	14
10.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	15
<b>11. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 02 .....</b>	<b>15</b>

11.1. Consignes d'utilisation .....	15
11.2. Mesures de gestion des risques .....	15
11.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	15
11.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	16
11.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	16
<b>12. Autres informations .....</b>	<b>16</b>
<b>13. Informations administratives Meta-RCP 03 .....</b>	<b>16</b>
13.1. Identifiant du Meta-RCP .....	16
13.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification .....	16
13.3. Type(s) de produit .....	16
<b>14. Composition du Meta-RCP .....</b>	<b>16</b>
14.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP .....	16
14.2. Type de formulation .....	17
<b>15. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP .....</b>	<b>17</b>
<b>16. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 03 .....</b>	<b>17</b>
16.1. Descriptions de l'utilisation N° 1 .....	17
16.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	18
16.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	18
16.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	18
16.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	18
16.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	18
<b>17. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 03 .....</b>	<b>19</b>
17.1. Consignes d'utilisation .....	19
17.2. Mesures de gestion des risques .....	19
17.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	19
17.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	20
17.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	20
<b>18. Autres informations .....</b>	<b>20</b>
<b>PARTIE 3 – NIVEAU D'INFORMATIONS 3, PRODUITS INDIVIDUELS PAR META-RCP .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Nom (s) commercial (commerciaux), numéro et composition des produits individuels .....</b>	<b>21</b>

## PARTIE 1 – NIVEAU D'INFORMATIONS 1

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom de la famille de produits

<b>CINQ SUR CINQ LOTION</b>
-----------------------------

#### 1.2. Type(s) de produit

Type de produit(s)	19
--------------------	----

#### 1.3. Détenteur de l'autorisation

Nom et adresse du détenteur	<b>Laboratoire Chauvin 416, rue Samuel Morse CS 99535 F- 34961 Montpellier Cedex 2 France</b>
Numéro d'autorisation	<b>166/19/L-M00-0</b>
R4BP Asset number	<b>LU-0013967-0000</b>
Date de l'autorisation	<b>11/10/2019</b>
Date d'expiration de l'autorisation	<b>22/07/2029</b>

#### 1.4. Fabricant(s) du produit

Nom(s) et adresse(s) du fabricant	<b>Laboratoire Chauvin 416, rue Samuel Morse CS 99535 F- 34961 Montpellier Cedex 2 France</b>
Adresse(s) du site de production	<b>FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE LES ILES FERAYS F- 07300 Tournon cedex France</b>

#### 1.5. Fabricant(s) de la substance active

Substance active	<b>Ethyl butylacetylaminopropionate</b>
Nom(s) et adresse(s) du fabricant	<b>Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 D-64293 Darmstadt Allemagne</b>
Adresse(s) du site de production	<b>Merck S.L.U. Poligono Merck ES-08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Espagne</b>



## 2. Composition et formulation de la famille de produits

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille de produits

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EINECS	Teneur
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	20-35 % m/m

### 2.2. Type(s) de formulation

Liquide destiné à être utilisé sans dilution



## PARTIE 2 – NIVEAU D'INFORMATIONS 2 – META-RCP

### 1. Informations administratives Meta-RCP 01

#### 1.1. Identifiant du Meta-RCP

CINQ SUR CINQ LOTION-META1: CINQ SUR CINQ FAMILLE

#### 1.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

166/19/L-M01-000

#### 1.3. Type(s) de produit

19

### 2. Composition du Meta-RCP

#### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EINECS	Teneur
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	20 % m/m

#### 2.2. Type de formulation

Liquide destiné à être utilisé sans dilution

### 3. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP

Mentions de danger	H226 - Liquide et vapeurs inflammables H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 - Contient du 2-hexyl-3-phényl-2-propénal (trans & cis), du 2-hydroxybenzoate de benzyle, du (R)-p-mentha-1,8-diène, et du 3,7-diméthyl-6-octén-1-ol (citronellol). Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence	P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Note	/

#### 4. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 01

##### 4.1. Descriptions de l'utilisation N° 1

Tableau 1: Répulsif cutané contre les moustiques

Type(s) de produit	PT19-Répulsifs et appâts																																		
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/																																		
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Moustiques Culex ( <i>Culex spp.</i> ) Moustiques Aedes ( <i>Aedes spp.</i> )  Adultes																																		
Domaine d'utilisation	Application cutanée																																		
Méthode d'application	Par pulvérisation. Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.																																		
Dose prescrite et fréquence d'application	<p>Le taux d'application est de 0,7 mg/cm<sup>2</sup> de peau.</p> <p>Durée de protection : 5 heures en climat tempéré</p> <p>Nombre et fréquence des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Enfants de 6 mois à 6 ans : 1 application par jour</li> <li>– Enfants et adultes (&gt; 6 ans) : 2 applications par jour</li> </ul> <table border="1" data-bbox="746 1413 1420 1641"> <thead> <tr> <th>Nombre de pulvérisations</th> <th>Tête</th> <th>Par main</th> <th>Par bras</th> <th>Par jambe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;1 an</td> <td>1-2</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>1 – 2 ans (&lt;2 ans)</td> <td>2</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>2 – 5 ans</td> <td>2-3</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>6 – 11 ans</td> <td>2-3</td> <td></td> <td>2-3</td> <td>3-4</td> </tr> <tr> <td>Adultes et enfants à partir de 12 ans</td> <td>5-6</td> <td>2</td> <td>4-5</td> <td>6-7</td> </tr> </tbody> </table>					Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe	<1 an	1-2		1-2	1-2	1 – 2 ans (<2 ans)	2		1-2	1-2	2 – 5 ans	2-3		1-2	2-3	6 – 11 ans	2-3		2-3	3-4	Adultes et enfants à partir de 12 ans	5-6	2	4-5	6-7
Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe																															
<1 an	1-2		1-2	1-2																															
1 – 2 ans (<2 ans)	2		1-2	1-2																															
2 – 5 ans	2-3		1-2	2-3																															
6 – 11 ans	2-3		2-3	3-4																															
Adultes et enfants à partir de 12 ans	5-6	2	4-5	6-7																															
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Grand public</b>																																		
Emballage et Conditionnements	Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.																																		

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1

Ne pas utiliser ce produit contre les espèces tropicales.

#### 4.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1

/

#### 4.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

#### 4.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

#### 4.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

### 4.2. Descriptions de l'utilisation N° 2

Tableau 2: Répulsif cutané contre les tiques

Type(s) de produit	PT19-Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Tique ( <i>Ixodes ricinus</i> ) Adultes et nymphes
Domaine d'utilisation	Application cutanée
Méthode d'application	Par pulvérisation. Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.
Dosé prescrite et fréquence d'application	Le taux d'application est de 0,95 mg/cm <sup>2</sup> de peau. Durée de protection : 3 heures en climat tempéré Nombre et fréquence des applications : Enfants et adultes (> 6 mois) : 1 application par jour

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de pulvérisations</th> <th>Tête</th> <th>Par main</th> <th>Par bras</th> <th>Par jambe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;1 an</td> <td>2-3</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>1 – 2 ans (&lt;2 ans)</td> <td>2-3</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2 – 5 ans</td> <td>3-4</td> <td></td> <td>2-3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6 – 11 ans</td> <td>3-4</td> <td></td> <td>3-4</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Adultes et enfants à partir de 12 ans</td> <td>7-8</td> <td>2-3</td> <td>5-6</td> <td>8-9</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe	<1 an	2-3		1-2	1-2	1 – 2 ans (<2 ans)	2-3		1-2	2	2 – 5 ans	3-4		2-3	3	6 – 11 ans	3-4		3-4	4-5	Adultes et enfants à partir de 12 ans	7-8	2-3	5-6	8-9
Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe																											
<1 an	2-3		1-2	1-2																											
1 – 2 ans (<2 ans)	2-3		1-2	2																											
2 – 5 ans	3-4		2-3	3																											
6 – 11 ans	3-4		3-4	4-5																											
Adultes et enfants à partir de 12 ans	7-8	2-3	5-6	8-9																											
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Grand public</b>																														
Emballage et Conditionnements	Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.																														

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2

Ne pas utiliser ce produit contre les espèces tropicales.

#### 4.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2

/

#### 4.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

#### 4.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

#### 4.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

## 5. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 01

### 5.1. Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

- Respecter les doses d'application recommandées.
- Renouveler l'application après exposition à l'eau sans dépasser le nombre d'applications maximal recommandé.
- En cas d'inefficacité du traitement, l'utilisateur devrait informer le titulaire de l'autorisation.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit avec d'autres produits répulsifs.
- En cas d'utilisation concomitante avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant d'appliquer le produit.
- La durée de protection est uniquement fournie à titre indicatif. Elle peut diminuer en fonction de facteurs environnementaux (comme une température élevée ou la vitesse du vent).

## 5.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas pulvériser directement sur le visage. Pulvériser le produit dans la main, puis l'appliquer sur le visage.

- Pour les enfants, le produit doit être appliqué par un adulte.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- Appliquer le produit sur la peau et répartir uniformément avec les mains sur les zones suivantes :
  - Adultes et enfants (> 11 ans) : appliquer sur la tête, le cou, les mains (paumes et dos), les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
  - Enfants de 6 mois à 11 ans : appliquer sur la tête, le cou, les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
- Se laver les mains avant de manipuler des aliments.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter de respirer les vapeurs / aérosols.
- Utiliser exclusivement en extérieur ou dans une pièce bien aérée.

## 5.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Contact oculaire : rincer immédiatement à l'eau courante, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Vérifier si la personne concernée porte des lentilles de contact et les enlever si cela peut se faire facilement. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. En cas d'irritation ou de trouble visuel, consulter un médecin.
- Contact cutané : en cas de lésions cutanées, de rougeur ou de douleur persistante après l'application, consulter un médecin.
- Inhalation de grandes quantités : rester au repos en position semi-assise. Si des symptômes apparaissent, consulter immédiatement un médecin.
- Contact avec la bouche : rincer la bouche avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent et/ou en cas de contact avec de grandes quantités, contacter immédiatement le centre antipoisons.
- Si la personne concernée est inconsciente, ne pas donner de liquides ni provoquer de vomissements ; la placer en position de sécurité et consulter immédiatement un médecin.
- Garder le récipient ou l'étiquette à disposition.

## 5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans des cours d'eau, dans des canalisations (égout, toilettes...) ou dans les caniveaux.

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la législation nationale (centre de recyclage).
- L'emballage ne doit pas être réutilisé.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

- Ne pas conserver le produit pendant plus de 3 ans.

6. Autres informations

Le nombre de pulvérisations indiqué sur l'étiquette doit être adapté au taux d'application.

7. Informations administratives Meta-RCP 02

7.1. Identifiant du Meta-RCP

CINQ SUR CINQ LOTION-META2: CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES

7.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

166/19/L-M02-000

7.3. Type(s) de produit

19

8. Composition du Meta-RCP

8.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EINECS	Teneur
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	25 % m/m

8.2. Type de formulation

Liquide destiné à être utilisé sans dilution

9. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP

Mentions de danger	H226 - Liquide et vapeurs inflammables H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 - Contient du 2-hexyl-3-phényl-2-propénal (trans & cis), du 2-hydroxybenzoate de benzyle, du (R)-p-mentha-1,8-diène, et du 3,7-diméthyl-6-octén-1-ol (citronellol). Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence	P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES

	<p>YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.</p>
Note	/

## 10. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 02

### 10.1. Descriptions de l'utilisation N° 1

Tableau 1: Répulsif cutané contre les moustiques

Type(s) de produit	PT19-Répulsifs et appâts				
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/				
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Moustiques <i>Culex</i> ( <i>Culex spp.</i> ) Moustiques <i>Aedes</i> ( <i>Aedes spp.</i> )  Adultes				
Domaine d'utilisation	Application cutanée				
Méthode d'application	Par pulvérisation. Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.				
Dose prescrite et fréquence d'application	0,68 mg/cm <sup>2</sup> de peau  Durée de protection : 5 heures en climat tempéré  Nombre et fréquence des applications : – Enfants de 2 ans à 11 ans : 1 application par jour – Enfants et adultes (> 11 ans) : 2 applications par jour				
	Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe
	<1 an	1-2		1	1-2
	1 – 2 ans (<2 ans)	1-2		1-2	1-2
	2 – 5 ans	2-3		1-2	2-3
	6 – 11 ans	2-3		2-3	3-4
	Adultes et enfants à partir de 12 ans	5-6	2	4-5	6-7



Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Grand public</b>
Emballage et Conditionnements	Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère. Bouteille 75 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.

**10.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1**

Ne pas utiliser ce produit contre les espèces tropicales.

**10.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1**

/

**10.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

/

**10.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

/

**10.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales**

/

**10.2. Descriptions de l'utilisation N° 2**

Tableau 2: Répulsif cutané contre les tiques

Type(s) de produit	PT19-Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Tique ( <i>Ixodes ricinus</i> ) Adultes et nymphes
Domaine d'utilisation	Application cutanée

Méthode d'application	Par pulvérisation. Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.																				
Dose prescrite et fréquence d'application	0,93 mg/cm <sup>2</sup> de peau  Durée de protection : 4 heures en climat tempéré  Nombre et fréquence des applications : – Enfants et adultes (> 2 ans) : 1 application par jour  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de pulvérisations</th> <th>Tête</th> <th>Par main</th> <th>Par bras</th> <th>Par jambe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 – 5 ans</td> <td>3-4</td> <td></td> <td>2-3</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>6 – 11 ans</td> <td>3-4</td> <td></td> <td>3-4</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Adultes et enfants à partir de 12 ans</td> <td>7-8</td> <td>2-3</td> <td>5-6</td> <td>8-9</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe	2 – 5 ans	3-4		2-3	2-3	6 – 11 ans	3-4		3-4	4-5	Adultes et enfants à partir de 12 ans	7-8	2-3	5-6	8-9
Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe																	
2 – 5 ans	3-4		2-3	2-3																	
6 – 11 ans	3-4		3-4	4-5																	
Adultes et enfants à partir de 12 ans	7-8	2-3	5-6	8-9																	
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Grand public</b>																				
Emballage et Conditionnements	Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère. Bouteille 75 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.																				

#### 10.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2

Ne pas utiliser ce produit contre les espèces tropicales.

#### 10.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2

/

#### 10.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

#### 10.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

10.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

## 11. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 02

### 11.1. Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

- Respecter les doses d'application recommandées.
- En cas d'inefficacité du traitement, l'utilisateur en informera le titulaire de l'enregistrement.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit avec d'autres produits répulsifs.
- En cas d'utilisation concomitante avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant d'appliquer le produit.
- La durée de protection est uniquement fournie à titre indicatif. Elle peut diminuer en fonction de facteurs environnementaux (comme une température élevée ou la vitesse du vent).
- Renouveler l'application après exposition à l'eau sans dépasser le nombre d'applications maximal recommandé.

### 11.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas pulvériser directement sur le visage. Pulvériser le produit dans la main, puis l'appliquer sur le visage.

- Pour les enfants, le produit doit être appliqué par un adulte.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- Appliquer le produit sur la peau et répartir uniformément avec les mains sur les zones suivantes :
- Adultes et enfants (> 11 ans) : appliquer sur la tête, le cou, les mains (paumes et dos), les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
- Enfants de 6 mois à 11 ans : appliquer sur la tête, le cou, les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
- Se laver les mains avant de manipuler des aliments.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter de respirer les vapeurs / aérosols.
- Utiliser exclusivement en extérieur ou dans une pièce bien aérée.

### 11.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Contact oculaire : rincer immédiatement à l'eau courante, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Vérifier si la personne concernée porte des lentilles de contact et les enlever si cela peut se faire facilement. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. En cas d'irritation ou de trouble visuel, consulter un médecin.
- Contact cutané : en cas de lésions cutanées, de rougeur ou de douleur persistante après l'application, consulter un médecin.
- Inhalation de grandes quantités : rester au repos en position semi-assise. Si des symptômes apparaissent, consulter immédiatement un médecin.

- Contact avec la bouche : rincer la bouche avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent et/ou en cas de contact avec de grandes quantités, contacter immédiatement le centre antipoisons.
- Si la personne concernée est inconsciente, ne pas donner de liquides ni provoquer de vomissements ; la placer en position de sécurité et consulter immédiatement un médecin.
- Garder le récipient ou l'étiquette à disposition.

#### 11.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

- Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans des cours d'eau, dans des canalisations (évier, toilettes...) ou dans les caniveaux.
- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la législation nationale (centre de recyclage).
  - L'emballage ne doit pas être réutilisé.

#### 11.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

- Ne pas conserver le produit pendant plus de 3 ans.

### 12. Autres informations

Le nombre de pulvérisations indiqué sur l'étiquette doit être adapté au taux d'application.

### 13. Informations administratives Meta-RCP 03

#### 13.1. Identifiant du Meta-RCP

**CINQ SUR CINQ LOTION-META3: CINQ SUR CINQ TROPIC**

#### 13.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

**166/19/L-M03-000**

#### 13.3. Type(s) de produit

**19**

### 14. Composition du Meta-RCP

#### 14.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EINECS	Teneur
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	35 % m/m

## 14.2. Type de formulation

Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 15. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP

Mentions de danger	H226 - Liquide et vapeurs inflammables H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 - Contient du 2-hexyl-3-phényl-2-propénal (trans & cis), du 2-hydroxybenzoate de benzyle, du (R)-p-mentha-1,8-diène, et du 3,7-diméthyl-6-octén-1-ol (citronellol). Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence	P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Note	/

## 16. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 03

### 16.1. Descriptions de l'utilisation N° 1

Tableau 1: Répulsif cutané contre les moustiques

Type(s) de produit	PT19-Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Moustiques Culex ( <i>Culex spp.</i> ) Moustiques Aedes ( <i>Aedes spp.</i> ) Moustiques Anopheles ( <i>Anopheles spp.</i> )  Adultes
Domaine d'utilisation	Application cutanée
Méthode d'application	Par pulvérisation. Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.

<p>Dose prescrite et fréquence d'application</p>	<p>Le taux d'application est de 0,48 mg/cm<sup>2</sup> de peau. Durée de protection : 5 heures en climat tropicale (Culex spp. et Aedes spp. : 6 heures ; Anopheles spp. : 5 heures)</p> <p>Nombre et fréquence des applications : – Enfants de 2 ans à 11 ans : 1 application par jour – Enfants et adultes (&gt; 11 ans) : 2 applications par jour</p> <table border="1" data-bbox="746 591 1422 763"> <thead> <tr> <th>Nombre de pulvérisations</th> <th>Tête</th> <th>Par main</th> <th>Par bras</th> <th>Par jambe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 – 5 ans</td> <td>1-2</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>6 – 11 ans</td> <td>1-2</td> <td></td> <td>1-2</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>Adultes et enfants à partir de 12 ans</td> <td>3-4</td> <td>1-2</td> <td>2-3</td> <td>4-5</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe	2 – 5 ans	1-2		1-2	1-2	6 – 11 ans	1-2		1-2	2-3	Adultes et enfants à partir de 12 ans	3-4	1-2	2-3	4-5
Nombre de pulvérisations	Tête	Par main	Par bras	Par jambe																	
2 – 5 ans	1-2		1-2	1-2																	
6 – 11 ans	1-2		1-2	2-3																	
Adultes et enfants à partir de 12 ans	3-4	1-2	2-3	4-5																	
<p>Catégorie(s) d'utilisateurs</p>	<p><b>Grand public</b></p>																				
<p>Emballage et Conditionnements</p>	<p>Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.</p> <p>Bouteille 75 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.</p>																				

16.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1

/

16.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1

/

16.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

16.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

16.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

## 17. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 03

### 17.1. Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

- Respecter les doses d'application recommandées.
- En cas d'inefficacité du traitement, l'utilisateur en informera le titulaire de l'enregistrement.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit avec d'autres produits répulsifs.
- En cas d'utilisation concomitante avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant d'appliquer le produit.
- La durée de protection est uniquement fournie à titre indicatif. Elle peut diminuer en fonction de facteurs environnementaux (comme une température élevée ou la vitesse du vent).
- Renouveler l'application après exposition à l'eau sans dépasser le nombre d'applications maximal recommandé.

### 17.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas pulvériser directement sur le visage. Pulvériser le produit dans la main, puis l'appliquer sur le visage.

- Pour les enfants, le produit doit être appliqué par un adulte.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- Appliquer le produit sur la peau et répartir uniformément avec les mains sur les zones suivantes :

- Adultes et enfants (> 11 ans) : appliquer sur la tête, le cou, les mains (paumes et dos), les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
- Enfants de 6 mois à 11 ans : appliquer sur la tête, le cou, les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.

- Se laver les mains avant de manipuler des aliments.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter de respirer les vapeurs / aérosols.
- Utiliser exclusivement en extérieur ou dans une pièce bien aérée.

### 17.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Contact oculaire : rincer immédiatement à l'eau courante, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Vérifier si la personne concernée porte des lentilles de contact et les enlever si cela peut se faire facilement. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. En cas d'irritation ou de trouble visuel, consulter un médecin.
- Contact cutané : en cas de lésions cutanées, de rougeur ou de douleur persistante après l'application, consulter un médecin.
- Inhalation de grandes quantités : rester au repos en position semi-assise. Si des symptômes apparaissent, consulter immédiatement un médecin.
- Contact avec la bouche : rincer la bouche avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent et/ou en cas de contact avec de grandes quantités, contacter immédiatement le centre antipoisons.

- Si la personne concernée est inconsciente, ne pas donner de liquides ni provoquer de vomissements ; la placer en position de sécurité et consulter immédiatement un médecin.
- Garder le récipient ou l'étiquette à disposition.

#### 17.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans des cours d'eau, dans des canalisations (évier, toilettes...) ou dans les caniveaux.

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la législation nationale (centre de recyclage).
- L'emballage ne doit pas être réutilisé.

#### 17.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

- Ne pas conserver le produit pendant plus de 2 ans.

### 18. Autres informations

Le nombre de pulvérisations indiqué sur l'étiquette doit être adapté au taux d'application.





## PARTIE 3 – NIVEAU D'INFORMATIONS 3, PRODUITS INDIVIDUELS PAR META-RCP

### 1. Nom (s) commercial (commerciaux), numéro et composition des produits individuels

#### - Produit 1

<b>Nom commercial (Noms commerciaux)</b>	<b>CINQ SUR CINQ LOTION-META 1: CINQ SUR CINQ FAMILLE</b>				
<b>Numéro</b>	<b>166/19/L-M01-001</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EINECS</b>	<b>Teneur</b>
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	20 % m/m

#### - Produit 2

<b>Nom commercial (Noms commerciaux)</b>	<b>CINQ SUR CINQ LOTION-META 2: CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES</b>				
<b>Numéro</b>	<b>166/19/L-M02-001</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EINECS</b>	<b>Teneur</b>
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	25 % m/m

#### - Produit 3

<b>Nom commercial (Noms commerciaux)</b>	<b>CINQ SUR CINQ LOTION-META 2: CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES NOUVELLE FORMULE</b>				
<b>Numéro</b>	<b>166/19/L-M02-002</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EINECS</b>	<b>Teneur</b>
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	25 % m/m

**- Produit 4**

<b>Nom commercial (Noms commerciaux)</b>	<b>CINQ SUR CINQ LOTION-META 3: CINQ SUR CINQ TROPIC</b>				
<b>Numéro</b>	<b>166/19/L-M03-001</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EINECS</b>	<b>Teneur</b>
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N- butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	35 % m/m

**- Produit 5**

<b>Nom commercial (Noms commerciaux)</b>	<b>CINQ SUR CINQ LOTION-META 3: SUR CINQ TROPIC NOUVELLE FORMULE</b>				
<b>Numéro</b>	<b>166/19/L-M03-002</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EINECS</b>	<b>Teneur</b>
Ethyl butylacetyl amino propionate	3-(N-acetyl-N- butyl) aminopropionic acid ethyl ester	Substance(s) active(s)	52304-36-6	257-835-0	35 % m/m