

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Ime družine: Omega Pharma IR3535

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0030287-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0030287-0000

Kazalo

Del I. - Prva raven informacij	1
1. Upravne informacije	1
2. Sestava in formulacija družine proizvodov	2
Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)	3
1. Administrativne informacije o meta SPC - Meta01	3
2. Sestava meta SPC	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	3
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	4
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	6
6. Druge informacije	8
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	8
1. Administrativne informacije o meta SPC - Meta02	9
2. Sestava meta SPC	9
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	9
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	10
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	19
6. Druge informacije	20
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	20
1. Administrativne informacije o meta SPC - Meta03	21
2. Sestava meta SPC	22
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	22
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	23
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	25
6. Druge informacije	26
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	26
1. Administrativne informacije o meta SPC - Meta04	27
2. Sestava meta SPC	27
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	28

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	28
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	31
6. Druge informacije	32
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	32

Del I. - Prva raven informacij

1. Upravne informacije

1.1. Ime družine

Omega Pharma IR3535

1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

1.3. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek Omega Pharma International n.v.

Naslov Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija

Številka dovoljenja

SI-0030287-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0030287-0000

Datum dovoljenja

24/03/2023

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

02/12/2032

1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Medgenix Benelux,

Naslov proizvajalca

Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija

Lokacije proizvodnje

Vliegveld 21, 8560 Wevelgem Belgija

Ime proizvajalca	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG,
Naslov proizvajalca	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1320 - Etil butil acetil aminopropionat
Ime proizvajalca	Merck KGaA,
Naslov proizvajalca	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Poligono Merck, 08100 Barcelone, Španija

2. Sestava in formulacija družine proizvodov

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propilen glikol lavrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

Meta01

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-1

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti	<p>Povzročča hudo draženje oči.</p> <p>Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p>
Previdnostni stavki	<p>Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>Po uporabi roke temeljito umiti.</p> <p>PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.</p>

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojni stadij: Odrasli osebki</p> <p>Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Culex komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki</p>
Področje uporabe	<p>Notranjost, znotraj</p> <p>Zunanost, zunaj</p> <p>Indoor; outdoor</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Odprt sistem</p> <p>Podroben opis: Nanos izdelka na kožo z mazanjem</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 1,0 g na 600 cm² (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)</p> <p>Redčenje (%): 0</p>

	<p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p>Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan</p> <p>Količina nanosa: 1,0 g na 600 cm² (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)</p> <p>Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	<p>Od 15 ml do 250 ml</p> <p>Plastenka za losjon: HDPE/PE Pokrovček za losjon: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla</p>

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.
Po nanosu nudi ta izdelek 4 ur zaščite pred komarji.
Uporaba je bila preverjena samo v zmernih pogojih.
Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan
Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan
Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.
Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.
Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.
Ne nanašajte v otroške dlani.
Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).
Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.
Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.
Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.
Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.
Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.
Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.
Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.
Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.
Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.
Navodila za prvo pomoč:
PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.
PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.
Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material.
Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.
Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.
Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev (v PP/HDPE)

6. Druge informacije

--

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Jungle Formula Anti Muggenlotion Kids	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Sensitive Lotion	Področje trženja: SI
	Jungle Formula for sensitive skin	Področje trženja: SI
	Jungle Formula 20% IR3535 lotion	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids lotion	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja <small>(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)</small>	SI-0030287-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,78

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

Meta02

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-2

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) –uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Culex komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem Podroben opis: Nanos pršila na kožo s pršilnikom
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerki: 1,0 g na 600 cm ² . Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 250 ml

Plastenka: PP/HDPE

Pršilnik: PE-PP

Pokrovček: PP

Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.
Po nanosu nudi ta izdelek 4 ure zaščite pred komarji.
Uporaba je dokazana samo v zmernih pogojih.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Repelent proti klopm – splošna uporaba (nad 6 mesecev) - uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Ixodes ricinus
Splošno ime: klopi
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Način(-i) uporabe

Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Znotraj; zunaj
Metoda: Odprt sistem Podroben opis: Nanos pršila na kožo s pršilnikom.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1,0 g na 600 cm ² . Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan
--

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 250 ml Plastenka: PP/HDPE Pršilnik: PE-PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonska škatla



4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.
Po nanosu nudi ta izdelek 8 ur zaščite pred klopi.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Repelent proti pikajočim insektom – splošna uporabe (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicoides spp. Splošno ime: Mušice Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Phlebotomus spp.
Splošno ime: Peščene muhe
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Vespula spp.
Splošno ime: Ose
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj
Zunanost, zunaj
Znotraj; zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:
Pršilnik - nanos na človeško kožo

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1,0 g na 600 cm². Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek)
Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan
Redčenje (%): 0
Število in časovni razpored uporabe:

Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan
Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 250 ml

Plastenka: PP/HDPE
Pršilnik: PE-PP
Pokrovček: PP
Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.
Po nanosu nudi ta izdelek 1 uro zaščite pred mušicami.
Po nanosu nudi ta izdelek 6 ur zaščite pred peščenimi muhami.
Odganja ose s kože do 2,5 uri.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.
Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.
Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.
V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.
Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.
Za nanos na obraz: razpršite odraslemu v dlan in nanesite zmerno količino na obraz odraslega ali otroka, pri čemer se izogibajte očem in ustom.
Ne nanašajte v otroške dlani.
Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).
Ko pršite v zaprtih prostorih, se prepričajte, da je prostor dobro prezračen, in se izogibajte vdihavanju pršila;
Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.
Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkah, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.
Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.
Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.
Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.
Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.
Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.
Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Navodila za prvo pomoč:
PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI: Izperite. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.
PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material
Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.
Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 24 mesecev (v PP/HDPE)

6. Druge informacije

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Jungle Formula 20% IR3535 spray	Področje trženja: SI
Jungle Formula Sensitive spray	Področje trženja: SI
Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids spray	Področje trženja: SI
Jungle Formula Multi-Insect spray	Področje trženja: SI

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

SI-0030287-0002 1-2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,92

Trgovsko ime

Jungle Formula Kids spray

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

SI-0030287-0003 1-2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,92

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

Meta03

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-3

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92
Propilen glikol lavrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Po uporabi roke temeljito umiti.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
Odstraniti vsebino .

Odstraniti posodo .

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae;
Splošno ime: Aedes komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Culicidae;
Splošno ime: Culex komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Zunanost, zunaj

Znotraj; zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:

Nanos izdelka na kožo z mazanjem

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1,0 g na 600 cm² (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)

Redčenje (%): 0

Število in časovni razpored uporabe:

Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan

Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Količina nanosa: 1,0 g na 600 cm² (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 100 ml

Tuba in vrat tube: PP/HDPE

Pokrovček: PP

Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.
Po nanosu nudi ta izdelek 5 ur zaščite pred komarji.
Uporaba je bila preverjena samo v zmernih pogojih.
Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.
Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.
V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.
Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.
Ne nanašajte v otroške dlani.
Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).
Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.
Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkov, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.
Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.
Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.
Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.
Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.
Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.
Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material

Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.

Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 30 mesecev (v PP/HDPE)

6. Druge informacije

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Moustikologne Haute tolérance crème bébé

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

SI-0030287-0004 1-3

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,82
Propilen glikol lavrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	6

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

Meta04

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-4

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Vnetljiva tekočina in hlapi.
Vsebuje alfa- in beta-pinen ter limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.
Hraniti na hladnem.
Po uporabi roke temeljito umiti.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti človeškim naglavnim ušem – splošna uporaba (2 leti in starejši) – uporaba na človeških laseh - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Pediculidae: Splošno ime: človeške naglavne uši Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem Podroben opis: Pršilnik - nanos na lase.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Otroci, stari 2 leti in več: nanesite do 11 razprškov na lase ob lasišču otroka. Odrasli: nanesite do 22 razprškov na lase ob lasišču odraslega, tako da jih po celotnem lasišču dobro zmočite. Popršite tudi po preostalih laseh, da jih popolnoma zmočite. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Enkrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 125 ml Plastenka: PP/HDPE Pumpica: PE-LD/PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.
Zagotovite, da ni prisotnih uši.
Če je potrebno, najprej uporabite pedikulicid. Izdelek ščiti samo pred novo okužbo.
Po nanosu odganja ta izdelek naglavne uši do 24 ur.
Nanesite vsako jutro na čiste in z brisačo posušene lase, potem ko ste jih oblikovali na običajen način.
Razpršite na lase blizu lasišča (med 2–5 cm) po celotnih laseh kot z lakom.
Pazite, da pokrijete vse lase, pri čemer bodite še posebej pozorni na predele blizu vratu in za ušesi. Poskrbite, da bodo lasišče in lasje zadosti navlaženi.
Pustite, da se lasje posušijo naravno brez uporabe toplote. Ne uporabite sušilnika za lase.
Nanos je potrebno ponoviti po umivanju las.
Primerno za uporabo pri odraslih in otrocih, starih 2 leti in več.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.
Ko pršite v zaprtih prostorih, poskrbite, da je prostor dobro prezračen in se izogibajte vdihavanju pršila.
Ne pršiti v oči.
Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.
V primeru uporabe na otroških laseh, morajo izdelek nanašati odrasli.
Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.
Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Navodila za prvo pomoč:
PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti

kože: umijte kožo z vodo.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material. Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.

Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in necljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščititi pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 24 mesecev (v PP/HDPE)

6. Druge informacije

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

Paranit zaščita pred ušmi

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja

SI-0030287-0005 1-4

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20,9
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	29,1
