

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Intra Hydrocare

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 05 - Pitna voda (razkužila)

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Številka dovoljenja: SI-0029059-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0029059-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	4
5. Splošna navodila za uporabo	10
5.1. Navodila za uporabo	10
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	10
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	10
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	11
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	11
6. Druge informacije	11

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Intra Hydrocare
EndoSan
Intra Hydro-pure
Intra Cup-clean
Intra Hydro pure
Clearrigation
WaterSafe

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Intracare B.V.
	Naslov	voltaweg 4 5466 AZ veghel Nizozemska
Številka dovoljenja	SI-0029059-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0029059-0000	
Datum dovoljenja	19/07/2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	01/07/2032	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Intracare B.V.,
Naslov proizvajalca	Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, Nizozemska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1315 - Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Rotterdam BV,
Naslov proizvajalca	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam, Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam, Nizozemska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	49,4

2.2. Vrsta formulacije

SL - topen koncentrat

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.

Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Ne vdihavati meglice.

Ne vdihavati hlapov.

Ne vdihavati razpršila.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

Preprečiti sproščanje v okolje.

Nositi zaščitne rokavice.

Nositi zaščitno obleko.

Nositi zaščito za oči.

Nositi zaščito za obraz.

PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z prho.

Takoj pokličite poison center/doctor.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pokličite poison center/doctor.

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Ob slabem počutju pokličite poison center/doctor.

Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

Ob požaru: Za gašenje se uporabi water.

Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Hraniti zaklenjeno.

Odstraniti vsebino lokalni/državni predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - 1 - Razkuževanje površin v prostorih za živali

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Splošno ime: Fungi Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Razkuževanje neporoznih trdih površin v prostorih za živali brez predhodnega čiščenja.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Grobo škropljenje.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: Uporabite 15-odstotno v/v raztopino. Redčenje (%): Število in časovni razpored uporabe: Posamezna uporaba.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE 1 l (bela), 5, 10, 20 ali kanistri HDPE 25 l (modri), boben HDPE (črni) 200 l in IBC HDPE 1000 l (modri ali črni), z vijačnim pokrovčkom HDPE.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Razpršite 15-odstotno raztopino z grobim pršenjem z nizkim ali srednjim pritiskom (na 1,5 litrov izdelka dodajte do 10 litrov vode iz pipe). Na 1 m² obdelane površine nanesite 0,1 l razredčenega izdelka. Čas stika je najmanj 30 minut. Uporabite toliko izdelka, da bo površina mokra za priporočeni čas stika. Obdelane površine po nanosu sperite s pitno vodo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pred obdelavo odstranite vso hrano, krmo in pijačo. Med ravnanjem z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (npr. guma) in si nato umijte roke. Nosite zaščitni kombinezon (vsaj tip 3, EN 14605), ki je neprepusten za biocidni pripravek (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Pri ravnanju z izdelkom je obvezna uporaba zaščite za oči. Obvezna je uporaba opreme za zaščito dihal (RPE) z zaščitnim faktorjem 20. Pri pripravi raztopine za uporabo ali pri pršenju je potreben vsaj dihalni aparat za čiščenje zraka s čelado/kapo/masko (TH1/TM1) ali polovična/polna maska s kombiniranim filtrom plin/P2 (tip filtra (črkovna oznaka, barva)). Med škropljenjem se nezaščitene osebe in živali ne smejo nahajati v tretiranih prostorih za živali. Na območje lahko vstopite, ko preteče 30 minut razkuževanja in površine sperete z vodo. Pri ponovnem vstopu se s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi (npr. senzor, določen čas prezračevanja) zagotovi podmerna vdihavanja AEC 1,25 mg/m³.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

--

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

--

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

--

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - 2 - Površinsko razkuževanje vodovodnih sistemov

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime:
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime:
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime:
Splošno ime: Fungi
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe	Notranjost, znotraj Površinsko razkuževanje vodovodnih sistemov s polnjenjem ali CIP: - cevovodni sistemi v velikih gostinskih kuhinjah, menzah, klavnicah in mesnicah. - ki se uporabljajo na veterinarskih območjih (sistemi pitne vode za živali (niso v uporabi)).
Način(-i) uporabe	Metoda: polnjenje ali CIP Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Za bakterije in kvasovke uporabite 2-odstotno v/v raztopino, za glivice pa 5-odstotno v/v raztopino. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Posamezna uporaba. Sobna temperatura.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE 1 l (bela), 5, 10, 20 ali kanistri HDPE 25 l (modri), boben HDPE (črni) 200 l in IBC HDPE 1000 l (modri ali črni), z vijačnim pokrovčkom HDPE.

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Sistem napolnite z 2-odstotno raztopino izdelka za nadzor bakterij in kvasovk ali 5-odstotno raztopino za nadzor glivic (na 2 ali 5 litrov izdelka dodajte vodo iz pipe do 100 litrov). Uporabite čas stika najmanj 10 ur pri temperaturi 20 °C. Med razkuževanjem dobro prezračite vodovodni sistem, da se izognete povečanju tlaka. Nato ga sperite z vodo kakovosti pitne vode, da odstranite sprano umazanijo.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med ravnanjem z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (npr. guma). Nosite zaščitno pokrivalo (vsaj tip 6, EN 13034), ki je neprepusten za biocidni pripravek (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Pri ravnanju z izdelkom je obvezna uporaba zaščite za oči. Obvezna je uporaba opreme za zaščito dihal (RPE) z zaščitnim faktorjem 10. Po uporabi si umijte roke.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

--

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

--

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - 3 - Dezinfekcija pitne vode za ohranjanje kakovosti vode v sistemu za distribucijo pitne vode za perutnino

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 05 - Pitna voda (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Dezinfekcija pitne vode za ohranjanje kakovosti vode v sistemu za distribucijo pitne vode za perutnino.
Način(-i) uporabe	Metoda: Neprekinjeno doziranje Podroben opis: Izdelek stalno odmerjajte v čisto vodo iz pipe, ki se uporablja kot pitna voda za živali.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Izdelek stalno odmerjajte v pitno vodo za živali v koncentraciji 0,025 % v/v, da ohranite kakovost pitne vode v sistemu za pitno vodo. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Neprekinjeno odmerjanje. Temperatura vode v distribucijskem sistemu: 20-30 C.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE 1 l (bela), 5, 10, 20 ali kanistri HDPE 25 l (modri), boben HDPE (črni) 200 l in IBC HDPE 1000 l (modri ali črni), z vijačnim pokrovčkom HDPE.

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek stalno odmerjajte v pitno vodo za živali v koncentraciji 0,025 % izdelka. Izdelek odmerite neposredno v pitno vodo ali pripravite npr. 2,5-odstotno raztopino (na 250 ml izdelka dodajte do 10 litrov vode iz pipe) in razredčen izdelek z dozirno napravo odmerite kot 1 % v pitno vodo. Uporabljajte v sistemih za čisto pitno vodo. Uporabljajte samo za vodo v cevovodih (ne za vodne rezervoarje).

Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji s peroralnim cepljenjem. Prenehajte obdelavo z izdelkom vsaj 24 ur pred odmerjanjem peroralnega cepljenja, do 24 ur po njem.

Za vsako vrsto sistema za pitno vodo za živali je priporočljivo redno spremljanje mikrobne kakovosti pitne vode, da se doseže učinkovita uporaba.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med ravnanjem z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (npr. guma). Nosite zaščitno pokrivalo (vsaj tip 6, EN 13034), ki je neprepusten za biocidni pripravek (material kombinacija določa imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Pri ravnanju z izdelkom je obvezna uporaba zaščite za oči. Obvezna je uporaba opreme za zaščito dihal (RPE) z zaščitnim faktorjem 10. Po uporabi si umijte roke.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - 4 - Dezinfekcija biofilmov v vodovodnih sistemih (kurativna)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Splošno ime: biofilm Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Razkuževanje biofilma v vodovodnih sistemih (kurativno) s polnjenjem ali CIP po predhodnem čiščenju: - ki se uporabljajo na industrijskem območju - ki se uporabljajo v prostorih za predelavo hrane in pijač, vključno z naslednjimi: cevovodni sistemi v velikih gostinskih kuhinjah, menzah, klavnica in mesnicah - ki se uporabljajo na veterinarskem področju - ki se uporabljajo v rastlinjakih (sistemi pitne vode za živali (ki niso v uporabi), vodovodne naprave, vodovodni cevovodi, namakalni sistemi, naprave za škropljenje in kapljični sistemi)
Način(-i) uporabe	Metoda: Polnjenje ali CIP Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporabite 5 % v/v raztopino izdelka. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Posamezna uporaba. Temperatura: sobna temperatura.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Plastenka HDPE 1 l (bela), 5, 10, 20 ali kanistri HDPE 25 l (modri), boben HDPE (črni) 200 l in IBC HDPE 1000 l (modri ali črni), z vijačnim pokrovčkom HDPE.

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Vodni sistem napolnite s 5-odstotno raztopino izdelka (na 5 litrov izdelka dodajte do 100 litrov vode iz pipe). Uporabite najmanj 10 ur stika. Med razkuževanjem dobro prezračite vodovodni sistem, da se izognete povečanju tlaka. Nato ga sperite z vodo kakovosti pitne vode, da odstranite sprano umazanijo.

Stik z bakrom lahko zmanjša učinkovitost, zato je treba učinkovitost potrditi, kadar se sredstvo uporablja v bakrenih ceveh brez prekoračitve odmerka.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med ravnanjem z izdelkom nosite zaščitne kemijsko odporne rokavice (npr. guma). Nosite zaščitno pokrivalo (vsaj tip 6, EN 13034), ki je neprepusten za biocidni pripravek (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Pri ravnanju z izdelkom je obvezna uporaba zaščite za oči. Obvezna je uporaba opreme za zaščito dihal (RPE) z zaščitnim faktorjem 10. Po uporabi si umijte roke.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Glejte navodila za uporabo za posamezno uporabo.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je mogoče, odmerjajte iz originalne embalaže.

Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi sredstvi za čiščenje ali razkuževanje.

Ne uporabljajte v zgoščeni obliki.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

PRI VDIHAVANJU: Premaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, ki je udoben za dihanje. V primeru simptomov: Pokličite 112/ambulanto za zdravniško pomoč. Če ni simptomov: Pokličite center za strupe ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Takoj sperite usta. Če izpostavljena oseba lahko pogoltne, ji dajte nekaj za pitje. NE povzročajte bruhanja. Pokličite 112/ambulanto za zdravniško pomoč. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: Po potrebi začnite izvajati ukrepe za ohranjanje življenjskih funkcij, nato pa pokličite center za zastrupitve.

PRI STIKU Z KOŽO: Takoj umijte kožo z veliko vode. Nato slecite vsa kontaminirana oblačila in jih pred ponovno uporabo operite. Kožo še naprej umivajte z vodo 15 minut. Pokličite center za strupe ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Takoj sperite z vodo za nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Izpiranje nadaljujte vsaj 15 minut. Pokličite 112/ambulanto za zdravniško pomoč.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite v originalni embalaži. Posodo hranite tesno zaprto.
Rok trajanja: 24 mesecev (če se hrani v skladu z opisanimi pogoji shranjevanja).

6. Druge informacije