

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Meta04.SE

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0030287-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0030287-0005

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	7

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Paranit zaščita pred ušmi

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Omega Pharma International n.v.
	Naslov	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
Številka dovoljenja	SI-0030287-0000 1-4	

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0030287-0005

Datum dovoljenja

24/03/2023

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

02/12/2032

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG,
Naslov proizvajalca	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

Ime proizvajalca	Medgenix Benelux,
Naslov proizvajalca	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija
Lokacije proizvodnje	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem Belgija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1320 - Etil butil acetil aminopropionat
Ime proizvajalca	Merck KGaA,
Naslov proizvajalca	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Poligono Merck, 08100 Barcelone, Španija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20,9
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	29,1
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0
Propilen glikol lavrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Vrsta formulacije

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Vnetljiva tekočina in hlapi.

Vsebuje alfa- in beta-pinen ter limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.

Hraniti na hladnem.

Po uporabi roke temeljito umiti.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti človeškim naglavnim ušem – splošna uporaba (2 leti in starejši) – uporaba na človeških laseh - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Pediculidae:
Splošno ime: človeške naglavne uši
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Zunanjost, zunaj

	Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem Podroben opis: Pršilnik - nanos na lase.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Otroci, stari 2 leti in več: nanesite do 11 razprškov na lase ob lasišču otroka. Odrasli: nanesite do 22 razprškov na lase ob lasišču odraslega, tako da jih po celotnem lasišču dobro zmočite. Popršite tudi po preostalih laseh, da jih popolnoma zmočite. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Enkrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 125 ml Plastenka: PP/HDPE Pumpica: PE-LD/PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.
Zagotovite, da ni prisotnih uši.
Če je potrebno, najprej uporabite pedikulicid. Izdelek ščiti samo pred novo okužbo.
Po nanosu odganja ta izdelek naglavne uši do 24 ur.
Nanesite vsako jutro na čiste in z brisačo posušene lase, potem ko ste jih oblikovali na običajen način.
Razpršite na lase blizu lasišča (med 2–5 cm) po celotnih laseh kot z lakom.
Pazite, da pokrijete vse lase, pri čemer bodite še posebej pozorni na predele blizu vratu in za ušesi. Poskrbite, da bodo lasišče in lasje zadosti navlaženi.
Pustite, da se lasje posušijo naravno brez uporabe toplote. Ne uporabite sušilnika za lase.
Nanos je potrebno ponoviti po umivanju las.
Primerno za uporabo pri odraslih in otrocih, starih 2 leti in več.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.
Ko pršite v zaprtih prostorih, poskrbite, da je prostor dobro prezračen in se izogibajte vdihavanju pršila.
Ne pršiti v oči.
Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.
V primeru uporabe na otroških laseh, morajo izdelek nanašati odrasli.
Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.
Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Navodila za prvo pomoč:
PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.
PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material. Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.
Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščititi pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 24 mesecev (v PP/HDPE)

6. Druge informacije