

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-AF065014-64 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **MAGNUM GEL CUCARACHAS** από την Ισπανία, με αρ. άδειας **ES/APP(NA)-2017-18-00449** και ημερ. **29/08/2017**,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **MAGNUM GEL** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0199

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/07/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

29/08/2022

2. Κάτοχος της άδειας:

MYLVA S.A.

Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Catalonia, Ισπανία

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

MAGNUM GEL

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:
Imidacloprid 2,15 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 97,78% β/β (περιέχει πικραντικό παράγοντα)

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

MYLVA S.A, Ισπανία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Imidacloprid

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία: 97%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A., Ισπανία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

- Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 29/08/2022.
- Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
- Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

- Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται πτοινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 20/07/2021



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
MAGNUM GEL

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0199

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
MAGNUM GEL SERPA GEL ULTRA EC GEL ROACHES AROXOL GEL PRO	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	MYLVA S.A.
	Διεύθυνση	Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Catalonia, Ισπανία
Αριθμός άδειας	KY-0199	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	20/07/2021	
Ημερομηνία λήξης άδειας	29/08/2022	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	MYLVA S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Catalonia, Ισπανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Sant Galderic 23, poligon industrial ponent, Sant pol de Mar 08395 Barcelona (Catalonia), Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Príncipe de Vergara, 110, 5º, 28002 Madrid, Ισπανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Adama Makhteshim Ltd. Neot-Hovav Eco-Industrial Park, 84100 Beer Sheva, Ισραήλ

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,15

Βοηθητικές ουσίες - εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	EUH208 περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one and 2-octyl-1,2-thiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες. Για εσωτερικούς χώρους. Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της συγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: Γερμανικές κατσαρίδες (<i>Blattella germanica</i>), Ανατολικές κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>), Αμερικάνικες κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Σε σχισμές και χαραμάδες.
Μέθοδος εφαρμογής	Εφαρμόστε απευθείας από τη σύριγγα με τη μορφή σταγόνας.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόσεις: εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το είδος της κατσαρίδας. (1 σταγόνα = 0,04γρ) - Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 γρ/m ² (3-4 σταγόνες/m ²). - Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24γρ/m ² (4-6 σταγόνες/m ²). - Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>): 0,16-0,24γρ/m ² (4-6 σταγόνες/m ²). Συχνότητα εφαρμογής: μία (1) εφαρμογή ανά 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον η προσβολή παραμένει. Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την εξαφάνιση της προσβολής.
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Σύριγγα από πλαστικό (LDPE) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 γραμμάρια.

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Τοποθετήστε το δόλωμα μόνο σε σχισμές και χαραμάδες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοιχτές επιφάνειες.
- Μην κάνετε χρήση του προϊόντος σε χώρους όπου έχει γίνει εφαρμογή άλλων χημικών ή σε χώρους όπου πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο εντομοκτόνο.
- Μην το εφαρμόζετε επάνω σε ξύλο ή άλλες πορώδεις επιφάνειες.
- Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή.
- Μην τοποθετείτε τις σταγόνες σε σημεία εκτεθειμένα στον ήλιο ή πηγές θερμότητας.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Μην εφαρμόζετε σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε παιδιά.

Η εφαρμογή πρέπει να περιορίζεται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ζώα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες ή σκεύη που έρχονται σε επαφή με τροφές και τρόφιμα.
Χρήση μόνο σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση και μακριά από το νερό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό χωρίς να τρίβετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Μην ξεχνάτε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.

Εφόσον απαιτείται να πάτε στο νοσοκομείο, δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος. Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδειξεις χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδειξεις χρήσης.

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες. Για εσωτερικούς χώρους. Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: Γερμανικές κατσαρίδες (<i>Blattella germanica</i>), Ανατολικές κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>), Αμερικάνικες κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Κατοικημένα κτίρια και επαγγελματικοί χώροι.
Μέθοδος εφαρμογής	Εφαρμόστε με τη μορφή σταγόνας απευθείας από τη σύριγγα ή το φυσίγγιο.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόσεις: εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το είδος της κατσαρίδας. (1 σταγόνα =0,04γρ) - Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 γρ/ m ² (3-4 σταγόνες/ m ²). - Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24γρ/ m ² (4-6 σταγόνες/ m ²). - Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>): 0,16-0,24γρ/ m ² (4-6 σταγόνες/ m ²).

	Συχνότητα εφαρμογής: μία (1) εφαρμογή ανά 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον η προσβολή παραμένει. Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την εξαφάνιση της προσβολής.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες.
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Σύριγγα από πλαστικό (LDPE) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 γραμμάρια Φυσίγγιο από πλαστικό (LDPE) 15, 20, 30, 35, 40 & 50 γραμμάρια.

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Τοποθετήστε το δόλωμα μόνο σε σχισμές και χαραμάδες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοιχτές επιφάνειες.
- Μην κάνετε χρήση του προϊόντος σε χώρους όπου έχει γίνει εφαρμογή άλλων χημικών ή σε χώρους όπου πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο εντομοκτόνο.
- Μην το εφαρμόζετε επάνω σε ξύλο ή άλλες πορώδεις επιφάνειες.
- Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή.
- Μην τοποθετείτε τις σταγόνες σε σημεία εκτεθειμένα στον ήλιο ή πηγές θερμότητας.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Φορέστε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Μην εφαρμόζετε σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε παιδιά.
Η εφαρμογή πρέπει να περιορίζεται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ζώα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται, ετοιμάζονται, καταναλώνονται ή αποθηκεύονται τροφές και τρόφιμα.
Μπορεί να εφαρμοστεί στη βιομηχανία τροφίμων, απουσία τροφίμων, ή σε αποθηκευτικούς χώρους όπου τα προϊόντα διατηρούνται εντός συσκευασιών.
Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, ο εξοπλισμός ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε χώρους που προηγουμένως έχει εφαρμοστεί το προϊόν δεν περιέχουν υπολείμματα της δραστικής ουσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σε κρυφά σημεία, με δύσκολη πρόσβαση, και μακριά από το νερό.
Υιοθετήστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, όπως ο συνδυασμός χημικών & φυσικών μεθόδων και άλλων μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματολογικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).
Ελέγχετε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να διερευνηθεί η αιτία μειωμένης αποτελεσματικότητας ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόνοιες ή αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό χωρίς να τρίβετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Μην ξεχνάτε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.

Εφόσον απαιτείται να πάτε στο νοσοκομείο, δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος. Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Δόλωμα εντός δολωματικών σταθμών. Για εσωτερικούς χώρους. Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel εντός δολωματικού σταθμού για την καταπολέμηση κατσαρίδων.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: Γερμανικές κατσαρίδες (<i>Blattella germanica</i>), Ανατολικές κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>), Αμερικανικές κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι.
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>ΔΟΣΕΙΣ: 0,2-0,4γρ./m² ανάλογα με την ένταση της προσβολής χρησιμοποιήστε τον απαιτούμενο αριθμό δολωματικών σταθμών:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά χώρο για χαμηλή προσβολή (5γραμ. προϊόντος/22m²)• 4 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά χώρο με υψηλή προσβολή (10γραμ./22 m²) <p>Συχνότητα εφαρμογής: κάθε 4 εβδομάδες, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να αντικαθίστανται με νέους εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει προσβολή</p>

	Συχνότητα επέμβασης: τρεις (3) μήνες μετά την εξάλειψη της προσβολής η επέμβαση πρέπει να επαναληφθεί
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικοί (PET) μαύροι δολωματικοί σταθμοί με περιεχόμενο 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 γραμμάρια δολώματος.

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Τοποθετήστε το προϊόν σε σκοτεινά και υγρά σημεία: κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την τουαλέτα, κοντά σε σωλήνες αποχέτευσης.

Άνοιγμα δολωματικού σταθμού: αφαιρέστε τα δύο άκρα του δολωματικού σταθμού στην ήδη χαραγμένη γραμμή.

1. Ενεργοποίηση δολωματικού σταθμού: πιέστε με δύναμη την κάψουλα όλο το δόλωμα να πρωθηθεί στο κεντρικό σημείο του σταθμού. Μην αφαιρείτε την κάψουλα μετά την ενεργοποίηση του σταθμού.
2. Τοποθέτηση δολωματικού σταθμού: τοποθετήστε τον ενεργοποιημένο δολωματικό σταθμό στα σημεία όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Δόλωμα εντός δολωματικών σταθμών. Για εσωτερικούς χώρους. Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel εντός δολωματικού σταθμού για την καταπολέμηση κατσαρίδων.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: Γερμανικές κατσαρίδες (<i>Blattella germanica</i>), Ανατολικές κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>), Αμερικανικές κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>)

Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι.
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>ΔΟΣΕΙΣ: 0,2-0,4γρ./m² ανάλογα με την ένταση της προσβολής χρησιμοποιήστε τον απαιτούμενο αριθμό δολωματικών σταθμών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά χώρο για χαμηλή προσβολή (5γραμ. προϊόντος/22m²) • 4 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά χώρο με υψηλή προσβολή (10γραμ./22 m²) <p>Συχνότητα εφαρμογής: κάθε 4 εβδομάδες, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να αντικαθίστανται με νέους εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει προσβολή</p> <p>Συχνότητα επέμβασης: τρεις (3) μήνες μετά την εξάλειψη της προσβολής η επέμβαση πρέπει να επαναληφθεί.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες.
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικοί (PET) μαύροι δολωματικοί σταθμοί με περιεχόμενο 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 γραμμάρια δολώματος.

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Τοποθετήστε το προϊόν σε σκοτεινά και υγρά σημεία: κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την τουαλέτα, κοντά σε σωλήνες αποχέτευσης

Άνοιγμα δολωματικού σταθμού: αφαιρέστε τα δύο άκρα του δολωματικού σταθμού στην ήδη χαραγμένη γραμμή.

1. Ενεργοποίηση δολωματικού σταθμού: πιέστε με δύναμη την κάψουλα όλο το δόλωμα να πρωθηθεί στο κεντρικό σημείο του σταθμού. Μην αφαιρείτε την κάψουλα μετά την ενεργοποίηση του σταθμού.
2. Τοποθέτηση δολωματικού σταθμού: τοποθετήστε τον ενεργοποιημένο δολωματικό σταθμό στα σημεία όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες.

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Οι σταθμοί δεν πρέπει να ανοίγονται

Μην εισάγετε δάκτυλα εντός των ανοιγμάτων του σταθμού.

Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή και απαλλαχθείτε από τα έντομα, συλλέξτε τους σταθμούς.

Εφαρμόστε μεθόδους για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κατσαρίδων, όπως συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα μέτρα διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, αλλά και τοπικούς περιορισμούς (έντομο στόχος, κλιματικές συνθήκες, συνθήκες χρήσης κλπ).

Ελέγχετε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος στο πεδίο της εφαρμογής: η μειωμένη αποτελεσματικότητα μπορεί να οφείλεται σε φαινόμενα ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ή εντοπίστε πιθανές περιπτώσεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνθήκες όπου υπάρχει περίπτωση να έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα ή έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει ανθεκτικότητα.

Πληροφορήστε τον κάτοχο της άδειας του προϊόντος σε περίπτωση μειωμένης αποτελεσματικότητας.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Δες ειδικές υποδείξεις χρήσης.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις προτεινόμενες δόσεις και τα μεσοδιαστήματα επεμβάσεων.

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσής του από ζώα και παιδιά.

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, τα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Συμβουλές για ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό:

Εφαρμόστε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία

Σε περίπτωση που απαιτείται ιατρική συμβουλή, επικοινωνήστε το κέντρο δηλητηριάσεων έχοντας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις:

Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), αποχετεύσεις κ.λ.π. με την κατασκευή προστατευτικών εμποδίων και κλείνοντας τους

αγωγούς αποχέτευσης.

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για την αποτροπή διαρροών στο νερό και το αποχετευτικό σύστημα.

Μέθοδοι με μέσα για τον περιορισμό διαρροής και τον καθαρισμό: απορροφήστε τη διαρροή με αδρανή υλικά (άμμος, καολίνης κλπ), συλλέξτε και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία ώστε να γίνει χειρισμός ως επικίνδυνα απόβλητα.

Ειδικές περιπτώσεις ανά χρήση αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανόνες.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Η προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5°C και 45°C.

Η σταθερότητα στην αποθήκευση του προϊόντος, εφόσον παραμείνει στην αρχική του συσκευασία, είναι δύο (2) χρόνια υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην το αποθηκεύσετε στο άμεσο ηλιακό φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά αποκρουστικό στον άνθρωπο και τα κατοικίδια.

Ο αιτών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ευρύ κοινό μπορεί να αντιληφθεί τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδών κατασαρίδων και τα επίπεδα των προσβολών και να εφαρμόζει την κατάλληλη δόση.