

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: Dipal RTU

Grupa produktowa: Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Numer pozwolenia: PL/2019/0422/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0012645-0006

Spis treści

| | |
|---|---|
| Informacje administracyjne | 1 |
| 1.1. Nazwa handlowa produktu | 1 |
| 1.2. Posiadacz pozwolenia | 1 |
| 1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych | 1 |
| 1.4. Producent (-ci) substancji czynnych | 1 |
| 2. Skład i postać użytkowa produktu | 2 |
| 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego | 2 |
| 2.2. Rodzaj postaci użytkowej | 2 |
| 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności | 2 |
| 4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem | 2 |
| 5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania | 7 |
| 5.1. Instrukcje stosowania | 7 |
| 5.2. Środki zmniejszające ryzyko | 7 |
| 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach | 8 |
| 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania | 8 |
| 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania | 8 |
| 6. Inne informacje | 8 |

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

| |
|-----------|
| Dipal RTU |
|-----------|

1.2. Posiadacz pozwolenia

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Nazwa i adres posiadacza pozwolenia | Nazwa | DeLaval NV |
| | Adres | Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia |
| Numer pozwolenia | PL/2019/0422/MR/BPF 1-3 | |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Numer referencyjny w R4BP 3 | PL-0012645-0006 |
| Data udzielenia pozwolenia | 16/10/2019 |
| Data ważności pozwolenia | 01/08/2029 |

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

| | |
|--|---|
| Nazwa producenta substancji czynnej | DeLaval NV |
| Adres producenta substancji czynnej | Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia |

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

| | |
|--|---|
| Substancja czynna | 1319 - Jod |
| Nazwa producenta substancji czynnej | Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A. |
| Adres producenta substancji czynnej | SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Belgia |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Chile |

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC | Funkcja | Numer CAS | Numer WE | Zawartość (%) |
|--------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Jod | | Substancja czynna | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15 |
| Alcohol ethoxylaat | | | 68439-46-3 | | 1,25 |
| Natrium iodide | | | 7681-82-5 | 231-679-3 | 0,065 |

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • płyn, gotowy do użycia na bazie wody (META ChPB1- 4 oraz META ChPB 6-7) |
|---|

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

| |
|------------------------|
| |
| Chronić przed dziećmi. |

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych: Poudojowa dezynfekcja strzyków metodą zanurzania ręcznego przez użytkownika profesjonalnego

| | |
|--|---|
| Grupa produktowa | Gr. 03 - Higiena weterynaryjna |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem | brak |
| Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju) | Nazwa naukowa: bakterie Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - Nazwa naukowa: drożdże Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - Nazwa naukowa: wirusy Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - |
| Obszar zastosowania | Wewnątrz Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych (krowy mleczne, owce, kozy) do zastosowania po udoju. |
| Sposób (-oby) nanoszenia | Ręczna metoda zanurzania przy użyciu kubka zanurzeniowego - - |
| Dawka (-i) i częstość nanoszenia | - - - Do stosowania po udoju. Produkt gotowy do użycia stosować po udoju (2 razy dziennie). Produkt można używać przez cały rok w okresie laktacji. Ilość produktu stosowanego w ciągu jednego zabiegu: <ul style="list-style-type: none">• krowy: 5 ml/zwierzę• owce: 2,5 ml/zwierzę• kozy: 2,5 ml/zwierzę |
| Kategoria (-e) użytkowników | Profesjonalny |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | <ul style="list-style-type: none">• Puszka (HDPE) o pojemności 5 L; 10 L; 20 L; 60 L,• Beczka (HDPE) o pojemności 200 L,• IBC (HDPE) o pojemności 1000 L. |

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej.
- Produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20°C przed zastosowaniem.
- Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas udoju i aplikacji produktu w celu ochrony skóry oraz zapewnienia higienicznych warunków dojenja.
- Do aplikacji produktu używać czystego kubka zanurzeniowego.

- Przed zastosowaniem produktu, należy wyczyścić i osuszyć wymię i strzyki.
- Natychmiast po udoju zanurzyć każdy strzyk w produkcie. Upewnić się, że produkt pokrył co najmniej 3/4 długości strzyku. W razie potrzeby uzupełnić kubek zanurzeniowy świeżym roztworem w wymaganej ilości.
- Dopilnować aby produkt nie został usunięty przez co najmniej 5 minut po aplikacji (np. utrzymując zwierzę w pozycji stojącej).

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych: Poudojowa dezynfekcja strzyków metodą ręcznego rozpylania przy użyciu rozpylacza przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

brak

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: bakterie
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: drożdże
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: wirusy
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Obszar zastosowania

| | |
|--|---|
| Sposób (-oby) nanoszenia | Wewnątrz |
| | Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych (krowy mleczne, owce, kozy) do zastosowania po udoju |
| | Ręczne rozpylanie przy użyciu rozpylacza - - |
| Dawka (-i) i częstość nanoszenia | <p>-----</p> <p>Do stosowania po udoju. Produkt gotowy do użycia stosować po udoju (2 razy dziennie). Produkt można używać przez cały rok w okresie laktacji. Ilość produktu stosowanego w ciągu jednego zabiegu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krowy: 5 ml/zwierzę • owce: 2,5 ml/zwierzę • kozy: 2,5 ml/zwierzę |
| Kategoria (-e) użytkowników | Profesjonalny |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | <ul style="list-style-type: none"> • Puszka (HDPE) o pojemności 5 L; 10 L; 20 L; 60 L, • Beczka (HDPE) o pojemności 200 L, • IBC (HDPE) o pojemności 1000 L. |

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej.
- Produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20°C przed zastosowaniem.
- Do aplikacji produktu używać czystego rozpylacza.
- Przed zastosowaniem produktu, należy wyczyścić i osuszyć wymię i strzyki.
- Natychmiast po udoju zaaplikować produkt na każdy strzyk:
 - o rozpylacz ręczny: należy rozpylać produkt na każdy strzyk przez co najmniej 1 sekundę. Upewnić się, że produkt pokrył co najmniej 3/4 długości strzyku. W razie potrzeby uzupełnić rozpylacz świeżym roztworem w wymaganej ilości.
 - o rozpylacz automatyczny: należy rozpylać produkt na każdy strzyk przez co najmniej 1 sekundę.
- Dopilnować aby produkt nie został usunięty przez co najmniej 5 minut po aplikacji (np. utrzymując zwierzę w pozycji stojącej).

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- W trakcie stosowania produktu nosić chemicznie odporne rękawice ochronne (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.3 Opis użycia

Zastosowanie 3 - Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych: Poudojowa dezynfekcja strzyków metodą automatycznego zanurzania lub rozpylania przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

brak

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: bakterie
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: drożdże
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: wirusy
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych (krowy mleczne, owce, kozy) do zastosowania po udoju.

Sposób (-oby) nanoszenia

Automatyczne zanurzanie lub rozpylanie przy użyciu robota -
-

Dawka (-i) i częstość nanoszenia

Do stosowania po udoju.
Produkt gotowy do użycia stosować po udoju (3 razy dziennie).
Produkt można używać przez cały rok w okresie laktacji.
Ilość produktu stosowanego w ciągu jednego zabiegu:
• krowy: 5 ml/zwierzę
• owce: 2,5 ml/zwierzę
• kozy: 2,5 ml/zwierzę

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

- Puszka (HDPE) o pojemności 5 L; 10 L; 20 L; 60 L,

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

- Beczka (HDPE) o pojemności 200 L,
- IBC (HDPE) o pojemności 1000 L.

4.3.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej.
- Produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20°C przed zastosowaniem

4.3.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.3.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.3.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.3.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

patrz sekcja 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Jeśli wymagana jest dezynfekcja zarówno przed jak i po udoju, to do dezynfekcji wykonywanej przed udojem należy użyć innego środka, który nie zawiera jodu

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane: Brak innych niż wynikają z klasyfikacji produktu.

Pierwsza pomoc:

Narażenie przez kontakt z oczami: Natychmiast przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli po przemyciu objawy nadal występują, należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Narażenie przez kontakt ze skórą: Natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem po uprzednim usunięciu zanieczyszczonej odzieży i obuwia.

Narażenie przez drogi pokarmowe: Wypłukać usta wodą. W przypadku wystąpienia objawów lub spożycia dużej ilości produktu należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Narażenie przez drogi oddechowe: Należy wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze.

Środki ochrony środowiska:

- Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji.
- W przypadku rozlania lub wycieku należy zebrać produkt w celu bezpiecznej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (np. ręczniki papierowe) oraz pozostałości nieużytego produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Zużyty produkt można usuwać do systemu ścieków komunalnych lub do gnojowni, w zależności od lokalnych przepisów.
- Unikać przedostania się do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do środowiska.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w temperaturze poniżej 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze poniżej 30°C.

6. Inne informacje

Kategoria zagrożenia - Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie - Nie dotyczy