



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID  
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**  
CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID  
NR. RO/2019/0024/MRA/IT/2012/0021/AUT

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 28.06.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : ITALIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : IT/2012/0021/AUT

II. Data emiterii autorizatiei: 28.06.2019

III. Data expirării autorizatiei: 31.12.2022

**IV.**

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID : NOCURAT PARAFINA

**V.**

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI : I.N.D.I.A Industrie chimiche S.r.l

Via Sorgagli, 25, 35020, Arre Padova Italia

Prin firma : Biotur Exim DRL, Turnu Magurele, General Praporgescu, nr. 48, jud. Teleorman, Romania.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: I.N.D.I.A Industrie chimiche S.r.l

Via Sorgagli, 25, 35020, Arre Padova Italia

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Industrialchimica Srl

Via Sorgagli, 25, 35020, Arre Padova Italia

Loc de producție : Via Sorgagli, 25, 35020, Arre Padova Italia

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: Activa s.r.l.

Adresa: Via Feltre 32, 20132, Milano, Italia

Loc de producție : Tezza S.r.l., via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR), Italia



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
 Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**  
 VI. TIPUL DE PRODUS : T14 Rodenticide

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : Profesioniști instruiți (experti)  
 Profesional, industrial (specialisti)

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeala rodenticida sub forma de bloc cerat

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanta activă

Denumirea IUPAC	Difenacoum
Numar CAS	56073-07-5
Numar CE	259-978-4
Continut de substanță activă	0,005%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifică

Denumirea IUPAC	Denatonium benzoate
Numar CAS	3734-33-6
Numar CE	223-095-2
Continut de substanță activă	0,001%

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Simboluri	GHS08 Pericol
Fraze de pericol (H)	H360D- Poate dăuna fătului. H373- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudenta (P)	P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P202- A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P280 -Purtați mănuși de protecție. P308+P313- ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P501- Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale și internaționale.
Pictograma(e)	

XI. AMBALAREA

Șoareci de casă (Mus musculus, tineret și adulți) – profesional, industrial – la interior



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

Produs de momeală: unități de 10g și de 20 g.

Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg.

Dacă este cazul, ambalajul este limitat la pungi separat ambalate, cu dimensiunea maximă per sac de 10 kg.

Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

Șobolani (Rattus norvegicus-șobolanul brun - tineret și adulți si Rattus rattus-sobolanul negru-tineret și adulți) – profesional, industrial – la interior

Produs de momeală: unități de 10g și de 20 g.

Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg.

Dacă este cazul, ambalajul este limitat la pungi separat ambalate, cu dimensiunea maximă per sac de 10 kg.

Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

Șoareci de casă și șobolani (Mus musculus-șoarecele de casă- tineret și adulți, Rattus norvegicus - șobolanul brun - tineret și adulți si Rattus rattus-sobolanul negru- tineret și adulți) – profesional, industrial – la exterior în jurul clădirilor

Produs de momeală: unități de 10g și de 20 g.

Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg.

Dacă este cazul, ambalajul este limitat la pungi separat ambalate, cu dimensiunea maximă per sac de 10 kg.

Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

Șoareci și șobolani (Mus musculus - șoarecele de casă - tineret și adulți, Rattus norvegicus-șobolanul brun- tineret și adulți si Rattus rattus-sobolanul negru- tineret și adulți)– experți (utilizare profesionala cu instruire) – în interior

Produs de momeală: unități de 10g și de 20 g.

Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg.

Dacă este cazul, ambalajul este limitat la pungi separat ambalate, cu dimensiunea maximă per sac de 10 kg.

Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

Șoareci de casă și șobolani (Mus musculus-șoarecele de casă- tineret și adulți, Rattus norvegicus - șobolanul brun - tineret și adulți si Rattus rattus-sobolanul negru- tineret și adulți) – experți (utilizare profesionala cu instruire) – la exterior în jurul clădirilor

Produs de momeală: unități de 10g și de 20 g.

Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg.

Dacă este cazul, ambalajul este limitat la pungi separat ambalate, cu dimensiunea maximă per sac de 10 kg.

Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

Șobolani (Rattus norvegicus-șobolanul brun - tineret și adulți si Rattus rattus-sobolanul negru-

**COPIE**

**COPIE**



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIIDE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

tinere (si adulti) – exportii (utilizarea profesionala cu instruire) – in exterior, zone deschise

Produs de momela: unitati de 10g si de 20 g.

Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg.

Dacă este cazul, ambalajul este limitat la pungi separat ambalate, cu dimensiunea maximă per sac de 10 kg.

Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

**XII. POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE**

Asupra sănătății umane: Efecte directe : Acest produs este un rodenticid de tip cumarinic care contine o substanta activa anticoagulanta (brodifacum), derivata din cumarina care inhiba vitamina K si blocheaza formarea de protrombina . Daca este inghitita , simptomele , care pot fi intarziate , pot include sangerari nazale si gingivoragii. In cazuri severe, pot aparea echimoze si sangerari in scaun sau urina .

Produsul este considerat periculos pentru sanatatea umana in concordanta cu Directiva 67/578/CEE si cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), produsul este clasificat STOT Re 1- provoaca leziuni ale organelor (sange) in cazul unei expuneri repetate sau prelungite, operarii trebuie sa fie constienti ca substanta activa poate provoca probleme grave de sanatate in urma expunerii prelungite. Produsul este clasificat H360D-poate dauna fatului, bromdiolona este clasificata ca reprotoxic.

Efecte adverse indirecte/efecte iritante principale:

Coroziune/iritație piele: Nu are efecte iritante

Leziuni serioase ochi/ iritatie: Nu are efecte iritante

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Nu are efecte sensibilizante

Asupra sănătății animalelor : Folosind rodenticidele în mod responsabil, atunci când acestea sunt necesare, din cauza potențialului periculos pentru sănătatea animală.

Acest produs contine o substanta anticoagulanta. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii. In cazuri severe, pot sa apara echimoze la suprafata pielii si sange in excremente sau in urina.

Atidot: Vitamina K1, administrata numai de personal medical/veterinar.

Produsul nu se furnizează publicului larg.

Asupra mediului: Sol: Trebuie evitata cat mai mult expunerea solului la produsul formulat precum si vitala a patru der in sol, tinand cont de proprietatile PBT ale difenacoumului

Apa: Produsul nu prezinta risc neacceptabil pentru mediul acvatic atunci cand este utilizat conform instructiunilor

Aer: Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulari de substanta activa in aer in timpul utilizarii.

Organisme acvatice : Produsul prezinta un risc acceptabil considerand efectul acut si cronic de categoria I

Alte organisme netinta: Produsul nu prezinta risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru cand este utilizat conform instructiunilor : utilizare in campanii cu durata limitata (maxim 35 zile), limitarea accesului organismelor netinta la cutiile pentru momela precum si indepartarea

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

rozatoarelor moarte si, musburile in timpul campaniei.

**XIII. ORGANISMELE DAUNATOARE VIZATE**

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia/Tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
(1) Evaluarea eficacitatii biocide	Test in teren (ferma); timp de hranire: 9 zile	<i>Rattus rattus</i> (sobolanul negru de acoperis) - salbatici; populatia estimata: 20-25 indivizi	8 statii de intoxicare; 200 g momela / zi / statie de intoxicare	Mortalitate 100% in 13 zile.
(2) Evaluarea eficacitatii biocide	Test de hranire la alegere – in laborator; timp de hranire 4 zile	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul cenusiu) – 5 masculi si 5 femele	Acceptabilitate: 60,18% - masculi si 61,24% - femele	Mortalitate 100% in 8 zile.
(3) Evaluarea eficacitatii biocide	Test de hranire la alegere (hrana/momeala imbatranita)– in laborator; timp de hranire 4 zile	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul cenusiu) – 5 masculi si 5 femele	Acceptabilitate: 67,82% - masculi si 4,86% - femele	Mortalitate 80% dupa 19 zile
(4) Evaluarea eficacitatii biocide	Test de hranire la alegere – in laborator; timp de hranire 4 zile	<i>Mus musculus</i> (soarecele de casa) - 5 masculi si 5 femele	Acceptabilitate: 42,20% - masculi si 40,70% - femele	Mortalitate 90% dupa 13 zile.

**XIV. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :**

Utilizatori profesioniști: - in interior

Soareci: 40 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m.

Instrucțiuni de utilizare:

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m.

Instrucțiuni de utilizare:

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 5-7 zile de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

Utilizatori profesioniști: - exterior in jurul cladirilor

Soareci: 40 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m.

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIIDE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

Instructiuni de utilizare  
Protejezi momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundație.

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile (pentru soareci), respectiv 5-7 zile (pentru sobolani) de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată, dacă stațiile sunt intacte și pentru a elimina cadavrele. Se completează cu momeala când este necesar.

- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

Utilizatori profesioniști instruiți: - în interior

Soareci și sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu și *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis):

-infestare mare: 60-100 g momeala/statie de intoxicare

-infestare mica: 40-60 g momeala/statie de intoxicare

-tratament permanent: 60-100 g momeala/statie de intoxicare

Instructiuni de utilizare:

- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

Pentru tratament permanent:

- În cazul în care este posibil, se recomandă ca zona tratată să fie verificată la fiecare 4 săptămâni, cel mult, pentru a evita selecția oricărei populații rezistente.

- Respectați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiți: - în exterior în jurul clădirilor

Soareci și sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu și *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis):

-infestare mare: 60-100 g momeala/statie de intoxicare

-infestare mica: 40-60 g momeala/statie de intoxicare

-tratament permanent: 60-100 g momeala/statie de intoxicare

Instructiuni de utilizare:

- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

Pentru tratament permanent:

- În cazul în care este posibil, se recomandă ca zona tratată să fie verificată la fiecare 4 săptămâni, cel mult, pentru a evita selecția oricărei populații rezistente.

- Respectați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru aplicare în puncte de intoxicare acoperite și protejate:

Pentru utilizare la exterior, momelile trebuie acoperite și amplasate astfel încât să reducă la minimum expunerea speciilor nețintă.

- Respectați instrucțiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiți: - zone exterioare deschise

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu și *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis):

-infestare mare: 60-100 g momeala/statie de intoxicare

-infestare mica: 40-60 g momeala/statie de intoxicare

-tratament permanent: 60-100 g momeala/statie de intoxicare

Instructiuni de utilizare:

**COPIE**



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE  
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

- Protejati momeala in timpul varurilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelele deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.
- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.
- Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru tratament permanent:

- In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.
- Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru aplicare in puncte de intoxicare acoperite si protejate:

- Pentru utilizare la exterior, momelele trebuie acoperite si amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate.
- Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Instructiuni generale de utilizare:

- Inainte de utilizare, cititi si respectati informatiile despre produs si orice alte informatii care il insotesc sau sunt furnizate de vanzator.
- Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii oratorului, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilitatii cauzei si a amplasarii infestarii.

**COPIE**

- Eliminati hrana usor de obtinut de rozatoare (de exemplu, cereale varsate sau deseuri alimentare). In plus, nu curatati zona infestata imediat inainte de aplicare, deoarece conduce la perturbarea populatiei de rozatoare si face mai dificila acceptarea momelei de catre aceasta.

- Produsul trebuie utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM), care sa includa, printre altele, masuri de igiena si, acolo unde este posibil, metode fizice de combatere.

- Luați în considerare măsuri preventive de control (de exemplu, găuri de priză, îndepărtati alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți acceptarea produsului și a reduce probabilitatea de reinvasie.

- Produsul trebuie amplasat in imediata apropiere a locurilor in care s-a observat prezenta rozatoarelor (de exemplu: cai de acces, locuri de cuibărit si de hranire, gauri, vizuini, etc.).

- In masura posibilitatilor, fixati capcanele de sol sau alte structuri.

- Capcanele trebuie etichetate clar pentru a indica ca contin rodenticide si ca se interzice mutarea sau deschiderea lor (vezi sectiunea 5.3 pentru informatiile care trebuie indicate pe eticheta).

- Atunci cand produsul este utilizat in zone publice, zonele tratate trebuie sa fie marcate in timpul perioadei de tratament, iar un aviz care explica riscul otravirii primare sau secundare de catre aplicatorii trebuie sa fie pus la dispozitie alaturi de momele.

- Momeala trebuie asigurata in asa fel incat sa nu poata fi scoasa din capcana.

- Amplasati capcanele la adăpost de copii, pasari, animale de companie, animale domestice si a alte animale nevizate.

- Amplasati capcanele departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale, precum si de ustensilele sau suprafetele care intra in contact cu acestea.



## MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

# COPIE

- Folositi manusile protejite rezistente la substante chimice in faza de manipulare.  
Nu bea, nu manca sau fumați in timpul utilizării. După utilizarea produsului, spălați-va mâinile și pielea expusă.

- Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament. Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici (sau echivalent).
- Dacă consumul de momeală este scăzut în raport cu infestarea estimată, luați în considerare reamplasarea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba formularea momeții.
- Dacă după o perioadă de aplicare de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate și nu se observă o reducere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza probabilă. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad de rezistență la substanță. Prin urmare, luați în considerare utilizarea unui rodenticid non-coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea de capcane mecanice, ca măsură de combatere alternativă.
- Îndepărtați resturile de momeală și stațiile de intoxicare la sfârșitul perioadei de tratament.

### XV. INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR

# COPIE

Indicații generale: în orice caz solicitați intervenția unui medic.  
În caz de contact cu pielea: A se îndepărta îmbrăcămintea contaminată. A se spăla imediat cu apă și săpun. În caz de iritații a se consulta medicul.

În caz de contact cu ochii: A se spăla imediat și din abundență cu apă, ținând ochii deschisi. A se îndepărta lentilele de contact, dacă este cazul, și a se continua clătirea ochilor timp de 15 minute. În caz de iritare persistentă consultați medicul.

În caz de ingestie: Clătiți gura cu apă fără să înghițiți. Contactați imediat un medic sau cel mai apropiat Centru de Informare Toxicologică. A nu se administra nimic pe cale orală dacă persoana este inconștientă sau fără indicația unui medic. Induceți vomă doar la indicația medicului.

În caz de inhalare: Îndepărtați persoana în cauză din zona de pericol într-o zonă de aer liber. În caz de incertitudine sau în prezența de simptome a se consulta medicul.

Tratament: În cazul ingerării unei cantități mari de produs, se administrează carbune activ sau se efectuează un lavaj gastric. A se consulta un Centru de Informare Toxicologică.

Informații pentru medic și orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:  
Antidot: Vitamina K1 (sub supraveghere medicală).

### XVI. MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în apele din pânza freatică. Se aplică numai în stații pentru momeală, rezistente la manipulare, marcate în mod corespunzător. Nu aplicați direct în vizuină.

Măsuri în caz de dispersie accidentală

Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și pătrunderea acestuia în sol. Nu este de așteptat să rezulte





**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIIDE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

pierdere, acțiunea de substanță activă în aer în timpul utilizării.

Metode de decontaminare

În cazul dispersiei accidentale corectati mecanic si /sau cu echipamente corespunzatoare si plasati in recipiente inchise , adecvate pentru eliminare .

**XVII. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI PENTRU ANIMALE**

Momelile trebuie să fie depozitate în siguranță într-un mod care să reducă riscul consumului de către alte animale.

Produsul biocid se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.

Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea. Capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri. Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată din capcană.

Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de precauție care se iau în caz de intoxicare.

Contactați un medic veterinar dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

Pentru utilizarea la exterior, capcanele trebuie acoperite și amplasate în locuri strategice astfel încât să reducă la minimum expunerea speciilor nevizate. Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată din capcană. Se amplaseaza capcanele în zone fără risc de inundare.

**COPIE**

**XVIII. INSTRUCIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru**

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor , de către operatorii autorizați. Recipientele goale, cu urme de produs, trebuie eliminate ca deșeuri periculoase .

Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

**XIX. CONDITIILE DE DEPOZITARE :** Pastrati in recipientul original inchis etans, in spatii racoroase, uscate, bine ventilate, departe de actiunea directa a razelor solare .Depozitati in afara zonei de acces a copiilor, pasarilor, animalelor de casa, sau a celor ne-tinta

**COPIE**

URAT DE DEPOZITARE A PRODUSELOR BIOCIIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE

**XX. ALTE INFORMATII:**

Datorită acțiunii întârziată, rodenticidele cu anticoagulant sunt eficiente la 4 până la 10 zile de la consumarea momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente cum ar fi cleștii pentru preluarea acestora.

Acest produs conține un agent amar și un colorant.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

Având în vedere efectele potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu mare atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor.

Respectarea restricțiilor pentru utilizarea produsului biocid

Se va împiedica patrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în apele din panza freatică. Se aplică numai în stații pentru momeala, rezistente la manipulare, marcate în mod corespunzător. Nu aplicați direct în vizuină.

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezintă reînnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid nr. RO/2013/0024/MRA/IT/2012/00021/AUT.

**COPIE**  
PREȘEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

**COPIE**