

**BG**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

GARDENTOP PASTA

**Продуктов(и) тип(ове)**

PT14: Родентициди

**Номер на разрешително:** 1525-5, 1525-6

**Номер на актив R4BP:** BG-0009516-0000

---

## Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	Gardentop pasta
------------------------	-----------------

### 1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	ZAPI S.p.A.
	Адрес	via Terza Strada 12 35026 Conselve Италия
Номер на разрешително	1525-5, 1525-6	
Номер на актив <i>R4BP</i>	BG-0009516-0000	
Дата на издаване на разрешението	07/02/2013	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/12/2026	

### 1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	Zapi S.p.A.
Адрес на производителя	via Terza strada 12 35026 Conselve (Pd) Италия
Местонахождение на производствените обекти	via Terza strada 12 35026 Conselve (Pd) Италия

### 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Бромадиолон
Име на производителя	PM Tezza S.r.l.
Адрес на производителя	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (Vr) Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (Vr) Италия

---

## Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

### 2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Бромадиолон	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	активно вещество	28772-56-7	249-205-9	96,9 % (w/w)

### 2.2. Вид(ове) формулация

РВ Готова за употреба примамка

### Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	<p>H372: Причинява увреждане на органи (кръвта) при продължителна или повтаряща се експозиция {1: посочете път на експозиция, ако е доказано убедително, че няма други пътища на експозиция, които причиняват опасността: }.</p> <p>H360D : Може да увреди плода.</p>
Препоръки за безопасност	<p>P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции.</p> <p>P202: Да не се използва, преди да се прочитат и разбират всички предпазни мерки за безопасност.</p> <p>P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.</p> <p>P280: Носете предпазни ръкавици.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински помощ.</p> <p>P405: Да се съхранява под ключ.</p> <p>P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с нормативната уредба.</p> <p>P501: Да се изхвърли съда в съответствие с нормативната уредба.</p>

## Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

### 4.1. Описание на употребите

Таблица 1. rodenticides

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Родентицид за контрол на целеви вредители: сив плъх, черен плъх и домашна мишка. За употреба единствено в и около сгради.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: brown rat Етап на развитие: възрастни
Област(и) на употреба	използване на закрито използване на открито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Готова за употреба примамка. Масова употреба Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма: - мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; - плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелеви животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии

могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелеливи организми. Прави се оценка на достъпа на нецелеливи организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m.Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употребаРъцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелеливи животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелеливи животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелеливи животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не

	трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К
Степен и честота на приложение	<p>Дозиране: 50 - 100 g</p> <p>Разреждане (%): 96.9</p> <p>Брой и времеви график на прилагане:  Готова за употреба примамка. Масова употреба  Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба  Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелев животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелев организми. Прави се оценка на достъпа на нецелев организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m. Инструкции</p>

	<p>за безопасна употреба – за професионална и масова употреба. Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелели животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелели животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелели животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К</p>
Категория(и) потребители	професионална ; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Bag /Sack, Plastic: composite: , 3 - 15 kg

#### 4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Готова за употреба примамка. Масова употреба. Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в



---

търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма: - мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; - плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелесъобразни животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелесъобразни организми. Прави се оценка на достъпа на нецелесъобразни организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма: - мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; - плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставки им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

#### **4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби**

Готова за употреба примамка. Масова употреба Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа,

---

или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелесъобразни животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелесъобразни организми. Прави се оценка на достъпа на нецелесъобразни организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

#### **4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Готова за употреба примамка. Масова употреба Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелесъобразни животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелесъобразни организми. Прави се оценка на достъпа на нецелесъобразни организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

---

#### **4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Готова за употреба примамка. Масова употреба Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелесъобразни животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелесъобразни организми. Прави се оценка на достъпа на нецелесъобразни организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу

---

отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

#### **4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Готова за употреба примамка. Масова употреба Срещу мишки: само в дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка. Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към земята. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозиция на нецелесъобразни животни, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в тях може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който ограничава достъпът на нецелесъобразни организми. Прави се оценка на достъпа на нецелесъобразни организми за съответния обект при взимане на решение за метода на приложение. Разходна норма:- мишки – при висока численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска численост до 50 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове – при висока численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска численост до 100 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употребата му. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. В зависимост от конкретния случай може да се наложи проверката да се извършва всеки ден. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставки им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен

---

достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени през периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

---

## **Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА<sup>1</sup>**

### **5.1. Указания за употреба**

.

### **5.2. Мерки за намаляване на риска**

.

### **5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

.

### **5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

.

### **5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

.

---

<sup>1</sup>Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

---

## Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ