

**BG**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

Dr. Mort Brodi blocks

**Продуктов(и) тип(ове)**

PT14: Родентициди

**Номер на разрешително: 2355-1, 2355-2, 2355-3,2355-4**

**Номер на актив R4BP: BG-0018972-0000**

## Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	Dr. Mort Brodi blocks DDD-Expert Brodi blocks RatStop Brodi blocks Plahotox Brodi blocks Bromtox Brodi blocks Halek Brodi blocks Mishemor Brodi blocks Plahomor Brodi blocks DDD Brodi blocks Inferno Brodi blocks Rat-Venom Brodi blocks RATOSTOP Brodi blocks СНАЙПЕР БЛОК 25 Броди SNIPER BLOCK 25 Brodi
------------------------	--

### 1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farmavit OOD
	Адрес	blvd. Tsar Boris III, n° 63, Office n° 1 1612 Sofia България
Номер на разрешително	2355-1, 2355-2, 2355-3,2355-4	
Номер на актив <i>R4BP</i>	BG-0018972-0000	
Дата на издаване на разрешението	05/02/2014	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/12/2026	

### 1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	„Фармавит“ ЕООД
Адрес на производителя	бул. „Цар Борис III“ № 63, офис № 1 1612 София България
Местонахождение на производствените обекти	ул. „Индустириална“ № 2 5960 Гулянци България

### 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Бродифакум
Име на производителя	Activa S.r.l
Адрес на производителя	via Feltre, 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Италия

---

## Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

### 2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Бродифакум	3-[3-(4'-bromophenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	активно вещество	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (w/w)

### 2.2. Вид(ове) формулация

RB Готова за употреба примамка

---

### Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	H373: Може да причини увреждане на органи (blood) при продължителна или повтаряща се експозиция {1: посочете път на експозиция, ако е доказано убедително, че няма други пътища на експозиция, които причиняват опасността: }.
Препоръки за безопасност	P102: Да се съхранява извън обсега на деца.  P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.  P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински медицински съвет.  P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба.

## Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

### 4.1. Описание на употребите

**Таблица 1. Домашна мишка – професионална употреба – на закрито**

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за родентициди
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозирание: 20 g - 40 g блокчета за точка с примака  Разреждане (%): 0,0025  Брой и времеви график на прилагане:  Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примамка от 10-20 g в парафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

#### 4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

#### 4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

#### 4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

#### 4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

#### 4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

### 4.2. Описание на употребите

Таблица 2. Плъхове – професионална употреба – на закрито

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозирание: 100 g - 200 g за една станция с примамка.  Разреждане (%): 0,0025  Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примамка от 10-20 g в парафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

#### 4.2.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни след началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

#### 4.2.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

#### 4.2.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

#### 4.2.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

#### 4.2.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

#### 4.3. Описание на употребите

**Таблица 3. Домашни мишки и плъхове – професионална употреба – около сгради**

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: Juveniles to adults  Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	други: Other  Около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.

Степен и честота на приложение	<p>Дозирание: Домашна мишка: 20 – 40 g парафинови блокчета за точка с примамка; Кафяв плъх: 100 g - 200 g парафинови блокчета за точка с примамка</p> <p>Разреждане (%): 0,0025</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.</p>
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	<p>Брой на пакетирания торби за една опаковка: Грам/kg примамка за пакетирания торба: от 1,5 Kg до 25 Kg (съдържащи родентицидни примамки от 10-20 g под форма на парафинови блокчета)</p> <p>Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер</p>

#### 4.3.1. Специфични инструкции за употреба

- Защитавайте примамката от атмосферните условия (напр. дъжд, сняг и др.). Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани [за мишки - най-малко на всеки 2 до 3 дни в] [за плъхове - само 5 до 7 дни след] началото на лечението и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.

#### 4.3.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Не използвайте този продукт директно в дупките.

#### 4.3.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При поставянето на дератизационните кутии близо до повърхностни води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канавки) или системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода.



**4.3.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

**4.3.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

#### **4.4. Описание на употребите**

**Таблица 4. Домашна мишка – масова употреба – на закрито**

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	не е от значение за родентициди
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозирание: 20 g - 40 g блокчета за точка с примака  Разреждане (%): 0,0025  Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	До 300 g (съдържаща родентицидна примамка от 10-20 g прафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

##### **4.4.1. Специфични инструкции за употреба**

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

#### 4.4.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

#### 4.4.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална употреба:

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

#### 4.4.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

#### 4.4.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

#### 4.5. Описание на употребите

Таблица 5. Плъхове – масова употреба – на закрито

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки  Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 100 g - 200 g за точка с примамка.  Разреждане (%): 0,0025  Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	До 300 g (съдържаща родентицидни примамки от 10-20 g парафинови блокчета) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер

#### 4.5.1. Специфични инструкции за употреба

Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

#### 4.5.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

#### 4.5.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

За професионална употреба:

Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат.

#### 4.5.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

#### 4.5.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

#### 4.6. Описание на употребите

Таблица 6. Плъхове - масова употреба - около сгради

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е от значение за родентициди.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: Кафяв плъх Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	други: Other Около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на блокчета за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 100 g - 200 g парафинови блокчета за точка с примамка

	<p>Разреждане (%): 0,0025</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра.</p>
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	<p>До 300 g (съдържащи родентицидна примамка от 10-20 g парафинови блокчета)</p> <p>Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер</p>

#### **4.6.1. Специфични инструкции за употреба**

- Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване.
- Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия.
- Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани само 5 до 7 дни след началото на третирането и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията.

#### **4.6.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби**

За професионала употреба около сгради:

Не използвайте този продукт директно в дупките.

#### **4.6.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

За професионална употреба:

При поставянето на дератизационните кутии близо до повърхностни води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канавки) или системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода.

#### **4.6.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

#### **4.6.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

## Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА<sup>1</sup>

### 5.1. Указания за употреба

Професионални потребители

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.
  - Извършете предварителен преглед на заразената зона и оценка на място, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и да се определи вероятната причина и степента на заразяване.
  - Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо.
  - Продуктът следва да се използва само като част от интегрирана система за борба с вредителите (IPM), включваща, наред с другото, хигиенни мерки и, където е възможно, физически методи за контрол.
  - Помислете за превантивни мерки за контрол (например да се запушат отворите, да се премахнат потенциалните храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно нападение.
  - Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
  - Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
  - Станциите за примамка трябва да бъдат ясно обозначени, да показват, че съдържат родентициди и че не трябва да се преместват или отварят (вж. точка 5.3 за информацията, която трябва да бъде показана на етикета).
  - Когато продуктът се използва на обществени места, обработените площи трябва да бъдат маркирани по време на периода на третиране и в близост до примамките трябва да бъде предоставено обявление, обясняващо риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта, както и посочващо първите мерки, които трябва да се вземат в случай на отравяне.
  - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде извадена от станцията.
  - Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеви животни.
  - Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях.
  - Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
  - Ако поглъщането на примамки е ниско в сравнение с очевидния размер на заразяването, помислете за замяната на станциите за примамка на допълнителни места и възможността да се преминете към друга формулировка на примамки.
  - Ако след период на лечение от 35 дни примамките продължават да се консумират и не може да се наблюдава спад в активността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина. В случаите, когато са изключени други елементи, има вероятност да има устойчиви гризачи, така че да се обмисли използването на не-антикоагулантен родентицид, когато има такъв, или по-мощен антикоагулантен родентицид. Също така помислете за използването на капани като алтернативна мярка за контрол.
- Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.

---

<sup>1</sup>Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

---

Масова употреба:

- Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате.- Преди да се използват родентицидните продукти, следва да се обмислят нехимични методи за контрол (например капани).
- Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо.- Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.).
- Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции.
- Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеви животни.
- Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях.- Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отвеждане на вода, където те могат да попаднат в контактът с водата.
- Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта.
  
- Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране.

## 5.2. Мерки за намаляване на риска

За професионална употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.
- Носете защитни ръкавици.
- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Където е възможно, преди третирането информирайте всички потенциални свидетели (например ползватели на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съответствие с правилата за добри практики, ако са налични].
  
- За да се намали рискът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи на чести интервали по време на третирането (например поне два пъти седмично).
  
- Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на заразяването и на ефикасността на лечението.
- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.
- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че: Продуктът не трябва да се доставя за масова употреба (например "само за професионалисти"). Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").
  
- Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").
- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност

---

на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.

- Не мийте станциите за стръв с вода между приложенията.
- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

За масова употреба:

- Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
- Помислете за превантивни мерки за контрол (запушване на дупки, премахване на потенциални храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно заразяване.

- Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че: Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване").

Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта").

- Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни.

Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите.

- Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането, поне толкова често, колкото се наблюдават дератизационните кутии.

- Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания.

### **5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

За професионална и масова употреба:

- Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите, които могат да бъдат забавени, могат да включват кървене от носа и кървене от венците. В тежки случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината.

- Антидот: Витамин К1 се прилага само от медицински / ветеринарен персонал.

- В случай на:

Излагане на кожата, измийте кожата с вода и след това с вода и сапун.

Излагане на очите, изплакнете очите с течности за изплакване на очите или вода, задръжте клепачите отворени най-малко 10 минути.

Поглъщане, изплакнете внимателно с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен хирург в случай на поглъщане от домашен любимец.

Допълнителни инструкции за професионална употреба:

---

- Станциите за примамка трябва да бъдат етикетирани със следната информация: "не се премествайте или отваряйте"; "Съдържа родентицид"; "Име на продукта или номер на разрешението"; "Активно вещество (а)" и "в случай на инцидент, се обадете на център по токсикология.

- Опасен за дивата природа.

#### **5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на третирането, изхвърлете неизядените примаци и опаковката в съответствие с местните изисквания.

#### **5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

- Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Съхранявайте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина.

- Да се съхранява на места, които не са достъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни.

- Срок на годност: 24 месеца.



---

## **Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

- Поради забавения си начин на действие, антикоагулантните родентициди отнемат от 4 до 10 дни, за да бъдат ефективни след консумацията на примамката.

- Гризачите могат да бъдат носители на болести. Не докосвайте мъртвите гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или използвайте инструменти като щипци, когато ги изхвърляте.

- Този продукт съдържа горчив агент и багрило.