

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** VICTOR GEL

**Produktart(en):** PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

**Zulassungsnummer:** DE-0011505-18

**R4BP 3-Referenznummer:** DE-0011505-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	8
5.1. Anwendungsbestimmungen	8
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	9
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	9
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	9
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	10
6. Sonstige Informationen	10

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

VICTOR GEL
VICTOR GEL SCHABEN
FUTUM
VULCAN
FOVAL GEL COCKROACHES

### 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	ADAMA Deutschland GmbH
	Anschrift	Edmund-Rumpler-Str. 6 51149 Cologne Deutschland
<b>Zulassungsnummer</b>	DE-0011505-18	
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>	DE-0011505-0000	
<b>Datum der Zulassung</b>	20/11/2018	
<b>Ablauf der Zulassung</b>	31/12/2025	

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	ADAMA Celsius, B.V. Amsterdam.(NL)
<b>Anschrift des Herstellers</b>	ADAMA Group - Spitalstrasse, 5 8200 Schaffhausen Schweiz
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	MYLVA, S.A. - San Galderic 23 08395 San Pol de Mar, BARCELONA Spanien
	COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A. - P.I. San Pere Molanta - Avda. del Cadí 7-14 08799 Olerdola (Barcelona) Spanien
	FUTUM Handels GmbH, Dweerblöcken 71 22393 Hamburg Deutschland

#### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	37 - Imidacloprid
<b>Name des Herstellers</b>	Bayer Cropscience AG
<b>Anschrift des Herstellers</b>	16 rue Jean-Marie Leclair cp 106 69266 Lyon Cedex 09 Frankreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Industrial Operations Alfred Nobel-Strasse 50 40789 Monheim Deutschland

<b>Wirkstoff</b>	37 - Imidacloprid
<b>Name des Herstellers</b>	Adama Agriculture Espana, S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Calle Mendez Alvaro, 20-5 28045 Madrid Spanien
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Israel
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou China

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Wirkstoffe	138261-41-3	428-040-8	2,15

## 2.2. Art der Formulierung

RB - gebrauchsfertiger Köder

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

### Gefahrenhinweise

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-1 und 2-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Verschüttete Mengen aufnehmen.  
Inhalt entsprechend den lokalen Bestimmungen zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

**Verwendung 1 - Verwendung 1 – Innenräume, Risse und Spalten - Gelköder als Tropfen aufgetragen - nicht-berufsmäßige Verwender (gewerbliche Nutzung)**

#### Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

#### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Insektizid gegen Schaben

#### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: *Blattella germanica*  
Trivialname: German cockroach  
Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven

wissenschaftlicher Name: *Blatta orientalis*

	<p>Trivialname: Oriental cockroach Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven</p> <p>wissenschaftlicher Name: Periplaneta americana Trivialname: American Cockroach Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven</p> <p>wissenschaftlicher Name: Blattodea: Trivialname: Brown-banded cockroach Entwicklungsstadium: Adulte</p>
<b>Anwendungsbereich</b>	<p>Innen-</p> <p>Innenräume, Risse und Spalten</p>
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	<p>Methode: Offenes System Detaillierte Beschreibung: Offene Anwendung eines Gelköders aus einer Spritze.</p>
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	<p>Aufwandmenge: 2-6 Tropfen/m<sup>2</sup> Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Dose: 2-6 Tropfen/m<sup>2</sup>. Hängt vom Befallsgrad ab.</p> <p>Häufigkeit der Anwendung: Überprüfen Sie die Köderpunkte alle 7-14 Tage und wiederholen Sie die Anwendung, wenn der Köder verzehrt wurde und der Befall anhält. Während der Behandlung nicht mehr als viermal pro Köderpunkt anwenden.</p> <p>Häufigkeit der Behandlung: Drei Monate nach dem Ende des Befalls kann die Behandlung wiederholt werden.</p>
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	<p>Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)</p>
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	<p>LPDE-Kunststoffspritze mit 3, 5, 10 und 20 g Inhalt</p>

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nur Innen verwenden.  
Das Biozid-Produkt nur in Rissen und Spalten, hinter Möbeln und Motoren auftragen. Das Produkt kann nicht auf Oberflächen verwendet werden.  
Setzen Sie die Ködertropfen nicht dem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle (z.B. Heizkörper) aus. Bitte wenden Sie sich an Schädlingsbekämpfer, wenn der Befall nach der Behandlung anhält.

#### 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nicht auf Oberflächen oder Geschirr auftragen, die mit Futter-/Lebensmitteln in Berührung kommen können.

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

siehe allgemeine Gebrauchsanweisung

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

siehe allgemeine Gebrauchsanweisung

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

siehe allgemeine Gebrauchsanweisung

### 4.2 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 2 - Verwendung 2 – Innenräume, Risse und Spalten - Gelköder als Tropfen aufgetragen,

##### Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Insektizid gegen Schaben

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: *Blattella germanica*  
Trivialname: German cockroach  
Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven

wissenschaftlicher Name: *Blatta orientalis*  
Trivialname: Oriental cockroach  
Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven

wissenschaftlicher Name: *Periplaneta americana*  
Trivialname: American Cockroach  
Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven

wissenschaftlicher Name: Blattodea:  
Trivialname: Brown-banded cockroach  
Entwicklungsstadium: Adulte

##### Anwendungsbereich

Innen-

Innenräume, Risse und Spalten

##### Anwendungsmethode(n)

Methode: Offenes System  
Detaillierte Beschreibung:  
Offene Anwendung eines Gelköders aus einer Spritze, der als Tropfen aufgetragen wird.

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: 2-6 Tropfen/m<sup>2</sup>  
Verdünnung (%): 0  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  
Dose: 2-6 Tropfen/m<sup>2</sup>. Hängt vom Befallsgrad ab.  
Häufigkeit der Anwendung: Überprüfen Sie die Köderpunkte alle 7-14 Tage und wiederholen Sie die Anwendung, wenn der Köder verzehrt wurde und der Befall anhält. Während der Behandlung nicht mehr als viermal pro Köderpunkt anwenden.  
Häufigkeit der Behandlung: Drei Monate nach dem Ende des Befalls kann die Behandlung wiederholt werden.

**Anwenderkategorie(n)**

berufsmäßiger Verwender

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

LDPE-Kunststoffspritzen mit 3, 5, 10 und 20 g.

**4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Nur Innen verwenden.  
Das Biozid-Produkt nur in Rissen und Spalten, hinter Möbeln und Motoren auftragen.  
Das Produkt kann nicht auf Oberflächen verwendet werden.  
Setzen Sie die Ködertropfen nicht dem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle (z.B. Heizkörper) aus.  
Bitte wenden Sie sich an Schädlingsbekämpfer, wenn der Befall nach der Behandlung anhält.

**4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Nicht auf Oberflächen oder Geschirr auftragen, die mit Futter-/Lebensmitteln in Berührung kommen können.

**4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe Gebrauchsanweisung

**4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe Gebrauchsanweisung

**4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe Gebrauchsanweisung



### 4.3 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 3 - Verwendung 3 – Innenräume, Risse und Spalten - Gelköder als Tropfen aufgetragen, geschultes Fachpersonal.

<b>Art des Produkts</b>	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	Insektizide gegen Schaben
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: <i>Blattella germanica</i> Trivialname: German cockroach Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven  wissenschaftlicher Name: <i>Blatta orientalis</i> Trivialname: Oriental cockroach Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven  wissenschaftlicher Name: <i>Periplaneta americana</i> Trivialname: American Cockroach Entwicklungsstadium: Erwachsene und Larven  wissenschaftlicher Name: Blattodea: Trivialname: Brown-banded cockroach Entwicklungsstadium: Adulte
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Innenräume, Risse und Spalten
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Methode: Offenes System Detaillierte Beschreibung: Offene Anwendung eines Gelködgers aus einer Spritze/Kartusche, der als Tropfen aufgetragen wird.
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	Aufwandmenge: hängt vom Befallsgrad und von der Art der Schaben ab. (1 Tropfen = 0,04 g) Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Dose: hängt vom Befallsgrad und von der Art der Schaben ab. (1 Tropfen = 0,04 g). - Deutsche Schaben ( <i>Blattella germanica</i> ): 0,04-0,16 g/m <sup>2</sup> (1-4 Tropfen/m <sup>2</sup> ) - Orientalische Schaben ( <i>Blatta orientalis</i> ): 0,08-0,24 g/m <sup>2</sup> (2-6 Tropfen/m <sup>2</sup> ) - Amerikanische Schaben ( <i>Periplaneta americana</i> ): 0,08 g/m <sup>2</sup> -0,24 g/m <sup>2</sup> (2-6 Tropfen/m <sup>2</sup> ) - Braunbandige Schaben ( <i>Supella longipalpa</i> ): 0,04-0,16 g/m <sup>2</sup> (1-4 Tropfen/m <sup>2</sup> ) Häufigkeit der Anwendung: Überprüfen Sie die Köderpunkte alle 7-14 Tage und wiederholen Sie die Anwendung, wenn der Köder verzehrt wurde und der Befall anhält. Während der Behandlung nicht mehr als viermal pro Köderpunkt anwenden. Häufigkeit der Behandlung: Drei Monate nach dem Ende des Befalls kann die Behandlung wiederholt werden.
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	berufsmäßiger Verwender mit Zusatzqualifikation
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	LDPE-Kunststoffspritzen mit 3, 5, 10 und 20 g. LDPE-Kunststoffkartusche mit 30 und 35 g Inhalt

### 4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nur Innen verwenden.  
Das Biozid-Produkt nur in Rissen und Spalten, hinter Möbeln und Motoren auftragen. Das Produkt kann nicht auf Oberflächen verwendet werden.  
Setzen Sie die Ködertropfen nicht dem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle (z.B. Heizkörper) aus.

### 4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Führen Sie den Vorgang nicht an öffentlichen Orten in Anwesenheit von Personen und/oder Haustieren durch.  
Das Produkt wird in der Lebensmittelindustrie in Abwesenheit von Lebensmitteln verwendet, mit Ausnahme von Lagerräumen, in denen die gelagerten Produkte ordnungsgemäß verpackt aufbewahrt werden.  
Es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass Lebensmittel, Ausrüstungen oder Utensilien, die an zuvor mit dem Produkt behandelten Orten gehandhabt werden, keine Rückstände des Wirkstoffs enthalten. Nur in verdeckten, schwer zugänglichen und wassergeschützten Bereichen verwenden.  
Es sind Methoden der integrierten Schädlingsbekämpfung wie etwa die Kombination chemischer und physikalischer Kontrollverfahren und andere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit anzuwenden. Dabei sind besondere lokale Besonderheiten (klimatische Bedingungen, Zielspezies, Anwendungsbedingungen usw.) zu beachten.  
Überprüfen Sie die Wirksamkeit des Produkts vor Ort: Gegebenenfalls muss die Ursache der verminderten Wirksamkeit untersucht werden, um sicherzustellen, dass es keine Resistenz gibt bzw. dass keine potenzielle Resistenz identifiziert wird.  
Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen ein Widerstand vermutet oder festgestellt wird.  
Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung unwirksam ist.

### 4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Gebrauchsanweisung

### 4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Gebrauchsanweisung

### 4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Gebrauchsanweisung

## 5. Anweisungen für die Verwendung

### 5.1. Anwendungsbestimmungen

Führen Sie eine gründliche Inspektion durch, um den Befallsgrad (niedrig oder hoch) zu bestimmen.  
Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett oder die Packungsbeilage und befolgen Sie alle Anweisungen.  
Nicht auf Holz oder porösen Oberflächen verwenden.  
Den Kontakt mit behandelten Oberflächen vermeiden.  
Nicht mit anderen Chemikalien oder in Bereichen mischen, die kürzlich mit einem anderen Insektizid behandelt worden sind.  
Das Produkt sollte nur so lange erneut aufgetragen werden, bis der Schädling bekämpft ist.  
Um die Wirksamkeit der Behandlung zu optimieren, gute Hygienepraktiken beachten: Den Zugang zu allen Nahrungsquellen entfernen oder verhindern. Der Köder muss die wichtigste Nahrungsquelle für die Schaben sein.  
Um die Wirksamkeit zu optimieren, den Köder einmal pro Woche überprüfen und ihn ersetzen/ergänzen, wenn er beschädigt oder verschmutzt ist.  
Die Produkte in empfohlenen Dosen und Abständen verwenden.  
Bienengefährlich.

## 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht rauchen, essen oder trinken, während Sie das Produkt benutzen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Den Kontakt von Kindern mit behandelten Oberflächen vermeiden.  
Dieses Produkt sollte im Wechsel mit anderen Produkten verwendet werden, die nicht den gleichen Wirkstoff enthalten, um resistente Populationen zu vermeiden.  
Führen Sie den Vorgang nicht in Anwesenheit von Kindern und/oder Haustieren durch.  
Nicht direkt auf Oberflächen auftragen, auf denen Lebens- oder Futtermittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden.  
Nicht direkt (anwenden/auftragen) auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutztieren oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen könnten.  
Bei der Anwendung des Produktes ist der Kontakt mit Haustieren, Lebensmitteln, Futtermitteln und Nutztieren auszuschließen.  
Unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere platzieren.  
Das Produkt muss so sicher aufgetragen werden, dass das Risiko des Verzehrs durch andere Tiere oder Kinder minimiert wird.  
Das Produkt nicht auf den Boden, in einen Wasserlauf, in die Spüle oder in den Abfluss werfen.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden (P273).  
Unbenutzte Produkte, deren Verpackung und alle anderen Abfälle (z.B. tote Insekten) gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

### Erste-Hilfe-Anweisungen:

- Bei Hautkontakt die betroffene Stelle mit viel Wasser abwaschen, ohne zu schrubben. Wenn Hautirritationen/Sensibilisierungen auftreten, anhalten oder sich intensivieren, ärztlichen Rat einholen.
- Im Falle einer Augenexposition; Kontaktlinsen prüfen und entfernen, Augen mit viel Wasser waschen, Augenlider dabei mindestens 15 Minuten lang offen halten.
- Bei Verschlucken den Mund mit viel Wasser spülen, KEIN Erbrechen herbeiführen, NICHT einem bewusstlosen Menschen etwas durch den Mund geben. Wenn Sie Bauchschmerzen haben oder sich unwohl fühlen, ärztlichen Rat einholen.
- Die betroffene Person bei Bedarf in ein Gesundheitszentrum bringen und nach Möglichkeit Verpackung oder Etikett mitbringen.

LASSEN SIE EINE BETROFFENE PERSON NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT!

### Beratung von medizinischem und pflegendem Personal:

- Symptomatische und unterstützende Behandlung.
- WENN ÄRZTLICHER RAT BENÖTIGT WIRD, DIE VERPACKUNG ODER DAS ETIKETT BEREITHALTEN UND SICH AN DIE ÖRTLICHE GIFTNOTRUFZENTRALE [HIER DIE ÖRTLICHE NUMMER EINGEBEN] WENDEN.

### Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Vorsichtsmaßnahmen: Verhindern Sie, dass das Produkt in die Umwelt (Oberflächen- und Grundwasser), in die Kanalisation (außer wenn es sich um Kanalabdeckungen handelt), in die Entwässerung usw. gelangt, indem Sie Schutzwände und geschlossene Abflüsse bauen.  
Setzen Sie sich mit den zuständigen Behörden in Verbindung oder geben Sie Leckagen in Wasserstraßen, Abflüsse, Kanäle.... an.  
Methoden und Materialien für Rückhaltung und Reinigung: Verschüttungen auf inertem Material (Sand, Kaolin...) aufnehmen, sammeln und in Behälter legen, um sie später ordnungsgemäß als Gefahrgutentsorgung zu identifizieren.

## 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen (P501)

## 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Die Lagerfähigkeit dieses Produkts in der Originalverpackung beträgt zwei Jahre unter normalen Lagerbedingungen.  
Im Originalbehälter aufbewahren.  
Behälter dicht geschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.  
Von Wasser, Lebens- und Futtermitteln fernhalten.  
Es wird empfohlen, das Produkt vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C zu lagern.

## 6. Sonstige Informationen

Definitionen:  
Geschultes Fachpersonal: Schädlingsbekämpfer, die eine spezielle Ausbildung in der Insektizidbekämpfung gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften erhalten haben.  
Gewerblich: Benutzer, der Biozid-Produkte am Arbeitsplatz anwendet. Dieser Benutzer verfügt über einige Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Chemikalien und ist in der Lage, bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung (PSA) korrekt zu verwenden.  
Nicht-berufsmäßige Verwender (gewerbliche Nutzung): Benutzer, die keine Fachleute sind und das Produkt im Rahmen ihres Privatlebens anwenden.  
Das Produkt enthält einen Bitterstoff, der es für Menschen oder Haustiere abstoßend macht. Für geschultes Fachpersonal wird das Tragen geeigneter Handschuhe während der Anwendung empfohlen.