

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: calgodip D 3000

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Номер на разрешението: EU-0018724-0000

**Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3):** EU-0018724-0011

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	3
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	3
2.2. Тип на формулирането	3
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	4
5. Общи указания за употреба	16
5.1. Инструкции за употреба	16
5.2. Мерки за намаляване на риска	16
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	16
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	17
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	18
6. Друга информация	18

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

calgodip D 3000
Jod-Dip S 30
Bestfarm Dip Premium
Jod 30 Universal (Iwetec)
Jod-Dipp 30 (Technolit)
Dip es SF 3000
Lerapur Jod SP 30

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	CVAS Development GmbH
	Адрес	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Германия
Номер на разрешението	EU-0018724-0000 1-9	

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	EU-0018724-0011
Дата на издаване на разрешението	18/12/2018
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30/11/2028

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	Calvatis GmbH
Адрес на производителя	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Германия
Местонахождение на производствените обекти	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Германия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	Cosayach Nitratos S.A.
Адрес на производителя	Amunategui 178 not applicable Santiago Чили
Местонахождение на производствените обекти	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Чили

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	ACF Minera S.A.
Адрес на производителя	San Martin No 499 not applicable Iquique Чили
Местонахождение на производствените обекти	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Чили

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	SQM S.A.
Адрес на производителя	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Чили
Местонахождение на производствените обекти	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Чили

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Адрес на производителя	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Япония
Местонахождение на производствените обекти	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Япония
Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)
Адрес на производителя	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Великобритания

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,34
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

2.2. Тип на формулирането

AL - Всяка друга течност

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
------------------------------	--

Препоръки за безопасност

Да се избягва изпускане в околната среда.

Да се изхвърли съдържанието в local/regional/national/international regulation.

Да се изхвърли съда в local/regional/national/international regulation.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Употреба № 9.1 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни: дезинфекция на вимето след издояване чрез ръчно потапяне

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е релевантно
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	<p>Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки</p> <p>Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки</p>
Област на употреба	<p>На закрито</p> <p>Дезинфекция на вимето при млекодайни животни (дойни крави) за употреба след издояване</p>
Метод(и) на прилагане	<p>Ръчно потапяне чрез използване на чашка за потапяне -</p> <p>Вижте инструкциите за употреба</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>За крави: 5 mL на нанасяне - 0% -</p> <p>Нанасяне след издояване: 2-3 пъти на ден (след всяко издояване)</p>
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.
Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.
Напълнете контейнера с готовия за използване продукт, като отделите приблизително по 5 mL продукт на крава, и завинтете чашката за потапяне най-отгоре. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.
Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издождането.
След издождането стиснете контейнера и поставете чашката за потапяне под вимето и се уверете, че то е потопено на около 3 cm дълбочина в дезинфектанта.
Напълнете отново чашката на устройството за потапяне с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера.
При необходимост напълнете отново контейнера с нова доза дезинфектант.
Оставете продукта по вимето до следващото издождане. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.
След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и чашката за потапяне, като изплакнете с вода.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издождането трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издождането.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Употреба № 9.2 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни:
дезинфекция на вимето след издождане чрез ръчно пенообразуване

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Не е релевантно

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	<p>Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки</p> <p>Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки</p>
Област на употреба	<p>На закрито</p> <p>Дезинфекция на вимето при млекодачни животни (дойни крави) за употреба след издождане</p>
Метод(и) на прилагане	<p>Ръчно пенообразуване чрез използване на пенообразуваща чашка -</p> <p>Вижте инструкциите за употреба</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>За крави: 5 mL на нанасяне - 0% -</p> <p>Нанасяне след издождане: 2-3 пъти на ден (след всяко издождане)</p>
Категория(и) потребители	<p>Професионална</p>
Размери и материал на опаковките	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.

Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.

Напълнете контейнера с готовия за използване продукт, като отделите приблизително по 5 mL продукт на крава, и завинтете пенообразуващата чашка най-отгоре. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.

Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издождането.

След издождането стиснете контейнера и поставете пенообразуващата чашка под вимето и се уверете, че то е потопено на около 3 cm дълбочина в дезинфектанта.

Напълнете отново чашката на пенообразуващото устройство с чист дезинфектант, като при необходимост стиснете контейнера. При необходимост напълнете отново контейнера с нова доза дезинфектант.

Оставете продукта по вимето до следващото издождане. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.

След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и пенообразуващата чашка, като изплакнете с вода.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издождането трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издождането.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - Употреба № 9.3 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни: дезинфекция на вимето след издождане чрез ръчно напръскване с помощта на ръчен пулверизатор

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Не е релевантно

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии
Общоприето наименование: Бактерии
Етап на развитие: вегетативни клетки

Научно наименование: Дрожди
Общоприето наименование: Дрожди
Етап на развитие: вегетативни клетки

Област на употреба

На закрито

Дезинфекция на вимето при млекодайни животни (дойни крави) за употреба след издождане

Метод(и) на прилагане

Ръчно напръскване с помощта на ръчен пулверизатор -

	Вижте инструкциите за употреба
Дозировка(и) и честота на прилагане	За крави: 5 mL на нанасяне - 0% - Нанасяне след издомяване: 2-3 пъти на ден (след всяко издомяване)
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Специфични инструкции за употреба

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.
 Препоръчва се използването на помпа за дозиране при пълнене на продукта в оборудването за нанасяне.
 Напълнете контейнера с готовия за използване продукт, като отделите приблизително по 5 mL продукт на крава, и завинтете върха на ръчния пулверизатор върху него. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.
 Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издомяването.
 След издомяването напръскайте с дезинфектант вимето, като използвате ръчния пулверизатор, като се уверите, че около 3 cm от вимето около папиларния канал са покрити с дезинфектант.
 При необходимост напълнете отново контейнера на ръчния пулверизатор с нова доза дезинфектант.
 Оставете продукта по вимето до следващото издомяване. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.
 След дезинфекцията изпразнете контейнера и почистете него и ръчния пулверизатор, като изплакнете с вода.

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При дезинфекция на вимето след издомяване чрез ръчно напръскване с ръчен пулверизатор използвайте химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението), работен комбинезон и химически устойчиви ботуши. Избягвайте работа в облак от пръски.

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издомяването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издомяването.

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.4 Описание за използване

Употреба 4 - Употреба № 9.4 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни: дезинфекция на вимето след издождане чрез ръчно напръскване с помощта на електронен пулверизатор

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Не е релевантно

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии
Общоприето наименование: Бактерии
Етап на развитие: вегетативни клетки

Научно наименование: Дрожди
Общоприето наименование: Дрожди
Етап на развитие: вегетативни клетки

Област на употреба

На закрито

Дезинфекция на вимето при млекодайни животни (дойни крави) за употреба след издождане

Метод(и) на прилагане

Ръчно напръскване с помощта на електронен пулверизатор -

Вижте инструкциите за употреба

Дозировка(и) и честота на прилагане

За крави: 5 mL на нанасяне - 0% -

Нанасяне след издождане: 2-3 пъти на ден (след всяко издождане)

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковкитеJerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg**4.4.1 Специфични инструкции за употреба**

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.
Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, като отделите приблизително по 5 mL продукт на крава, и поставете засмукващата тръбичка на електронния пулверизатор. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.
Почистете вимето внимателно, като забършете с хартиена кърпа/парче плат за еднократна употреба непосредствено преди издояването.
След издояването напръскайте с дезинфектант вимето, като използвате електронния пулверизатор, като се уверите, че около 3 cm от вимето около папиларния канал са покрити с дезинфектант.
При необходимост заменете празния контейнер с нов, съдържащ готовия за употреба продукт.
Оставете продукта по вимето до следващото издояване. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.
След дезинфекцията поставете системата със засмукващата тръбичка в кофа с вода и изплакнете пулверизатора, като изпомпвате водата през него.

4.4.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При дезинфекция на вимето след издояване чрез ръчно напръскване с електронен пулверизатор използвайте химически устойчиви ръкавици (материалът на ръкавиците ще бъде уточнен в информацията за продукта от притежателя на разрешението), работен комбинезон и химически устойчиви ботуши. Избягвайте работа в облак от пръски.

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

4.4.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.4.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.5 Описание за използване

Употреба 5 - Употреба № 9.5 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни: дезинфекция на вимето след издождане чрез автоматизирано потапяне

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е релевантно
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област на употреба	На закрито Дезинфекция на вимето при млекодайни животни (дойни крави) за употреба след издождане
Метод(и) на прилагане	Автоматизирано потапяне - Вижте инструкциите за употреба
Дозировка(и) и честота на прилагане	За крави: 5 mL на нанасяне - 0% - Нанасяне след издождане: 2-3 пъти на ден (след всяко издождане)
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Специфични инструкции за употреба

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.
Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за потапяне. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.
След издояването вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с около 5 mL, когато чашката се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстър (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната система за потапяне се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух.
Като последна стъпка по почистване след всяко издояване на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух.
Оставете продукта по вимето до следващото издояване. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.
След това системата за издояване е готова за следващото издояване.
Целият процес е автоматизиран.

4.5.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издояването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издояването.

4.5.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.5.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.5.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.6 Описание за използване

Употреба 6 - Употреба № 9.6 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни:
дезинфекция на вимето след издояване чрез автоматизирано пенообразуване

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е релевантно
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	<p>Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки</p> <p>Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: vegetative cells</p>
Област на употреба	<p>На закрито</p> <p>Дезинфекция на вимето при млекодайна животни (дойни крави) за употреба след издождане</p>
Метод(и) на прилагане	<p>Автоматизирано пенообразуване -</p> <p>Вижте инструкциите за употреба</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>За крави: 5 mL на нанасяне - 0% -</p> <p>Нанасяне след издождане: 2-3 пъти на ден (след всяко издождане)</p>
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.6.1 Специфични инструкции за употреба

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.

Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на автоматизираната система за пенообразуване. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.

След издождането вакуумът се изолира и дезинфектантът за виме се инжектира в една от чашите на доилния апарат. Вимето е покрито с около 5 mL пяна, когато пенообразуващата чашка се отстранява от Автоматичното отстраняване на клъстери (ACR). След отстраняването на ACR всяка част от автоматизираната пенообразуваща система се изплаква изцяло с вода и се изсушава със сгъстен въздух.

Като последна стъпка по почистване след всяко издождане на стадото уплътненията се дезинфекцират (например с продукт на хлорна основа) и отново се изсушават със сгъстен въздух.

Оставете продукта по вимето до следващото издождане. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.

След това системата за издождане е готова за следващото издождане.

Целият процес е автоматизиран.

4.6.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издождането трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издождането.

4.6.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.6.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.6.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

4.7 Описание за използване

Употреба 7 - Употреба № 9.7 – Дезинфекция на вимето при млекодайни животни: дезинфекция на вимето след издождане чрез автоматизирано напръскване от робот

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не е релевантно
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област на употреба	На закрито Дезинфекция на вимето при млекодайни животни (дойни крави) за употреба след издождане

Метод(и) на прилагане	<p>Автоматизирано напръскване от робот -</p> <p>Вижте инструкциите за употреба</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>За крави: 5 mL на нанасяне - 0% -</p> <p>Нанасяне след издомяване: 2-3 пъти на ден (след всяко издомяване)</p>
Категория(и) потребители	<p>Професионална</p>
Размери и материал на опаковките	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.7.1 Специфични инструкции за употреба

Продуктът трябва да достигне температура над 20 °C преди употреба.
Отворете контейнер, съдържащ готовия за използване продукт, и поставете смукателната тръба на роботизираното устройство за издомяване. Избягвайте изхвърлянето на излишни течности.
Вимето се почиства от робот с автоматични четки.
След издомяването с робот дезинфектантът се пръска автоматично върху вимето от рамото на клъстърта.
Оставете продукта по вимето до следващото издомяване. Животните трябва да са в изправено положение за поне 5 минути след нанасянето.
Изплакването на пулверизатора е автоматично.

4.7.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При необходимост от комбинация от дезинфекция преди и след издомяването трябва да се обмисли използването на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди издомяването.

4.7.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употреба.

4.7.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употреба.

4.7.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употреба.

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Вижте конкретните инструкции за употреба..

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте конкретните мерки за намаляване на риска.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Споменати в информационния лист за безопасност на материалите

Описание на мерките за първа помощ

При вдишване: Осигурете свеж въздух; в случай на симптоми се консултирайте с лекар.

При контакт с кожата: Изплакнете с вода и сапун.

При контакт с очите: Изплакнете отвореното око в продължение на няколко минути под струя течаща вода. След това се консултирайте с лекар.

При поглъщане: изплакнете устата и след това пийте много вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.

Стабилност и реактивност

Възможност за възникване на опасни реакции: Реакции с оксидиращ и редуциращ агент.

Условия, които трябва да се избягват: Не е налична допълнителна релевантна информация.

Несъвместими материали: Не е налична допълнителна релевантна информация.

Опасни продукти на разпадане: йод (при нагряване).

Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: Не се изискват специални мерки.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Не позволявайте продуктът да достига отводнителната система или водни басейни в големи количества.

Методи и материали за ограничаване и почистване: Попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, абсорбиращи киселини материали, универсални абсорбиращи материали, дървени стърготини). Изхвърлете събрания материал съгласно регламентите.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Споменати в информационния лист за безопасност на материалите

Методи за третиране на отпадъци

Препоръка: Да се третира внимателно, съгласно официалните регламенти.

Ключов параметър за изхвърляне на отпадъци: В съответствие с разпоредбата на Европейския каталог на отпадъците; връзката на ключовите параметри на отпадъците трябва да бъде конкретно посочена за сектора и процесите.

Европейския каталог на отпадъците: В съответствие с разпоредбата на Европейския каталог на отпадъците; връзката на ключовите параметри на отпадъците трябва да бъде конкретно посочена за сектора и процесите.

В края на приложението изхвърлете неизползвания продукт и опаковката съгласно местните изисквания. Използваният продукт може да бъде излят в обществената канализация или изхвърлен на местата за съхранение на тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускане в индивидуална станция за третиране на отпадни води.

Препоръчително средство за почистване: вода и ако е необходимо, препарат.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Срок на годност: 24 месеца

Продуктите трябва да бъдат защитени от замръзване, съхранявани на температури под 30 °C и далеч от пряка слънчева светлина.

6. Друга информация

Не е релевантно