

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: GENERATION PAT VET

Tipo(s) do produto: TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

Número da autorização: 422/01/20RBVPT; 422/02/20RBVPT

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0023555-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	7
5.1. Instruções de utilização	8
5.2. Medidas de redução do risco	8
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	8
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	8
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	9
6. Outras informações	9

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

GENERATION PAT VET

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	LIPHATECH
	Endereço	Bonnel - CS 10005 47480 Pont Du Casse França
Número da autorização	422/01/20RBVPT; 422/02/20RBVPT	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0023555-0000	
Data da autorização	03/03/2020	
Data de caducidade da autorização	01/07/2024	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	LIPHATECH SAS
Endereço do fabricante	Bonnel - CS 10005 47480 PONT DU CASSE França
Localização das instalações de fabrico	Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère 47480 PONT DU CASSE França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	27 - Difetialona
Nome do fabricante	LIPHATECH S.A.S
Endereço do fabricante	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE França
Localização das instalações de fabrico	CONFIDENTIAL - LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH - Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32 83308 Trostberg Alemanha

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Difetialona	3-[3-(4-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio	Substância ativa	104653-34-1		0,0025

2.2. Tipo de formulação

RB - Isco (pronto a usar)

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	<p>Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.</p> <p>Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.</p> <p>Evitar a libertação para o ambiente.</p> <p>Usar luvas de proteção.</p> <p>EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.</p>

Eliminar o recipiente em acordo com os regulamentos.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - UTILIZADORES PROFISSIONAIS

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: All Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: All Nome científico: Rattus rattus Nome comum: Black/Roof rat Estadio de desenvolvimento: All
Campos de utilização	Interior Exterior Para uso no interior e em redor instalações pecuárias (junto as paredes, janelas, ...).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: O isco em pasta é colocado manualmente nas áreas infestadas por roedores. O ideal é que as caixas de isco sejam colocadas rente ao chão. O isco em tais caixas pode ser afixado no local para reduzir a remoção e dispersão pelos roedores. Os produtos também podem ser colocados em bandejas sob uma telha ou localizados de uma maneira que o acesso por um organismo não visado seja restringido.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos domésticos: até 50 g - até Ratos: 200 g Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: Ratos-domésticos Alta infestação – até 50 gramas em estações de isco ou pontos de isco cobertos a cada 1 a 1,5 metros. Baixa infestação – até 50 gramas em estações de isco ou pontos de isco cobertos a cada 2 a 3 metros.

	<p>Ratos Alta infestação – até 200 gramas em estações de isco a cada 4 a 5 metros Baixa infestação – até 200 gramas em estações de isco a cada 8 a 10 metros</p>
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>diversos, Diversos , Diversos</p> <p>Em 3 padrões: Para ratos, para ratos domésticos e para ratos e ratos domésticos.</p> <p>Balde plástico (sachês de 10 a 40 gramas) – até 17 kg Caixa de papelão com saco plástico integral (sachês de 10 a 40 gramas) – até 20 kg Embalagem plástica (sachês de 10 a 40 gramas) – até 4 kg Bolsa plástica vedável (sachês de 20 a 100 gramas) – até 4 kg Estações de isco previamente abastecidas (sachês de 10 a 40 gramas) / caixa de papelão – de 2 a 60 estações de isco Estações de isco previamente abastecidas (sachês de 10 a 40 gramas) / saco de plástico – de 2 a 60 estações de isco Estações de isco previamente abastecidas (sachês de 20 a 100 gramas) / caixa de papelão – de 2 a 60 estações de isco</p>

4.1.1 Instruções específicas de utilização

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Possivelmente, o isco em pasta pode ser usado em diversas circunstâncias e pode ser implantado de várias maneiras. O método de implantação depende das circunstâncias. Uma prioridade é sempre evitar ao máximo sua exposição a organismos não visados. A vulnerabilidade (do acesso por organismos não visados) de um determinado local é avaliada na decisão para o método de implantação a ser usado.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - UTILIZADORES NÃO PROFISSIONAIS

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: All Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: All Nome científico: Rattus rattus Nome comum: Black / Roof rat Estadio de desenvolvimento: All
Campos de utilização	Interior Exterior Para uso exclusivo em instalações pecuárias
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada:

As estações/pontos de isco são colocados manualmente na área infestada por roedores. O ideal é que as caixas de isco sejam colocadas rente ao chão.

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: Ratos domésticos: até 50 g - Ratos: até 150 g
Diluição (%): 0
Número e calendário da aplicação:

Ratos-domésticos
Alta infestação – até 50 gramas em estações de isco ou pontos de isco cobertos a cada 1 a 1.5 metros.
Baixa infestação – até 50 gramas em estações de isco ou pontos de isco cobertos a cada 2 a 3 metros.
Ratos
Alta infestação – até 150 gramas em estações de isco a cada 4 a 5 metros
Baixa infestação – até 150 gramas em estações de isco a cada 8 a 10 metros

Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem

Diversos, Diversos , Diversos

3 padrões (para ratos, ratos demésticos ou para ratos e ratos domésticos):

Estações de isco abastecidas previamente (sachês de 10 gramas a 40 gramas) / caixa de papelão
Estações de isco abastecidas previamente (sachês de 10 a 40 gramas) / saco plástico
Estação de isco resistente à adulteração travável (sachês de 10 a 40 gramas) / caixa de papelão
Estação de isco resistente à adulteração travável (de 10 a 40 gramas) / saco plástico
Balde de plástico (sachês de 10 a 40 gramas)
Caixa de papelão com saco plástico integral (sachês de 10 a 40 gramas)
Bolsa plástica travável (sachês de 10 a 40 gramas)

4.2.1 Instruções específicas de utilização

Leve este rótulo consigo ao buscar aconselhamento sobre o tratamento. Usar luvas é recomendado. Lave as mãos antes e depois de usar. Mamíferos selvagens e pássaros podem correr riscos se este produto não for usado de acordo com o rótulo.

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

-

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

-

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

-

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

-

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

GENERATION PAT VET é um produto pronto a usar. As saquetas são colocadas sem ser abertas. As estações/pontos de isco são colocados manualmente na área infestada por roedores. O ideal é que as caixas de isco sejam colocadas rente ao chão. Deposite o produto o mais próximo possível dos locais onde os roedores passam. Coloque os pontos de isco ao longo das paredes e nos locais onde há sinal de atividade. Os animais alvo podem consumir a dose letal numa única toma, aparecendo os primeiros roedores mortos entre três a cinco dias após o primeiro consumo. O tratamento pode durar de 2 a 4 semanas, dependendo do nível de infestação.

5.2. Medidas de redução do risco

Os iscos devem ser colocados de maneira segura para reduzir o risco de consumo por outros animais ou crianças. Quando possível, prenda os iscos para que não possam ser arrastados. O produto nunca deve ser colocado de maneira indiscriminada. Não tente abrir as saquetas de pasta. Evite o acesso de crianças, pássaros e animais não visados ao isco (principalmente cães, gatos, porcos e aves domésticas). Quando as estações à prova de adulteração são usadas, devem ser marcadas claramente para mostrar que contêm raticidas e que não se deve mexer com elas. Procure e remova roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento, pelo menos tão freqüente quanto os iscos são verificados e/ou reabastecidos. Elimine os roedores de acordo com as exigências locais. Não use raticidas anticoagulantes como iscos permanentes

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Este produto contém uma substância anticoagulante.
Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas.
Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.
- Em caso de:- Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
- Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.
- Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto [...]. Contactar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia [...]. As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «nome do produto ou número de autorização»; «substância(s) ativa(s)» e «em caso de incidente, contactar um centro de informação antivenenos [...]».- Perigoso para a vida selvagem.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Remova todos os iscos e as bandejas de isco depois do tratamento e elimine-os de acordo com as exigências locais. O produto não deverá ser reutilizado ou reciclado. O produto não consumido deverá ser recolhido e eliminado de acordo com as exigências locais por incineração. As embalagens não contêm resíduos tóxicos, no entanto as embalagens deverão ser eliminadas com segurança e não devem ser reutilizadas para nenhum outro propósito.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazene o produto na embalagem original, em local seguro, fresco e seco, inacessível a crianças e animais de estimação.
Prazo de validade: 4 anos

6. Outras informações

No que diz respeito as frases de precaução (do ponto 3) é preciso notar o seguinte:
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um médico ou o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS
P501: Eliminar o conteúdo e a embalagem em acordo com os regulamentos

- Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco.

- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

- Este produto contém um agente amargo e um corante.

