

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Meta02.MB

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0030287-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0030287-0003

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	11
5.1. Navodila za uporabo	11
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	12
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	12
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	12
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	12
6. Druge informacije	12

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Jungle Formula Kids spray

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	Omega Pharma International n.v.
Naslov	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
Številka dovoljenja	SI-0030287-0000 1-2

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0030287-0003

Datum dovoljenja

24/03/2023

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

02/12/2032

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG,
--

Naslov proizvajalca

Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

Lokacije proizvodnje

Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

Ime proizvajalca	Medgenix Benelux,
Naslov proizvajalca	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija
Lokacije proizvodnje	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem Belgija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1320 - Etil butil acetil aminopropionat
Ime proizvajalca	Merck KGaA,
Naslov proizvajalca	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Poligono Merck, 08100 Barcelone, Španija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	0
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,92
Propilen glikol lavrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Vrsta formulacije

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) –uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: Aedes mosquitoes
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: Culex komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Zunanost, zunaj

Znotraj; zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:
Nanos pršila na kožo s pršilnikom

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1,0 g na 600 cm². Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek)
Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan
Redčenje (%): 0

Število in časovni raspored uporabe:

Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan

Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 250 ml

Plastenka: PP/HDPE

Pršilnik: PE-PP

Pokrovček: PP

Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.
Po nanosu nudi ta izdelek 4 ure zaščite pred komarji.
Uporaba je dokazana samo v zmernih pogojih.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Repelent proti klopm – splošna uporaba (nad 6 mesecev) - uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Ixodes ricinus
Splošno ime: klopi

Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj
Zunanjost, zunaj
Znotraj; zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:
Nanos pršila na kožo s pršilnikom.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1,0 g na 600 cm². Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek)
Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:
Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan
Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 250 ml
Plastenka: PP/HDPE
Pršilnik: PE-PP
Pokrovček: PP
Sekundarna embalaža: kartonska škatla



4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.
Po nanosu nudi ta izdelek 8 ur zaščite pred klopi.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Repelent proti pikajočim insektom – splošna uporabe (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicoides spp. Splošno ime: Mušice Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Phlebotomus spp. Splošno ime: Peščene muhe Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Vespula spp. Splošno ime: Ose Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj
Zunanost, zunaj
Znotraj; zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:
Pršilnik - nanos na človeško kožo

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerki: 1,0 g na 600 cm². Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:


Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan
Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Od 15 ml do 250 ml
Plastenka: PP/HDPE
Pršilnik: PE-PP
Pokrovček: PP
Sekundarna embalaža: kartonasta škatla



4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.
Po nanosu nudi ta izdelek 1 uro zaščite pred mušicami.
Po nanosu nudi ta izdelek 6 ur zaščite pred peščenimi muhami.
Odganja ose s kože do 2,5 uri.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.

Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.

Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.

Za nanos na obraz: razpršite odraslemu v dlan in nanesite zmerno količino na obraz odraslega ali otroka, pri čemer se izogibajte očem in ustom.

Ne nanašajte v otroške dlani.

Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).

Ko pršite v zaprtih prostorih, se prepričajte, da je prostor dobro prezračen, in se izogibajte vdihavanju pršila;

Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.

Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.

Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.

Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.

Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.

Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.

Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.

Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Izperite. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material

Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.

Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 24 mesecev (v PP/HDPE)

6. Druge informacije

